

(:)

عباس بانج شفیع^{۱*}، مسلم اکبری نیا^۲، غلامعلی جلالی^۲ و احمد علیجانپور^۳

*- نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، پست الکترونیک: a.banjshafiei@urmia.ac.ir

۲- دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.

۳- استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

تاریخ دریافت: ۸۷/۶/۱۵ تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۲/۲۰

چکیده

منطقه مورد مطالعه واقع در سری چلیبر جنگل آموزشی- پژوهشی خیرود در سال ۱۳۷۷ دچار حریق سطحی با شدت زیاد گردید و پس از گذشت ۷ سال از وقوع آتش سوزی، به منظور بررسی اثر آتش سوزی بر رویش قطری درختان راش و ممرز اقدام به انجام این تحقیق شد. بعد از پیمایش سراسر مناطق سوخته و شاهد، تعداد ۶۰ نمونه مغزی با استفاده از مته سال سنج، از دو گونه راش و ممرز (هر کدام ۱۵ نمونه در هر یک از دو منطقه) تهیه گردیده و پهنای دایره‌های سالیانه مربوط به سالهای مختلف در هر نمونه اندازه‌گیری شد. مقادیر بدست آمده به تفکیک سالهای قبل و بعد از آتش سوزی و همچنین همبستگی آنها با داده‌های اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آتش سوزی سطحی اتفاق افتاده در این توده جنگلی تأثیر معنی‌داری بر رویش قطری راش نداشته، اما باعث افزایش معنی‌دار آن در ممرز گردیده است. همچنین میزان پهنای دایره‌های سالیانه در سالهای قبل از آتش سوزی با داده‌های اقلیمی همبستگی معنی‌دار داشته، در صورتی که در سالهای بعد از آن همبستگی مشاهده نگردید. بنابراین، ریشه تغییرات را می‌توان در عوامل دیگری به غیر از اقلیم مانند آتش سوزی جستجو کرد.

واژه‌های کلیدی: پهنای دایره‌های سالیانه، رویش قطری، راش، ممرز، آتش سوزی جنگل، جنگل خیرود.

مقدمه

جنگل یک اکوسیستم پیچیده و پویاست که در حالت عادی اجزای تشکیل دهنده آن همواره با هم در حالت تعادل قرار دارند. هنگامی که جنگل تحت تأثیر یک یا چند عامل مخرب طبیعی یا مصنوعی قرار می‌گیرد، با توجه به نوع و شدت اثر آنها ممکن است حالت تعادل یا قدرت خودتنظیمی آن ضعیف گشته و یا از بین برود. یکی از عوامل محیطی که می‌تواند بر اکوسیستم جنگل تأثیرگذار باشد، عامل آتش سوزی است (Barnes et al., 1998). آتش سوزی بر قدرت رقابت و مراحل توالی در توده تأثیر می‌گذارد (Reich et al., 1990; Kruger & Reich, 1997a). افزایش نسبت ریشه به ساقه به دلیل

کاهش بیوماس برگ (Wareing et al., 1968)، تغییر در تجمع مواد غذایی به دلیل افزایش مواد غذایی قابل جذب خاک (Oechel & Hastings, 1983) و تغییر تبادل گازی برگ (Kruger & Reich, 1997b) پس از آتش سوزی، باعث تغییرات فیزیولوژیکی و ظرفیت فتوسنتزی می‌گردد. چنین تغییراتی ممکن است باعث کاهش میزان رشد برخی از گونه‌ها و یا افزایش رشد گونه‌های دیگر شود (Kruger & Reich, 1997c; Arthur et al., 1998; Adams & Reiske, 2001) و همچنین تغییر در رویش درختان اشکوب فوقانی گردد (Boerner et al., 1988; Rieske et al., 2001). مطالعه تغییرات پهنای دایره‌های سالیانه، تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی اکوسیستم

جنگل را در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت نمایان می‌سازد. تعیین روند رویش درختان می‌تواند مشخص سازد که یک عامل محدود کننده آیا ترکیبی از عوامل اکولوژیکی است یا عوامل انسانی نیز در آن دخالت دارند (Fritts, 1976; Schweingruber, 1988).

بررسی ارتباط بین پهنای دایره‌های سالیانه، اقلیم و عوامل مخرب (Nola, 1991; Brandini *et al.*, 1994; Zarnovican & Laberge, 1994; Cherubini *et al.*, 1996; Meyer & Braker, 2001)، مطالعه پویایی رویش قطری در ارتباط با مسائل اقتصادی- اجتماعی روستائیان (Fabbio, 1992; van den Brakel & Visser, 1996; Cherubini *et al.*, 1998) و همچنین تغییرات رویش توده جنگلی بعد از اجرای عملیات جنگل‌شناسی (Badeau *et al.*, 1995)، همگی از عوامل ویژه‌ای هستند که برای اتخاذ روشهای مدیریتی مناسب و بررسی مراحل حیات یک توده جنگلی بکار می‌روند (Amorini *et al.*, 1996; Motta *et al.*, 1999).

مواد و روشها


منطقه مورد مطالعه

منطقه آتش‌سوزی شده در جنگل چمستان واقع در سری چلیز جنگل آموزشی- پژوهشی خیرود قرار دارد؛ دارای ارتفاع ۱۱۵۰ تا ۱۴۵۰ متر بالاتر از سطح دریاست که جهت عمومی غربی و جنوب‌غربی است و متوسط شیب آن ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد (شکل ۱). تاکنون برای این سری، طرح جنگل‌داری تهیه نشده و هیچ‌گونه عملیات برداشت چوب نیز انجام نشده است. اقلیم منطقه براساس طبقه‌بندی آمبرژه در طبقه اقلیمی خیلی مرطوب با زمستانهای خیلی خنک و براساس طبقه‌بندی کوپن در اقلیم معتدل گرم قرار می‌گیرد. میزان بارندگی سالیانه ۱۳۸۰ میلی‌متر می‌باشد. منطقه بدون فصل خشک بوده، ولی تیرماه حساسترین زمان برای بروز خشکی است. لازم به ذکر است که به دلیل نبودن ایستگاه هواشناسی در منطقه مورد مطالعه، از اطلاعات ایستگاه هواشناسی نوشهر که در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد استفاده شد که قطعاً اقلیم منطقه مورد مطالعه دارای رطوبت بیشتر و هوای معتدل‌تری است. متوسط درجه حرارت سالانه در این ایستگاه حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد است. گرمترین ماه، تیر و مرداد با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد و سردترین ماه، بهمن با دمای حدود ۱۲- درجه سانتی‌گراد است. رطوبت نسبی در ماههای مختلف از ۷۵ تا ۸۵ درصد در نوسان است (صالحی، ۱۳۸۳).

مطالعه و بررسی تأثیر آتش‌سوزی بر رویش قطری درختان، امکان جمع‌آوری اطلاعات در مورد واکنش گونه‌های مختلف را فراهم می‌آورد؛ به طوری که براساس آن می‌توان قضاوت نمود که چه گونه‌هایی از آتش‌سوزی سوده برده و کدام یک متضرر می‌شوند. به عبارت بهتر، تأثیرات مثبت و منفی آتش‌سوزی بر گونه‌های مختلف آشکار می‌گردد.

در جنگلهای شمال کشور، آتش‌سوزی‌های متعددی به وقوع می‌پیوندند، به طوری که براساس آمارهای موجود در یک دوره ده‌ساله (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲) به طور متوسط ۷۵ هکتار از مساحت جنگلهای غرب مازندران و در یک دوره هفت‌ساله (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱) به طور میانگین ۱۶۳/۵ هکتار از جنگلهای کل استان مازندران در سال در اثر آتش‌سوزی از بین رفته است (بی‌نام، ۱۳۸۱).

به‌رغم وقوع مکرر آتش‌سوزی در جنگلهای شمال، تاکنون مطالعه‌ای در مورد تأثیر آتش‌سوزی بر رویش



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

برداشت اطلاعات صحرائی این مقاله در خردادماه ۱۳۸۴ با هماهنگی و مساعدت مسئولان جنگل آموزشی- پژوهشی خیرود (دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران) انجام شده است.

روش نمونه‌برداری

بعد از پیمایش سراسر مناطق سوخته و شاهد، به‌منظور بررسی تأثیر آتش بر رویش قطری درختان، از بین گونه‌های موجود، دو گونه راش و ممرز به‌دلیل این که در هر دو منطقه غالب بوده و سایر گونه‌ها به‌صورت پراکنده وجود داشتند، انتخاب گردیدند. بدیهی است که گونه‌های یادشده به‌دلیل تعداد زیاد و پراکنش یکنواخت در سطح عرصه به‌خوبی می‌توانند اثر آتش را نمایان سازند. بعد از انتخاب این دو گونه، با پیمایش تمام سطح عرصه از هر گونه در هر منطقه (سوخته شده و شاهد) تعداد ۱۵ درخت غالب به‌صورت انتخابی مشخص گردید و با

از نظر زمین‌شناسی و سنگ‌مادر، مخلوطی از سنگ آهک و کنگلومرا، سنگ آهک و مارن، دولومیت با سنگ آهک و ماسه‌سنگ (تشکیلات کرتاسه) بوده و خاک منطقه نیز جزء خاکهای قهوه‌ای جنگلی با خصوصیات چونی عمق زیاد، رنگ خاکستری خیلی تیره با بافت سطحی سنگین (رسی)، ساختمان مکعبی، زهکشی ضعیف و نفوذپذیری آهسته می‌باشد (صالحی، ۱۳۸۳). تیپ جنگل به‌صورت ترکیبی از گونه‌های راش، ممرز و بلوط بوده که راش و ممرز از اکثریت قابل‌توجهی برخوردار می‌باشند. همچنین درختان توسکا، افرا، ملج و نمدار نیز به‌صورت پراکنده حضور دارند. این منطقه و مناطق مجاور آن در ۱۹ آذر سال ۱۳۷۷ در سطحی معادل ۲۷۰ هکتار دستخوش حریق سطحی گردیده و به مدت ۴ تا ۵ روز در آتش سوخته است که آثار و شواهد آتش‌سوزی به‌صورت زخم بر روی تنه درختان به فراوانی مشاهده می‌شود (لطفی جلال‌آبادی، ۱۳۷۸).

داده‌ها با آزمون Kolmogrov-Smirnov انجام شد. در این تحقیق به دلیل این که پراکنش داده‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کرد، از آزمون تجزیه واریانس (ANOVA) استفاده شد. برای مقایسه میزان پهنای دایره‌های سالیانه در دو دوره مختلف زمانی در یک منطقه، آزمون t جفتی بکار گرفته شد. همچنین برای بررسی ارتباط بین داده‌های اقلیمی و پهنای دایره‌های سالیانه از همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج

مطالعه رویش درختان راش و ممرز در دو منطقه شاهد و سوخته شده نشان داد که راش در منطقه شاهد بیشترین میانگین رویش قطری سالیانه (۶/۲ میلی‌متر) و ممرز در منطقه سوخته شده کمترین مقدار (۴/۳ میلی‌متر) را دارا می‌باشند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نیز نشان داد که بین میانگین رویش قطری سالهای مختلف گونه راش و ممرز (۱۳۵۲-۱۳۸۴) در هر یک از مناطق سوخته شده و شاهد به احتمال ۹۵٪ اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (جدول ۱).

استفاده از مته سال‌سنج در ارتفاع برابر سینه اقدام به برداشت مغزی (core) شد. درختان انتخاب شده در منطقه سوخته شده علاوه بر غالب بودن، آثار و علائم سوختگی را نیز به همراه داشتند. بنابراین در مجموع تعداد ۶۰ مغزی با استفاده از روش فوق فراهم گردید. پس از برداشت مغزی‌ها در طبیعت، به منظور جلوگیری از شکستن و خرد شدن، آنها را داخل لوله پلاستیکی که از قبل به اندازه‌های مناسب بریده شده بودند قرار داده و به آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی نور منتقل شدند. در آزمایشگاه پس از ایجاد برش طولی با استفاده از تیغ موکت بری در امتداد مغزی‌ها، سطح ایجاد شده به وسیله سمباده نرم، صاف و صیقلی گردید. نمونه‌ها بعد از این مرحله در آب به مدت ۳۰ دقیقه خیسانده شدند تا تفکیک رنگ بین چوب بهاره و تابستانه به خوبی نمایان شود. بعد هر مغزی با قرار دادن یک خط‌کش در کنار آن با استفاده از اسکنر HP 1513 با وضوح ۳۰۰ dpi اسکن شده و با استفاده از نرم‌افزار Image tools ver. 2.00 پهنای دایره‌های رویش سالیانه تا دقت ۰/۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد (Devall et al., 1995).

تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات بدست‌آمده از مغزی‌ها، وارد رایانه شده و بعد با استفاده از نرم‌افزار SPSS ابتدا آزمون نرمال بودن

جدول ۱- تجزیه واریانس میانگین رویش قطری سالیانه گونه‌های راش و ممرز در منطقه سوخته شده و شاهد در سالهای مختلف در یک دوره ۳۳ ساله (۱۳۵۲-۱۳۸۴)

گونه	میانگین رویش قطری سالیانه (میلی‌متر)	انحراف معیار	اشتباه معیار	مجموع مربعات	درجه آزادی	F	معنی‌داری
راش منطقه سوخته شده	۴/۵	۲/۱۱	۰/۱۰۰	۹۱/۱۷۵	۳۲	۰/۶۱۹	۰/۹۵۰ ns
راش منطقه شاهد	۶/۲	۲/۳۴۸	۰/۱۴۹	۱۸۹/۶۹۹	۳۲	۱/۰۸۸	۰/۳۵۱ ns
ممرز منطقه سوخته شده	۴/۳	۲/۱۵۲	۰/۱۰۸	۱۹۹/۷۰۲	۳۲	۱/۳۹۰	۰/۰۸۲ ns
ممرز منطقه شاهد	۶	۲/۲۷۳	۰/۱۸۴	۱۲۳/۴۳۵	۳۲	۰/۶۹۹	۰/۸۷۹ ns

ns، معنی‌دار نیست

به‌منظور بررسی نحوه تأثیر آتش‌سوزی بر رویش قطری، دو دوره ۷ ساله مشخص گردید. دوره اول در برگیرنده سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ یعنی سالهای پس از آتش‌سوزی (۱۳۷۷) و دوره دوم شامل ۷ سال قبل از آتش‌سوزی (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷) بود. میانگین رویش قطری گونه‌های راش و ممرز در مناطق سوخته شده و شاهد در دوره‌های زمانی یادشده در جدول ۲ ارائه گردیده است. براساس این جدول میانگین رویش قطری گونه‌های راش و ممرز در منطقه سوخته شده و در دوره ۷ ساله بعد از

آتش‌سوزی، بیشترین و میانگین رویش قطری گونه ممرز در منطقه سوخته شده و در دوره ۷ ساله قبل از آتش‌سوزی، کمترین مقدار را دارا هستند. میانگین رویش قطری سالیانه در هر دو گونه راش و ممرز و در هر دو منطقه شاهد و سوخته شده، در دوره ۷ ساله بعد از آتش‌سوزی، بیشتر از دوره قبل از آتش‌سوزی بود، اما فقط بین میانگین رویش قطری سالیانه ممرز در منطقه آتش‌سوزی شده در دوره‌های قبل و بعد از آتش‌سوزی به احتمال ۹۹٪ اختلاف معنی‌دار وجود دارد (جدول ۲).


جدول ۲- مقایسه میانگین رویش قطری سالیانه (آزمون t جفتی) گونه‌های راش و ممرز در دوره‌های ۷ ساله قبل (۱۳۷۱-۱۳۷۷) و بعد از آتش‌سوزی (۱۳۷۸-۱۳۸۴)

معنی‌داری	t	اختلاف جفتی			میانگین رویش قطری سالیانه (میلی‌متر)	
		میانگین	انحراف معیار	اشتباه معیار		
۰/۷۹۳ ns	۰/۲۶۳	۰/۳۰۳	۳/۱۰۳	۰/۰۸۰	۴/۵	راش بعد از آتش‌سوزی منطقه سوخته شده
					۴/۴	راش قبل از آتش‌سوزی منطقه سوخته شده
۰/۰۰۱**	۳/۳۰۷	۰/۲۶۴	۲/۳۷۵	۰/۸۷۳	۴/۴	ممرز بعد از آتش‌سوزی منطقه سوخته شده
					۳/۶	ممرز قبل از آتش‌سوزی منطقه سوخته شده
۰/۲۰۷ ns	۱/۲۷۸	۰/۴۸۳	۳/۴۸۱	۰/۶۱۷	۶/۱	راش بعد از آتش‌سوزی منطقه شاهد
					۵/۴	راش قبل از آتش‌سوزی منطقه شاهد
۰/۴۱۰ ns	۰/۸۳۵	۰/۵۵۲	۳/۰۷۵	۰/۴۶۱	۶/۰	ممرز بعد از آتش‌سوزی منطقه شاهد
					۵/۵	ممرز قبل از آتش‌سوزی منطقه شاهد


**، معنی‌دار در سطح ۱٪ ns معنی‌دار نیست

۱۳۷۴، ۱۳۷۰، ۱۳۶۸ شاهد کاهش میانگین پهنای دایره‌های سالیانه نسبت به سال مجاور بودند. شکل‌های ۳ و ۴ نشان می‌دهند که در سالهایی که همه تیمارها افزایش پهنای دایره‌های سالیانه را نشان می‌دهند، میانگین حداقل و حداکثر دما، کاهش و میانگین بارندگی ماهیانه، افزایش یافته و در سالهایی که کاهش پهنای دایره‌های سالیانه در همه تیمارها اتفاق می‌افتد، میانگین حداقل و حداکثر دما، افزایش و میانگین بارندگی ماهیانه، کاهش می‌یابد.


در شکل ۲ منحنی میانگین پهنای دایره‌های سالیانه گونه‌های راش و ممرز در مناطق سوخته شده و شاهد به‌تفکیک سال ارائه شده است. براساس این شکل، گونه راش در منطقه سوخته شده، راش در منطقه شاهد، ممرز در منطقه سوخته شده و ممرز در منطقه شاهد همگی در سال ۱۳۷۷ کمترین و به‌ترتیب در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۶۱ و ۱۳۵۹ بیشترین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه را دارا بودند. همه تیمارها در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۰، ۱۳۷۶، ۱۳۷۲، ۱۳۶۹، ۱۳۶۶ شاهد افزایش و در سالهای ۱۳۷۷،



شکل ۲- منحنی پهنای دایره‌های سالیانه گونه‌های راش و ممرز در مناطق سوخته شده و شاهد در یک دوره ۲۹ ساله (۱۳۵۶-۱۳۸۴)



شکل ۳- منحنی میانگین حداقل و حداکثر دمای ماهیانه در یک دوره ۲۹ ساله (۱۳۵۶-۱۳۸۴) در ایستگاه هواشناسی نوشهر



شکل ۴- منحنی میانگین بارندگی ماهیانه در یک دوره ۲۹ ساله (۱۳۵۶-۱۳۸۴) در ایستگاه هواشناسی نوشهر

سوخته شده و میانگین حداکثر دمای ماهیانه، میانگین پهنای دایره‌های راش منطقه شاهد و میانگین حداقل دمای ماهیانه و میانگین پهنای دایره‌های ممرز منطقه شاهد و میانگین حداکثر دمای ماهیانه، همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد (جدول ۳).

نتایج مربوط به آزمون همبستگی بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و داده‌های اقلیمی (بارندگی و دما) نشان داد که در کل دوره مورد مطالعه (۱۳۵۶-۱۳۸۴)، بین میانگین پهنای دایره‌های گونه راش در منطقه سوخته شده و میانگین بارندگی ماهیانه، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد، اما بین میانگین پهنای دایره‌های راش منطقه

جدول ۳- همبستگی بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و اطلاعات اقلیمی در یک دوره ۲۹ ساله (۱۳۵۶-۱۳۸۴)

میانگین پهنای دایره‌های سالیانه (میلی متر)		میانگین بارندگی ماهیانه (میلی متر)		میانگین حداکثر دمای ماهیانه (سانتی گراد)		میانگین حداقل دمای ماهیانه (سانتی گراد)	
ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری
۰/۵۲۶	۰/۰۰۴**	-۰/۴۲۲	۰/۰۲۵*	-۰/۲۶۱	۰/۱۸۰ ns	-۰/۲۶۱	۰/۱۸۰ ns
۰/۲۳۲	۰/۲۳۵ ns	-۰/۳۴۴	۰/۰۷۳ ns	-۰/۴۰۵	۰/۰۳۳*	-۰/۴۰۵	۰/۰۳۳*
۰/۳۳۰	۰/۰۸۶ ns	-۰/۲۸۹	۰/۱۳۶ ns	-۰/۱۹۰	۰/۳۳۳ ns	-۰/۱۹۰	۰/۳۳۳ ns
۰/۲۵۳	۰/۱۹۳ ns	-۰/۴۰۳	۰/۰۳۳*	-۰/۲۷۱	۰/۱۶۳ ns	-۰/۲۷۱	۰/۱۶۳ ns

** همبستگی در سطح ۱٪ معنی‌دار است. * همبستگی در سطح ۵٪ معنی‌دار است. ns همبستگی معنی‌دار نیست.

سوخته شده و میانگین بارندگی ماهیانه، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشته، اما بین میانگین پهنای دایره‌های

در دوره زمانی ۱۳۵۶ تا سال وقوع آتش‌سوزی (۱۳۷۷)، بین میانگین پهنای دایره‌های گونه راش در منطقه

راش منطقه سوخته شده و میانگین حداکثر دمای ماهیانه، میانگین پهنای دایره‌های راش منطقه شاهد و میانگین حداقل دمای ماهیانه و میانگین حداکثر دمای ماهیانه، همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد (جدول ۴).

جدول ۴- همبستگی بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و اطلاعات اقلیمی در یک دوره ۲۲ ساله (۱۳۵۶-۱۳۷۷)

میانگین پهنای دایره‌های سالیانه (میلی‌متر)		میانگین بارندگی ماهیانه (میلی‌متر)		میانگین حداکثر دمای ماهیانه (سانتی‌گراد)		میانگین حداقل دمای ماهیانه (سانتی‌گراد)	
ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری
۰/۶۸۴	۰/۰۰**	-۰/۵۱۰	۰/۰۱۵*	-۰/۲۸۱	۰/۲۰۶ ns	۰/۱۹۴	۰/۰۲۹*
۰/۳۴۹	۰/۱۱۲ ns	-۰/۴۶۶	۰/۰۶۸ ns	-۰/۲۸۵	۰/۱۹۹ ns	۰/۳۲۶	۰/۲۴۰ ns
۰/۳۲۶	۰/۱۳۹ ns	-۰/۳۹۸	۰/۰۶۷ ns	-۰/۲۶۱	۰/۲۴۰ ns		

** همبستگی در سطح ۱٪ معنی‌دار است. * همبستگی در سطح ۵٪ معنی‌دار است. ns همبستگی معنی‌دار نیست.

در دوره زمانی بعد از آتش‌سوزی (۱۳۸۳-۱۳۷۸) هیچ ارتباط معنی‌داری بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و داده‌های اقلیمی مشاهده نگردید (جدول ۵).

جدول ۵- همبستگی بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و اطلاعات اقلیمی در یک دوره ۷ ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۴)

میانگین پهنای دایره‌های سالیانه (میلی‌متر)		میانگین بارندگی ماهیانه (میلی‌متر)		میانگین حداکثر دمای ماهیانه (سانتی‌گراد)		میانگین حداقل دمای ماهیانه (سانتی‌گراد)	
ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری	ضریب پیرسون	معنی‌داری
۰/۰۷۸	۰/۸۸۴ ns	-۰/۰۲۹	۰/۹۵۶ ns	-۰/۲۲۶	۰/۶۶۶ ns	۰/۵۵۰	۰/۸۶۸ ns
۰/۱۰۴	۰/۸۴۵ ns	-۰/۴۸۹	۰/۳۲۴ ns	-۰/۶۶۳	۰/۱۵۱ ns	۰/۲۴۷	۰/۳۹۲ ns
۰/۲۴۷	۰/۶۳۷ ns	۰/۳۱۵	۰/۵۴۳ ns	۰/۴۳۲	۰/۳۹۲ ns		

ns همبستگی معنی‌دار نیست.

بحث

در هنگام بررسی باید به تمام عوامل توجه کرد. مقایسه عوامل اقلیمی (درجه حرارت و بارندگی ماهیانه) با رویش قطری سالیانه نشان داد که در هر سالی که درجه حرارت کاهش و بارندگی افزایش یافته، رویش قطری افزایش می‌یابد و در سالی که درجه حرارت، افزایش و بارندگی کاهش یابد، رویش قطری نیز با کاهش مواجه می‌شود. در سال ۱۳۷۷ که بیشترین درجه حرارت و کمترین مقدار بارندگی (به‌همراه سال ۱۳۷۰) از سال ۱۳۵۶ به‌وقوع پیوست، کمترین مقدار رویش قطری سالیانه نیز در

از آن جا که آتش‌سوزی در پاییز سال ۱۳۷۷ اتفاق افتاد، بنابراین تأثیر آن را باید در سالهای پس از آن جستجو کرد. نتایج نشان دادند که رویش قطری سالیانه بعد از وقوع آتش‌سوزی در گونه‌های راش و ممرز افزایش می‌یابد. اما این افزایش تنها در گونه ممرز و در منطقه سوخته شده نسبت به سالهای قبل از آتش‌سوزی معنی‌دار است. البته رویش درخت (قطری و ارتفاعی) تابع عوامل مختلف اکولوژیکی محیط اطراف خود مانند شرایط اقلیمی بوده و

اعمال می‌گردد، بر رویش قطری تمام گونه‌ها تأثیر معنی‌داری نداشته است (Guinto et al., 1999).

در جنگل جراح (jarrah) در غرب استرالیا، آتش‌سوزی‌های با شدت کم که مکرراً اتفاق می‌افتد، تأثیر مثبت یا منفی بر رویش قطری درختان نداشت (Abbott & Loneragan, 1983). در تحقیق دیگری مشخص شد که آتش‌سوزی باعث بیشتر شدن رویش قطری درختان کاج پوندروزا نسبت به بلوط می‌گردد (Fule et al., 2005).

تحقیقات فوق نشان می‌دهند که آتش‌سوزی بر گونه‌های مختلف، تأثیرات متفاوتی دارد و نمی‌توان یک نسخه واحد در مورد تأثیر آتش‌سوزی بر رویش قطری کلیه گونه‌های درختی نوشت. همچنین شدت و دوره بازگشت آتش نیز از عوامل تأثیرگذار در این مورد می‌باشد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که آتش‌سوزی تأثیر مستقیمی بر رویش قطری درختان نداشته و تنها از طریق تغییر دادن شرایط محیطی و عناصر غذایی خاک به‌همراه شرایط اقلیمی بر رویش تأثیر می‌گذارد. البته سرشت گونه و نوع آن، شدت و مدت آتش‌سوزی از عوامل دیگری هستند که تغییرات رویش قطری را در کنترل خود دارند که برای درک بهتر این موضوع، نیاز به تحقیقات بیشتری می‌باشد.

منابع مورد استفاده

- بی‌نام، ۱۳۸۱. سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، سال ۱۳۸۱. ۱۵۶ صفحه.
- صالحی، ع.، ۱۳۸۳. بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با ترکیب پوشش درختی و عوامل توپوگرافی در بخش نم‌خانه جنگل خیرودکنار. رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۱۴۶ صفحه.
- لطفی جلال‌آبادی، ع.، ۱۳۷۸. بررسی اثرهای جنگل‌شناسی آتش‌سوزی در جنگل خیرودکنار. جلسه بحث کارشناسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۴۴ صفحه.
- Abbott, I. and Loneragan, O., 1983. Influence of Fire on Growth Rate Mortality and Butt Damage in

گونه‌های راش و ممرز اتفاق افتاد. این در حالی است که پس از وقوع آتش‌سوزی، درجه حرارت و بارندگی از وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۳۷۷ برخوردار گردیده و رویش قطری نیز رو به افزایش می‌گذارد. اما نکته در این جاست که بین میانگین پهنای دایره‌های سالیانه و داده‌های اقلیمی در سالهای قبل از آتش‌سوزی همبستگی معنی‌داری وجود دارد، درحالی‌که ارتباطی بین عوامل فوق در سالهای بعد از آتش‌سوزی مشاهده نگردید. بنابراین ریشه تغییرات را می‌توان در عوامل دیگری مانند آتش‌سوزی جستجو کرد. افزایش بیشتر رویش قطری ممرز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اول آن که آتش‌سوزی باعث سوزانده شدن لاشبرگ و شاخ و برگ کف جنگل می‌گردد که در نتیجه، معدنی‌شدن آنها سریعتر شده و مقدار زیادی عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار می‌گیرد. دوم آن که افزایش میزان بارندگی در سالهای پس از آتش‌سوزی باعث آبرسانی این عناصر به اعماق پایین‌تر خاک یعنی جایی که ریشه درختان قرار دارد، می‌گردد. سوم آن که آتش‌سوزی باعث سوزاندن و حذف تعدادی از پایه‌های درختان و درختچه‌ها گردیده که در نتیجه نور بیشتری برای ممرز که سرشت نورپسندی دارد، فراهم می‌گردد. بنابراین فراهم شدن شرایط رویشی مناسب (نور و عناصر غذایی بیشتر) باعث گردید تا میانگین رویش قطری سالیانه در ممرز در سالهای بعد از آتش‌سوزی نسبت به قبل از آن افزایش معنی‌داری پیدا کند. در ایران و سایر نقاط جهان تحقیقات مشابهی که دقیقاً تأثیر آتش‌سوزی را بر رویش قطری درختان راش و ممرز مورد مطالعه قرار دهد وجود ندارد، اما در مورد سایر گونه‌ها اطلاعاتی در دست است. به‌عنوان مثال، آتش‌سوزی کنترل شده که در هر سال در جنگلهای اسکروفیل مرطوب و خشک جنوب شرق کوئینزلند اجرا می‌شود، بر رویش قطری گونه‌های *Eucalyptus* *drepanophylla* و *E. acmenoides* تأثیری نداشته، اما باعث افزایش آن در گونه *E. tereticornis* گردید. آتش‌سوزی‌های دوره‌ای که هر ۲ تا ۳ سال در این جنگلها

- Kruger, E.L. and Reich, P.B., 1997a. Responses of Hardwood Regeneration to Fire in Mesic Forest Openings. I. Post-Fire Community Dynamics. Can. J. For. Res., 27: 1822-1831.
- Kruger, E.L. and Reich, P.B., 1997b. Responses of Hardwood Regeneration to Fire in Mesic Forest Openings. II. Leaf Gas Exchange, Nitrogen Concentration, and Water Status. Can. J. For. Res., 27: 1832-1840.
- Kruger, E.L. and Reich, P.B., 1997c. Responses of Hardwood Regeneration to Fire in Mesic Forest Openings. III. Whole Plant Growth, Biomass Distribution and Nitrogen and Carbohydrate Relations. Can. J. For. Res., 27: 1841-1850.
- Meyer, F.D. and Braker, O.U., 2001. Climate response in dominant and suppressed spruce trees, *Picea abies* (L.) Karst., on a subalpine and lower montane site in Switzerland. Ecoscience, 8 (1): 105-114.
- Motta, R., Nola, P. and Piussi, P., 1999. Structure and stand development in a mixed Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.), larch (*Larix decidua* Mill.) and stone pine (*Pinus cembra* L.) stand in Paneveggio (Trento, Italy). Dendrochronologia, 16: 57-73.
- Nola, P., 1991. Primo approccio alla dendroclimatologia della quercia (*Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.) in pianura Padana (Italia settentrionale). Dendrochronologia, 9: 71-94.
- Oechel, W.C. and Hastings, S.J., 1983. The Effects of fire on Photosynthesis of Chaparral Resprouts: Mediterranean-type Ecosystems. In: Kruger, F.J., Mitchell, D.T. and Jarvis, J.U.M. (eds.) Ecol. Stud., 43: 274-285.
- Reich, P.B., Abrams, M.D., Ellsworth, D.S., Kruger, E.L., and Tabone, T.J., 1990. Fire Affects Ecophysiology and Community Dynamics of Central Wisconsin Oak Forest Regeneration. Ecology, 71: 2179-2190.
- Rieske, L.K., Housman, H.H., Arthur, M.A., 2001. Effects of Prescribed Fire on Canopy Foliar Chemistry and Suitability for an Insect Herbivore. For. Ecol. Manage., 160: 177-187.
- Schweingruber, F.H., 1988. Tree rings. Basics and applications in dendrochronology. Dordrecht: Reidel, 276 p.
- van den Brakel, J.A. and Visser, H., 1996. The influence of environmental conditions on tree-ring series of Norway spruce for different canopy and vitality classes. Forest Science, 42(2): 206-218.
- Wareing, P.F., Khalifa, M.M., and Treharne, K.J., 1968. Rate-limiting Processes in Photosynthesis at Saturating Light Intensities. Nature (London), 220: 453-457.
- Zarnovican, R. and Laberge, C., 1994. Survey of the effects of forest drainage operations: Climate and volume increment of black spruce and tamarack at Saint-Anaclet. Information Report LAU-X 108E, Natural Resources Canada, Canadian Forest Service – Quebec Region: 24 p.
- Mediterranean Forest of Western Australia. For. Ecol. Manage., 6: 139-153.
- Adams, A.S. and Rieske, L.K., 2001. The Effects of Fire on Oak Seedling Growth and Herbivore Interactions. For. Sci., 47(3): 331-337.
- Amorini, E., Biocca, M., Manetti, M.C., and Motta, E., 1996. A dendroecological study in a declining oak coppice stand. Ann. Sci. For., 53: 731-742.
- Arthur, M.A., Parately, R.D. and Blankenship, B.A., 1998. Single and Repeated Fires Affect Survival and Regeneration of Woody and Herbaceous Species in an Oak-Pine Forest. Journal of the Torrey Botanical Club., 125: 225-236.
- Badeau, V., Dupouey, J.L., Becker, M. and Picard, J.F., 1995. Long-term growth trends of *Fagus sylvatica* L. in northeastern France. A comparison between high and low density stands. Acta Ecologica, 16(5): 571-583.
- Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R. and Spurr, S.H., 1998. Forest Ecology. John Wiley and Sons, USA, 774 p.
- Boerner, R.E.J., Lord, T.R. and Peterson, J.C., 1988. Prescribed Burning in the Oak-pine Forest of the New Jersey Pine Barrens: Effects on Growth and Nutrient Dynamics of Two *Quercus* Species. Am. Midl. Nat., 120: 108-119.
- Brandini, P., Cantiani, M.G., Martinelli, N., Pignatelli, O. and Tabacchi, G., 1994. Climate-radial growth relationships in spruce. Preparing a model in the Valle di Fiemme (Trentino, Italy). ISAFSA Comunicazioni di ricerca, 94(2): 37-52.
- Cherubini, P., Piussi, P. and Schweingruber, F.H., 1996. Spatiotemporal growth dynamics and disturbances in a subalpine spruce forest in the Alps: a dendroecological reconstruction. Can. J. For. Res., 26: 991-1001.
- Cherubini, P., Dobbertin, M. and Innes, J.L., 1998. Potential sampling bias in long-term forest growth trends reconstructed from tree ring: a case study from the Italian Alps. For. Ecol. Manage., 109: 103-118.
- Devall, M.S., Parresol, B.R. and Wright, J., 1995. Dendroecological analysis of *Corrida alliadora*, *Pseudobombax setenatum* and *Annona spraguei* in central Panama. Iawa Journal, 16(4): 411-424.
- Fabbio, G., 1992. Dinamica della popolazione arborea in un ceduo di cerro in invecchiamento. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, XXIII: 41-72.
- Fritts, H.C., 1976. Tree rings and climate. London, Academic Press, 567 p.
- Fule, P.Z., Laughlin, D.C. and Covington, W.W., 2005. Pine-Oak Forest Dynamics Five Years after Ecological Restoration Treatments, Arizona, USA. For. Ecol. Manage., 218: 129-145.
- Guinto, D.F., House, A.P.N., Xu, Z.H. and Saffigna, P.G., 1999. Impacts of Repeated Fuel Reduction Burning on Tree Growth, Mortality and Recruitment in Mixed Species Eucalypt Forests of Southeast Queensland, Australia. For. Ecol. Manage., 115: 13-27.

Effect of forest fire on diameter growth of beech (*Fagus orientalis* Lipsky) and hornbeam (*Carpinus betulus* L.): a case study in Kheyroud forest

A. Banj Shafiei^{1*}, M. Akbarinia², Gh. Jalali² and A. Alijanpour³

1* - Corresponding author, Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Urmia.

E-mail: a.banjshafiei@urmia.ac.ir

2- Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat modares.

3- Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Urmia.

Abstract

The study area is located in Kheyroud forest which was burned in 1998. This study was carried out to evaluate forest fire effect on diameter growth of beech (*Fagus orientalis* L.) and hornbeam (*Carpinus betulus* L.) after 7 years. After surveying whole burned and control area, 60 cores using increment borer were provided from both beech and hornbeam (15 cores were provided for each species in each area). Then sample's ring growth width was measured. Statistical analysis was conducted on data which classified in years before and after fire. Furthermore, correlation between ring growth width and climatic data was tested. Results showed that the surface fire didn't affect on beech but hornbeam ring growth was increased significantly. The correlation within ring growth width and climatic data had been recognized before fire but there was no correlation with years after that. Thus, other factors excluding climate such as fire could be considered as the change reasons.

Key words: ring growth width, diameter growth, beech, hornbeam, forest fire, Kheyroud forest.