



Technical and economical feasibility of using flamer for weed control in cotton fields

Mohammad-Ali Behaeen^{1*}, Abdoulrasool Shiravanian²

¹(Corresponding author) Assistant Professor at Department of Agricultural Engineering Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran, m.behaeen@areeo.ac.ir

²Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran

Article Info

Article type:

Research Full Paper

Article history:

Received: 2026-05-17

Accepted: 2026-06-22

Keywords:

Damaged plant

Herbicide

Yield

ABSTRACT

Background and objectives: Using a flamer as a non-chemical method of weed control reduces herbicide use, environmental risks arising from excessive chemical application, and the development of herbicide-resistant weeds. The aim of this study was to compare chemical weed control with integrated methods that combine a flamer and herbicide, and to evaluate their effects on weeds in cotton.

Materials and methods: The experiment was conducted as a randomised complete block design (RCBD) with eight treatments and four replications: use of trifluralin herbicide at a rate of 2.5 L/ha (T); trifluralin herbicide at 2.5 L/ha plus one hand weeding in the eighth week after planting (T+H); trifluralin herbicide at 2.5 L/ha plus flamer treatment when cotton plants were 40 cm high (T+F40); flamer treatment when cotton plants were 20 cm high (F20); flamer treatment when cotton plants were 40 cm high (F40); flamer treatment twice, when cotton plants were 20 and 40 cm high (F20+F40); full-season hand weeding (H); and no weed control throughout the growing season (NC). In each plot, variables such as weed control index, dry weed weight, the rate of cotton plants damaged by flamer use, plant height, and cotton yield were measured, and the economic performance of treatments was evaluated using marginal benefit–cost ratio analysis.

Results: The dry weight of weeds in treatments F40, F20+F40, T+F40, and T+H did not differ significantly at the 5% level. The maximum weed control index was obtained in treatment F20, with 73.5%, which was in the same statistical group as treatment T+F40, with a weed control index of 64.68%. The results also indicated that treatment F20 caused more damage to the cotton plants than treatment F40. Among the treatments in which the flamer was used, the highest yield was achieved with treatment F40, at 3750 kg/ha, which did not differ significantly from treatment T+F40, with a yield of 3650 kg/ha at the 5% level.

Conclusion: The results of this study showed that using the flamer at a height of 40 cm above the cotton plant is preferable to using the

benefit cost ratio	flamer at a height of 20 cm above the cotton plants, due to less plant damage and more effective weed control. Among the treatments in which herbicide and flamer were used, the maximum yields were obtained with treatments T+H and F40, at 4250 and 3750 kg/ha, respectively. Economically, the gross margins of treatments T+H and F40 ranked first and second. Therefore, if environmental considerations are ignored, treatment T+H is recommended, and if these considerations are taken into account, treatment F40 is recommended.
--------------------	---

Cite this article: Behaen, M.A., Shiravanian, A.R. (2026). Technical and economical feasibility of using flamer for weed control in cotton fields. *Iranian Journal Cotton Researches*, 14 (1), 41-59.



© The author(s)



10.22092/ijcr.2026.372838.1257

Publisher: Cotton Research Institute of Iran



امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از شعله‌افکن در کنترل علف‌های هرز مزارع پنبه

محمدعلی به‌آئین^{۱*}، عبدالرسول شیروانیان^۲

^۱ (نویسنده مسئول) استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران؛

^۲ استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله کامل علمی-پژوهشی	<p>سابقه و هدف: استفاده از شعله‌افکن به عنوان یک روش غیرشیمیایی در کنترل علف‌های هرز، موجب کاهش مصرف علفکش‌ها و خطرات زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه سموم و همچنین جلوگیری از مقاوم شدن علف‌های هرز به علفکش‌ها می‌شود. این تحقیق با هدف مقایسه روش‌های شیمیایی و تلفیقی در استفاده از شعله‌افکن و علفکش و تاثیر آن بر علف‌های هرز در مزارع پنبه اجرا شد.</p>
تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۲/۲۷ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۴/۱	<p>مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار اجرا شد. استفاده از علفکش تریفلورالین به مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار (T)، استفاده از علفکش تریفلورالین به مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار + یک بار وجین در هفته هشتم پس از کاشت (T+H)، استفاده از علفکش تریفلورالین به مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار + شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر بوته پنبه (T+F₄₀)، استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀)، استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₄₀)، دو بار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀+F₄₀) و عدم کنترل علف‌های هرز (NC)، به عنوان تیمارهای آزمایشی بودند. در هر کرت، متغیرهای شاخص کنترل علف‌های هرز، وزن خشک علف‌های هرز، نسبت بوته‌های آسیب‌دیده پنبه در اثر استفاده از شعله‌افکن، ارتفاع بوته و عملکرد و نسبت اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل اقتصادی تیمارها به روش تحلیل نهایی نسبت منفعت به هزینه انجام شد.</p>
واژه‌های کلیدی: بوته آسیب‌دیده علفکش عملکرد نسبت منفعت به هزینه	<p>یافته‌ها: وزن خشک علف‌های هرز در تیمارهای F₄₀، F₂₀+F₄₀، T+F₄₀ و T+H، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد نداشت. بیشینه شاخص کنترل علف‌های هرز در تیمار F₂₀ با ۷۳/۵۰ درصد به دست آمد که با تیمار T+F₄₀ با ۶۴/۶۸ درصد در یک گروه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار F₂₀، آسیب به بوته‌های پنبه را نسبت به تیمار F₄₀ افزایش داد. در بین تیمارهای استفاده از شعله‌افکن، بیشترین مقدار عملکرد و نسبت بوته‌های آسیب‌دیده در تیمار F₄₀ با ۳۷۵۰ کیلوگرم بر هکتار بود که با تیمار T+F₄₀ با ۳۶۵۰ کیلوگرم بر هکتار اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد نداشت.</p> <p>نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری نسبت به ۲۰ سانتی‌متری بوته‌های پنبه، به دلیل آسیب کمتر به بوته و کنترل موثر علف‌های</p>

هرز، ارجحیت دارد. در بین تیمارهای استفاده از علفکش و شعله افکن، بیشترین عملکرد و ش پنبه در تیمارهای T+H و F40 به ترتیب با ۴۲۵۰ و ۳۷۵۰ کیلوگرم بر هکتار بود. از نظر اقتصادی نیز بازده ناخالص این دو تیمار در رتبه اول و دوم قرار داشت. بنابراین، در صورت نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی، تیمار T+H و در صورت در نظر گرفتن این ملاحظات، تیمار F40 توصیه می شود.

استناد: به آئین، محمدعلی؛ شیروانیان، عبدالرسول (۱۴۰۵). امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از شعله افکن در کنترل علف های هرز مزارع پنبه. *مجله پژوهش های پنبه / ایران*، ۱۴ (۱)، ۵۹-۴۱.



10.22092/ijcr.2026.372838.1257

© نویسندگان

ناشر: موسسه تحقیقات پنبه کشور



مقدمه

کنترل علف‌های هرز یکی از مهمترین مراحل تولید محصولات زراعی است. استفاده از علفکش‌ها، یک روش متداول برای کنترل علف‌های هرز است. ولی باید به عوارض استفاده از آن‌ها مانند آلودگی‌های زیست محیطی (خاک، آب‌های سطحی و زیرزمینی و امراض انسانی) نیز توجه نمود (وسزلاکی، ۲۰۰۷). علاوه بر این، استفاده از علف‌کش‌ها در طول سالیان متمادی، مقاومت علف‌های هرز را به دنبال داشته و استفاده از علفکش‌های جدید، هزینه‌های تولید را برای بهره‌برداران بالا می‌برد (اسنیوکا، ۲۰۰۸). با توضیحات بیان شده، استفاده از روش‌های مکانیکی به تنهایی یا تلفیق با روش‌های شیمیایی توجیه‌پذیر است. استفاده از شعله‌افکن، برای کنترل علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت استفاده از شعله‌افکن در کنترل طیف وسیع علف‌های هرز است؛ در صورتی که استفاده از علفکش‌ها برای استفاده از گیاهان مختلف با محدودیت همراه است. اساس کار شعله‌افکن گازی با گاز پروپان، افزایش دما در سلول گیاهی علف‌هرز و گسیختگی دیواره سلولی در اثر فشار می‌باشد (ریفای، ۲۰۰۳). لونی و لغوی (۲۰۱۴)، دو شعله‌افکن گسسته و پیوسته را در کنترل علف‌های هرز مزارع ذرت مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که در سرعت پیشروی ۰/۵ و ۰/۷ متر بر ثانیه، دقت کنترل علف‌های هرز از سرعت ۰/۹ متر بر ثانیه بیشتر است. همچنین کنترل علف‌های هرز در دو روش شعله گسسته و پیوسته مشابه بود. از نظر مقدار سوخت مصرفی، شعله‌افکنی گسسته هزینه کمتری را نسبت به شعله‌افکنی پیوسته داشت.

بخش مهمی از مصرف آفتکش‌ها، شامل مصرف علفکش‌ها است. دلایل مختلفی از جمله هزینه، خطرات زیست‌محیطی، افزایش مقاومت به علفکش‌ها و تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیک، محققان را به روش‌های دیگر کنترل علف‌های هرز ترغیب کرده است. یکی از مهمترین روش‌های کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز، استفاده از شعله افکن است که در صورت انجام عملیات مناسب،

خطرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد. استفاده از شعله‌افکن، در کنترل علف‌های هرز با ملاحظات همراه است. این ملاحظات شامل هزینه سوخت، اثرات مختلف بر گونه‌های مختلف علف‌های هرز، خطرات آتش‌سوزی و خطر اصابت شعله به گیاهان اصلی مزرعه است (پروزی، ۲۰۰۷).

اندازه نازل، نوع سوخت، دمای شعله، هوای اجباری یا طبیعی برای مخلوط‌شدن سوخت از متغیرهای مهمی هستند که بر عملکرد شعله‌افکن اثر دارند. کنترل علف‌های هرز با استفاده از شعله‌افکن، پس از کاشت می‌تواند برای گیاهانی مانند ذرت، سویا و سورگوم که به گرما مقاوم هستند، به کار رود (یولوا، ۲۰۱۱؛ یولوا، ۲۰۱۲؛ کنزویک، ۲۰۱۳). در یک آزمایش مزرعه‌ای از شعله‌افکنی نواری همراه با کولتیواتور برای کنترل علف‌های هرز سویا استفاده کرد. دو بار استفاده از شعله‌افکن، ۸۲-۸۰ درصد علف‌های هرز را کنترل نمود. مقدار آسیب به سویا ۹-۶ درصد گزارش شد. در شعله‌افکنی نواری، گیاه سویا بازیابی شد؛ در حالی که در شعله‌افکنی سراسری مزرعه، چنین نبود (استپانویچ، ۲۰۱۶).

زمان استفاده از شعله‌افکن بر کیفیت کنترل علف‌های هرز موثر است. نتایج یک تحقیق نشان داد که بذر گونه‌های مختلف گیاه بلوبری در صورت مواجهه-شدن با حرارت شعله‌افکن، ۹۰-۵۰ درصد جوانه‌زنی خود را از دست می‌دهند (وایت و بوید، ۲۰۱۶). در آزمایشی با استفاده از شعله محدود روی هدف، فاصله مطلوب شعله‌افکن بر علف‌هرز، ۲۵ سانتی‌متر بالای سطح زمین و زاویه ۳۰ درجه شعله‌افکن نسبت به سطح افق تشخیص داده شد. همچنین نتایج نشان داد که شعله‌افکنی مرحله اول از مرحله دوم و سوم موثرتر است (لونی و همکاران، ۲۰۱۴).

نتایج پژوهشی در مورد کنترل علف‌های هرز مزرعه ذرت و سویا با شعله‌افکن دستی و گاز پروپان نشان داد که استفاده از شعله‌افکن نباید در بعد از ظهر انجام شود. دلیل این امر کاهش آب برگ در این گیاهان بوده و در صورت استفاده از شعله‌افکن، تنش ایجاد می‌شود. همچنین گیاهان پهن برگ از گیاهان

باریک برگ در برابر حرارت شعله‌افکن حساس‌ترند (یولوا، ۲۰۱۲). در آزمایش دیگری نیز در باغ انگور نشان داده شد که استفاده از شعله‌افکن ۸۲ درصد باریک برگ‌ها و ۷۲/۵ درصد پهن برگ‌ها را از بین برده است (ساگلام، ۲۰۱۰).

آویشک (۲۰۱۲) برای کنترل علف‌های هرز مزرعه ذرت و سویا از شعله‌افکنی با گاز پروپان همراه با عملیات کولتیواتورزی استفاده نمود. نتایج آزمایش در ذرت نشان داد که ۹۰ درصد علف‌های هرز با روش شعله‌افکنی و استفاده از کولتیواتور کنترل شدند. همچنین از نظر مقدار محصول در سویا، عملکرد محصول با ۲/۸ تن بر هکتار، تفاوتی با روش تمام فصل کنترل علف‌های هرز نداشت.

در استفاده از شعله‌افکن، هزینه‌های اقتصادی باید در نظر گرفته شود. نتایج تحقیقات در این باره نشان می‌دهد که در مساحت‌های بین ۲۰-۶ هکتار، استفاده از شعله‌افکن، هزینه کمتری نسبت به روش‌های مکانیکی کنترل علف‌های هرز و سایر روش‌های کنترل شیمیایی با سموم علفکش دارد. همچنین در مساحت‌های کم، بهتر است از شعله‌افکن‌های پستی به جای شعله‌افکن‌های پشت تراکتوری استفاده کرد (کانگ، ۲۰۰۱).

عباس پور و همکاران (۲۰۱۳)، بیان داشتند که در کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز باغ‌های پسته، تفاوت معنی‌داری بین وزن خشک علف‌های هرز در استفاده از شعله‌افکن، مالچ پلاستیک و مالچ کاه و کلش به ترتیب با ۲۸، ۱۸ و ۲۲ گرم بر مترمربع وجود نداشت. همچنین تراکم علف‌های هرز بین کاربرد روش‌های ذکر شده به ترتیب ۱۱، ۱۰ و ۸ علف‌هرز بر مترمربع بود. از نظر هزینه‌های انجام شده، استفاده از شعله‌افکن با گاز، کمترین هزینه و هزینه مالچ پلاستیک بیشترین مقدار بود.

نتایج یک پژوهش نشان داد که در کنترل علف‌های هرز جوموشک^۱ در مزارع یونجه، تلفیق زمان برداشت و استفاده از شعله‌افکن، اثر مناسبی داشته است؛ به طوری که پس از تیمار شاهد (وجین دستی

علف‌های هرز)، تیمار استفاده از شعله‌افکن در مراحل ۲۰، ۳۰، و ۴۰ درصد گلدی به ترتیب ۸۲/۳۳، ۸۱/۵۴ و ۹۵/۱۱ درصد علف‌های هرز را در چین اول کنترل نمود. علف‌هرز جوموشک، گیاهی یکساله بوده که با بذر تکثیر می‌شود و شعله‌افکن می‌تواند روی این گونه علف‌های هرز تاثیرگذار باشد (رئوفی و همکاران، ۲۰۱۵).

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کاربرد شعله‌افکن در کنترل علف‌های هرزی که زودتر از گیاه اصلی در مزرعه رویش دارند، یک روش موثر است. دلیل این امر، عایق حرارتی بودن خاک بوده که به گیاه اصلی آسیب وارد نمی‌شود. مقدار رطوبت و باد نیز در عملکرد شعله‌افکن موثر است. خشک‌بودن گیاه و جهت باد از عواملی است که می‌تواند روی عملکرد شعله‌افکن موثر باشد (ماتچ، ۲۰۰۵). پژوهش‌های دیگری نشان می‌دهد که تاثیر استفاده از شعله‌افکن بر جمعیت میکروفلورای خاک و میکروارگانیزم‌ها اندک بوده و پس از مدتی جبران خواهد شد (اسنیاکا و پوکیوس، ۲۰۰۸).

در تحقیقی به منظور کنترل علف‌های هرز خردل وحشی^۲ در مزارع کلزا^۳ از شعله‌افکن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سرعت حرکت یک کیلومتر بر ساعت (۳/۶ متر بر ثانیه) در شعله‌افکن، در کنترل گیاهچه‌های خردل وحشی موثر بوده و عملکرد کلزا را افزایش می‌دهد (شیمی، ۲۰۰۱). در پژوهش دیگری، اثر شوک حرارتی شعله‌افکن بر سوختگی بذر خردل وحشی بررسی شد. پس از انجام تیمارهای شعله‌افکن، نتایج نشان داد که استفاده از شعله‌افکن در خاک‌های مرطوب و کلش‌دار، باعث سوختگی ۴۳ درصد بذرهای خردل وحشی شد که زیستایی خود را از دست دادند. اثر شعله‌افکن در تیمارهایی که خاک آن‌ها مرطوب بود، بیشتر از خاک‌های خشک گزارش شد (سلیمی و همکاران، ۲۰۱۲).

مقایسه روش‌های استفاده از شعله‌افکن و مالچ کلشی در کنترل علف‌های هرز مزارع توت فرنگی نشان داد

^۲ - *Sinapis arvensis* L.

^۳ - *Brassica napus* L.

^۱ - *Bromus danthoniae* Trin

که تفاوت معنی‌داری بین دو تیمار از نظر وزن خشک علف‌های هرز به ترتیب با ۶۱۰ و ۶۱۳ گرم بر مترمربع وجود نداشت. همچنین تراکم علف‌های هرز نیز در استفاده از شعله‌افکن، مالچ کلشی، مالچ سیاه و علفکش تری بنورون متیل با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشت؛ در حالی که استفاده از شعله‌افکن نسبت به سایر روش‌ها مقرون به صرفه‌تر بود (بابایی و همکاران، ۲۰۲۲).

در استفاده از شعله‌افکن، فشار گاز، فاصله شعله تا زمین و سرعت پیشروی از عوامل موثر در کارایی شعله‌افکن است. در پژوهشی، دو نوع شعله‌افکن با یک مشعل و دو مشعل در فشار گاز در بازه ۱، ۱/۵ و ۲ بار، فاصله مشعل تا زمین در ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متر و سرعت پیشروی ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲ و ۱/۵ کیلومتر بر ساعت مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق در کنترل علف‌های هرز باغ‌های زیتون و سیب نشان داد که استفاده از شعله‌افکن با دو مشعل در سرعت ۰/۶ کیلومتر بر ساعت، فشار گاز ۲ بار و فاصله مشعل ۱۵ سانتی‌متری تا زمین، از کارایی لازم در کنترل علف‌های هرز برخوردار بوده و ۸۶ درصد از علف‌های هرز را کنترل می‌کند. همچنین بیشترین بازده مزرعه‌ای نیز در این شعله‌افکن با ۸۳ درصد در سرعت ۱/۵ کیلومتر

بر ساعت گزارش شد (درس و بالا، ۲۰۱۶). با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، کاربرد شعله‌افکن در کنترل علف‌های هرز، یک روش غیر شیمیایی است که با رعایت ملاحظات در کاربرد (سرعت پیشروی، فاصله مشعل تا علف‌هرز، فشار گاز مشعل و ...)، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف علفکش‌ها را به دنبال دارد. این تحقیق با هدف مقایسه روش‌های شیمیایی (استفاده از علفکش تریفلورالین)، غیر شیمیایی (استفاده از شعله‌افکن) و تلفیقی (استفاده از شعله‌افکن و علفکش تریفلورالین)، در کنترل علف‌های هرز مزارع پنبه انجام شد.

مواد و روش‌ها

به منظور ارزیابی استفاده از شعله‌افکن برای کنترل علف‌های هرز مزارع پنبه، پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب استان فارس اجرا شد. برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، خاک مزرعه به آزمایشگاه خاک و آب ارسال و مقدار کود لازم براساس توصیه از منابع اوره و سوپر فسفات تریپل تامین شد. جدول ۱، مشخصات خاک مزرعه مورد آزمایش را نشان می‌دهد.

جدول ۱- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

عمق (Cm)	EC (dS/m)	pH	O.C (%)	فسفر قابل جذب (mg/kg)	پتاسیم قابل جذب (mg/kg)	سیلت (/.)	رس (/.)	شن (/.)	بافت خاک
۱۵-۰	۰/۵۲	۸/۰	۰/۵۲	۳/۷	۱۸۶	۴۲/۸	۱۹/۱	۳۶/۵	لومی
۳۰-۰	۰/۵۵	۸/۱	۰/۵۲	۳/۳	۱۸۲	۴۱/۲	۲۰/۱	۳۷/۹	لومی

آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش، استفاده از علفکش تریفلورالین به میزان ۲/۵ لیتر بر هکتار (T)، استفاده از علفکش تریفلورالین به مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار + یک بار وجین در هفته هشتم پس از کاشت (T+H)، استفاده از علفکش تریفلورالین به مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار + شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر بوته پنبه (T+F₄₀)، استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀)،

استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₄₀)، دو بار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀+F₄₀)، کنترل دستی تمام فصل علف‌های هرز (H) و عدم کنترل علف‌های هرز (NC) بود. در تیمار دو بار استفاده از شعله‌افکن، ابتدا شعله‌افکنی در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته‌های پنبه انجام شد و حدود سه هفته بعد نیز که ارتفاع بوته‌ها به ۴۰ سانتی‌متر رسید، مجدداً عملیات شعله‌افکنی صورت پذیرفت.

شعله‌افکن، از یک ماشین شعله‌افکن قابل حمل همراه با کپسول گاز مایع پروپان بر روی شاسی استفاده شد. مشعل گاز با یک لوله به کپسول متصل و در تمام تیمارها از فشار ۲ بار و فاصله مشعل ۱۵ سانتی‌متر تا علف‌های هرز استفاده شد (شکل ۱).

از آماده‌سازی زمین، کرت‌های آزمایش با طول ۱۰ متر و عرض ۳ متر تهیه شد. کرت‌ها شامل چهار خط کاشت پنبه به فاصله ۷۵ سانتی‌متر بود که بذر رقم بختگان با ردیف کار نئوماتیک شرکت تراشکده با فاصله بذر ۲۰ سانتی‌متر و به مقدار ۲۵ کیلوگرم بر هکتار کاشته شد. برای انجام تیمارهای استفاده از



شکل ۱- ردیف کار نئوماتیک در حال کاشت پنبه (سمت راست)، شعله افکن با مشعل قابل جابجایی (وسط) و کنترل علف‌های هرز با شعله‌افکن در مزرعه آزمایشی (سمت چپ)

مقدار ۲/۵ لیتر بر هکتار از محلول تجاری ۴۶ درصد بود. شناسایی فلور علف‌های هرز، برای کنترل علف‌های هرز مزارع ضروری است. علف‌های هرز غالب در مزرعه آزمایشی پنبه، در جدول ۲، نشان داده شده است.

بین تیمارها یک فاصله ۲ متری در نظر گرفته شد. بازه زمانی آبیاری کرت‌های آزمایشی در طول هر فصل رشد، هر هفت روز یک بار و در پایان فصل رشد به منظور بازشدن غوزه‌ها، این بازه به ۱۰ روز افزایش یافت. علفکش مورد استفاده در تیمارها، تریفلورالین به

جدول ۲- علف‌های هرز غالب مزرعه آزمایش

نام فارسی	نام تیره	نام علمی گونه
تاج خروس	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Amaranthus retroflexus</i>
خرفه	<i>Portulacaceae</i>	<i>Portulaca oleracea</i>
گال سرخ	<i>Poaceae</i>	<i>Echinocola colonum</i>
اویار سلام	<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus rotundus</i>

$$F = \frac{N_P - N_E}{N_P} \times 100 \quad (1)$$

F = درصد کنترل علف‌های هرز

N_P = تعداد علف‌های هرز قبل از استفاده از شعله‌افکن

N_E = تعداد علف‌های هرز بعد از استفاده از شعله‌افکن

برای ارزیابی تیمارها، متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:

شاخص کنترل علف‌های هرز: با استفاده از کادر ۰/۲۵ مترمربعی و در چهار تکرار، قبل و بعد از اجرای تیمارهای پژوهش، علف‌های هرز شمارش و بر اساس رابطه ۱، این شاخص اندازه‌گیری شد (رمسان و همکاران، ۲۰۰۷).

تعیین وزن خشک علف‌های هرز: در پایان فصل رشد، علف‌های هرز از هر کرت در چهار تکرار با کادر ۰/۲۵ مترمربعی (۰/۵ m × ۰/۵ m) برداشت شد. علف‌های هرز در دمای ۸۰ درجه سلسیوس و به مدت ۷۲ ساعت در آون نگهداری شد. سپس وزن خشک علف‌های هرز بعد از گذشت مدت زمان یک ساعت در بیرون آون با ترازوی دیجیتالی توزین شد (سماواتیان و همکاران، ۲۰۱۸).

نسبت بوته‌های آسیب‌دیده: ابتدا در هر کرت، تعداد بوته‌های پنبه شمارش شد. پس از انجام تیمارهای حاصل از شعله‌افکنی، تعداد بوته‌های پنبه آسیب‌دیده در هر کرت، شمارش و بر اساس درصدی از کل بوته‌های موجود در هر کرت بر اساس رابطه ۲، محاسبه شد (گرسوی و ازاسلان، ۲۰۲۱).

$$DP = P_2/P_1 \times 100 \quad (2)$$

DP = درصد کنترل علف‌های هرز

P_1 = تعداد بوته‌های پنبه قبل از اعمال تیمار

P_2 = تعداد بوته‌های پنبه آسیب‌دیده بعد از اعمال تیمار (رمسان و همکاران، ۲۰۰۷).

ارتفاع بوته: رقابت علف‌های هرز با گیاهان زراعی و از جمله پنبه، رشد رویشی و ارتفاع بوته را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر عملکرد محصول موثر است (سلیمی و همکاران، ۲۰۰۱؛ زند و همکاران، ۲۰۰۴). بنابراین، در پایان فصل از هر کرت، چهار بوته به طور تصادفی انتخاب و ارتفاع بوته تا سطح زمین اندازه‌گیری شد.

عملکرد وش پنبه: برداشت وش پنبه در یک چین در پایان فصل با کارگر انجام شد. برای این منظور، یک متر از بالا و پایین هر کرت و دو خط حاشیه حذف و وش موجود در دو خط وسط برداشت و با ترازوی دیجیتالی وزن شد.

تجزیه و تحلیل اقتصادی

روش تحلیل نهایی نسبت منفعت به هزینه^۱: به منظور تعیین مناسب‌ترین تیمار از بعد اقتصادی در بین تیمارهای مورد مطالعه و بررسی ارجحیت یا عدم

ارجحیت آن‌ها نسبت به تیمار شاهد، از روش تحلیل نهایی نسبت منفعت به هزینه استفاده شد. در این روش برای انتخاب سودآورترین تیمار، ابتدا میانگین منافع و هزینه تیمارهای مختلف محاسبه شد. سپس، نسبت نهایی منفعت به هزینه هر تیمار (نرخ سودآوری هر تیمار نسبت به شاهد)، طی مراحل زیر محاسبه شد:

۱- محاسبه اختلاف میانگین منافع هر یک از تیمارها از میانگین منافع تیمار شاهد:

$$\bar{B}_{ic} = \bar{B}_i - \bar{B}_c \quad (3)$$

$\bar{B}_{ic}$ = میانگین منافع تیمار i ام از میانگین منافع تیمار شاهد، $\bar{B}_i$ = میانگین منافع تیمار i ام، $\bar{B}_c$ = میانگین منافع تیمار شاهد

۲- محاسبه اختلاف میانگین هزینه هر یک از تیمارها از میانگین هزینه تیمار شاهد:

$$\bar{C}_{ic} = \bar{C}_i - \bar{C}_c \quad (4)$$

$\bar{C}_{ic}$ = اختلاف میانگین هزینه تیمار i ام از میانگین هزینه تیمار شاهد، $\bar{C}_i$ = میانگین هزینه تیمار i ام، $\bar{C}_c$ = میانگین هزینه تیمار شاهد

۳- محاسبه نرخ سودآوری هر یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد:

$$r_{ic} = ((\bar{B}_{ic} - \bar{C}_{ic}) / \bar{C}_{ic}) \times 100 = (\bar{B}_{ic} / \bar{C}_{ic}) - 1 \times 100 \quad (5)$$

r_{ic} = نرخ سودآوری تیمار i ام نسبت به تیمار شاهد بوده و سایر متغیرها قبلاً تعریف شده‌اند.

پس از محاسبه نرخ سودآوری تیمارهای مختلف، تیماری که دارای بالاترین نرخ سودآوری است، به عنوان تیمار برتر انتخاب و بقیه تیمارها بر اساس میزان نرخ سودآوری رتبه‌بندی شدند. در پایان، تمام نتایج پس از تجزیه واریانس، توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر تیمارهای آزمایش (روش کنترل)، بر وزن خشک علف‌های هرز، درصد آسیب به بوته‌های پنبه، ارتفاع بوته و عملکرد وش پنبه در سطح آماری یک درصد

¹ - Marginal benefit cost ratio analysis method

معنی‌دار بود. اما اثر متقابل سال و تیمار در تمام صفات اندازه‌گیری شده، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۳).

شاخص کنترل علف‌های هرز: در جدول ۴، تجزیه واریانس شاخص کنترل علف‌های هرز در استفاده از تیمارهای شعله‌افکن آمده است. اثر روش کنترل بر علف‌های هرز تاج خروس، خرفه، گال سرخ و اویارسلام در سطح یک درصد معنی‌دار بود. اما اثر متقابل سال و روش کنترل بر علف‌های هرز، تفاوت معنی‌داری نشان نداد.

جدول ۳- تجزیه واریانس مرکب اثر روش کنترل علف‌های هرز بر متغیرهای اندازه‌گیری شده

میانگین مربعات				درجات آزادی	منابع تغییر
عملکرد و ش پنبه (کیلوگرم بر هکتار)	ارتفاع بوته (سانتی‌متر)	آسیب به بوته‌های پنبه (درصد)	وزن خشک علف‌های هرز (کیلوگرم بر هکتار)		
۶۲۰۱۵۶/۲۵ ^{ns}	۳۱۹/۵۲ ^{ns}	۱۰۰/۷۸ ^{ns}	۳۸۲۲۰۲۵/۰۷ ^{ns}	۱	سال
۱۸۴۶۰۲/۰۸	۲۹/۷۰	۴/۱۶۷	۲۵۲۸۱۶۹/۷۹	۶	خطا
۲۰۲۷۷۷۲۰/۵۳ ^{**}	۱۴۹۳/۸۲ ^{**}	۸۸۶۷/۸۶ ^{**}	۲۵۵۳۱۳۳۹/۲۹ ^{**}	۷	تیمار (روش کنترل)
۹۹۹۵۶/۲۵ ^{ns}	۲۵/۹۸ ^{ns}	۲۸/۵۷ ^{ns}	۲۹۵۵۶۷/۸۶ ^{ns}	۷	سال × تیمار (روش کنترل)
۷۲۳۵۹/۲۳	۲۳/۸۸	۱۴/۸۸	۳۷۳۱۵۵/۵۱	۴۲	خطا
۱۰/۵۳	۶/۱۳	۱۵/۰۵	۳۰/۶۱		ضریب تغییرات

***: اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد، ns: عدم اختلاف معنی‌دار.


جدول ۴- تجزیه واریانس روش کنترل بر علف‌های هرز غالب مزرعه

میانگین مربعات				درجات آزادی	منابع تغییر
اویار سلام	گال سرخ	خرفه	تاج خروس		
۵/۹۵ ^{ns}	۳۷۶/۵۴ ^{ns}	۲۵۳۴/۶۱ ^{ns}	۵۷۹/۴۹ ^{ns}	۱	سال
۵۰۱/۷۲۲	۴۶/۵۲	۲۵۴/۰۹	۱۹۱/۰۹	۶	خطا
۸۹۰۱/۱۹ ^{**}	۱۰۷۱۲/۹۶ ^{**}	۹۴۳۳/۶۱ ^{**}	۹۲۰۳/۰۴ ^{**}	۵	تیمار (روش کنترل)
۲۱۰/۶۵ ^{ns}	۱۰۲/۰۸ ^{ns}	۸۴۸/۸۴ ^{ns}	۷۴/۵۲ ^{ns}	۵	سال × تیمار (روش کنترل)
۴۱۱/۵۹	۲۵۶/۲۷	۴۳۵/۹۱۱	۹۴/۹۷	۳۰	خطا
۳۵/۹۸	۲۲/۲۴	۳۵/۳۱	۱۴/۹۲		ضریب تغییرات

میانگین‌های با حروف یکسان اختلاف معنی‌دار ندارند (دانکن /۵).

سانتی‌متری ارتفاع پنبه ($T+F_{40}$)، میانگین $۶۴/۶۸$ درصد کنترل را به همراه داشت که اختلاف معنی‌داری را در سطح یک درصد با دو تیمار استفاده صرف از شعله‌افکن F_{20} و F_{40} بر جای گذاشت. در بین تیمارهایی که در آن‌ها شعله‌افکن استفاده شد، کمترین درصد کنترل علف‌های هرز مربوط به تیمار استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه (F_{40}) بود (شکل ۲).

تیمار استفاده از شعله‌افکن در تیمار ۲۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه (F_{20})، بیشترین درصد کنترل کل علف‌های هرز با میانگین $۷۳/۵$ درصد داشت. پس از این تیمار، دو بار استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه ($F_{20}+F_{40}$)، با $۷۲/۰۲$ درصد کنترل و عدم اختلاف معنی‌دار با تیمار F_{20} در جایگاه دوم قرار گرفت. تیمار تلفیق علفکش تریفلورالین و استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰



شکل ۲- مقایسه میانگین شاخص کنترل علف‌های هرز
میانگین‌های با حروف یکسان اختلاف معنی‌داری ندارند (دانکن ۵٪).

اردیبهشت ماه، تفاوت معنی‌داری با وجین دستی در کنترل علف‌های هرز نداشت.

وزن خشک علف‌های هرز: مقایسه میانگین داده‌های به دست آمده از تیمارهای آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار وزن خشک علف‌های هرز مربوط به تیمار عدم کنترل علف‌های هرز (NC) و کمترین مقدار نیز در تیمار وجین در کل دوره رویش پنبه (H) به ترتیب با ۴۷۱۰ و صفر کیلوگرم بر هکتار بود (جدول ۵).

در تیمار استفاده از ۲/۵ لیتر بر هکتار تریفلورالین + یک بار وجین در هفته هشتم (T+H)، وزن خشک علف‌های هرز ۶۹۰ کیلوگرم بر هکتار بود. این تیمار تفاوت معنی‌داری را در سطح ۵ درصد با تیمارهای استفاده از تریفلورالین و استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه (T+F₄₀)، تیمار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀+F₄₀) و نیز تیمار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₄₀) از خود نشان نداد. دو تیمار استفاده از تریفلورالین (T) و استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری (F₂₀)، به ترتیب با ۳۸۷۵ و ۳۶۵۰ کیلوگرم بر هکتار نیز تفاوت معنی‌داری در سطح ۵ درصد نداشتند. مقدار وزن خشک علف‌های هرز در این دو تیمار از سایر تیمارهای استفاده از شعله‌افکن، شعله‌افکن به همراه علفکش تریفلورالین و تریفلورالین به همراه

با توجه به نتایج به دست آمده، باید به زمان استفاده از شعله‌افکن، تلفیق استفاده از شعله‌افکن با علفکش و تعداد دفعات کاربرد شعله‌افکن در کنترل علف‌های هرز توجه داشت. در تیمار F₂₀، با توجه به این که ارتفاع بوته پنبه ۲۰ سانتی‌متر بود و علف‌های هرز نیز در مراحل اولیه رشد بودند، استفاده از شعله‌افکن نتایج اولیه مطلوبی در کنترل علف‌های هرز داشت. با افزایش رشد علف‌های هرز، استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه (F₄₀)، ۶۰/۰۳ درصد علف‌های هرز را کنترل نمود. تلفیق علفکش تریفلورالین به همراه استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه، در کنترل علف‌های هرز موفق‌تر از تیمار F₄₀ عمل نمود که آن هم به دلیل استفاده از علفکش تریفلورالین بود. نتایج تحقیقات سایر محققان نیز نشان داد که سوزاندن علف‌های هرز با استفاده از شعله‌افکن، یک روش مهم در کنترل علف‌های هرز است که باعث سوزاندن اندام‌های علف‌هرز و از بین بردن آنزیم‌ها و متابولیسم گیاه می‌شود و گیاه بعد از چند ساعت از بین می‌رود. با اینحال به زمان کاربرد شعله‌افکن نیز باید توجه شده و شعله‌افکنی در گونه‌های مختلف علف‌های هرز، قبل از گلدهی باشد (عباس پور و همکاران، ۲۰۱۳). قربانی و همکاران (۲۰۱۰) نیز بر استفاده از شعله‌افکن در زمان مناسب تاکید داشته و اظهار داشتند که در کنترل علف‌های هرز زیره سبز، استفاده از شعله‌افکن در

علف‌های هرز مهم دانسته و تاکید نمودند که کنترل گونه‌های علف‌های هرز با شعله‌افکن باید قبل از گلدهی و قبل از به بذرنشستن باشد. استفاده از شعله-افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه ($F_{20}+F_{40}$)، با وزن خشک علف‌های هرز ۸۰۵ کیلوگرم بر هکتار، تاثیر بیشتری در کنترل علف‌های هرز نسبت به استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه و علف‌کش تریفلورالین ($T+F_{40}$) و وزن خشک علف‌های هرز ۹۵۰ کیلوگرم بر هکتار بر جای گذاشت (جدول ۵).

وجین علف‌های هرز در هفته هشتم بیشتر بود. نتایج به دست آمده نشان داد که زمان استفاده از شعله‌افکن در کنترل علف‌های هرز موثر است. این نتیجه در کاربرد استفاده از شعله‌افکن در تیمار ۲۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه و تیمار شعله‌افکن در ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه مشخص است. با مراجعه به شکل ۲، با این که در تیمار F_{20} ، شاخص کنترل علف‌های هرز از تیمار F_{40} بیشتر است، ولی رشد مجدد علف‌های هرز باعث شده که وزن خشک علف‌های هرز در تیمار F_{20} ، از تیمار F_{40} بیشتر باشد. جیمز و همکاران (۲۰۰۲)، زمان استفاده از شعله‌افکن را در کنترل

جدول ۵- مقایسه میانگین وزن خشک علف‌های هرز در تیمارهای مختلف

وزن خشک علف‌های هرز (کیلوگرم بر هکتار)	تیمار
۳۸۷۵ ^b	علف‌کش تریفلورالین (T)
۶۹۰ ^c	علف‌کش تریفلورالین + یک بار وجین در هفته هشتم (T+H)
۹۵۰ ^c	علف‌کش تریفلورالین + شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه ($T+F_{40}$)
۳۶۵۰ ^b	شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F_{20})
۱۲۸۵ ^c	شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F_{40})
۸۰۵ ^c	دو بار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه ($F_{20}+F_{40}$)
. ^d	کنترل تمام فصل علف‌های هرز (شاهد) (H)
۴۷۱۰ ^a	عدم کنترل علف‌های هرز (شاهد) (NC)

میانگین‌های با حروف یکسان اختلاف معنی‌دار ندارند (دانکن ۵٪).

به تنهایی یا استفاده از تریفلورالین به همراه وجین علف‌های هرز باشد.

نسبت آسیب به بوته‌های پنبه: مقایسه میانگین تیمارهای مربوط به آسیب به بوته‌های پنبه نسبت به شاهد کنترل تمام فصل علف‌های هرز نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه ($F_{20}+F_{40}$)، با ۷۵/۵ درصد آسیب به بوته‌ها بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد با تیمار شعله‌افکنی در مرحله ۲۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته (F_{20})، با ۷۵ درصد آسیب نداشت (جدول ۶). همچنین مقایسه این دو تیمار نشان داد که شعله‌افکنی در زمانی که بوته‌ها در مراحل اولیه رشد قرار دارند، به بوته‌ها آسیب وارد می‌کند. درصد آسیب وارد شده به بوته‌های پنبه در

نتایج یک بررسی در استفاده از شعله‌افکن و کاربرد انواع مالچ‌ها (پلاستیک شفاف، تیره و کاه و کلش) در کنترل علف‌های هرز مزارع توت فرنگی نشان داد که تفاوتی بین استفاده از شعله‌افکن و مالچ وجود نداشته و با توجه به هزینه‌های زیادتر استفاده از مالچ، شعله-افکن می‌تواند در کنترل علف‌های هرز، جایگزین انواع مالچ شود (بابایی و همکاران، ۲۰۲۲). در تحقیق دیگری در گیاه زیره سبز نیز نشان داده شد که در صورت کنترل علف‌های هرز در زمان شاخه‌دهی، تاثیر استفاده از شعله‌افکن از وجین دستی علف‌های هرز بیشتر بوده است (قربانی و همکاران، ۲۰۱۰). به این ترتیب در راستای اهداف کشاورزی پایدار و توسعه محور و نیز سیاست کاهش مصرف علف‌کش‌ها، استفاده از شعله‌افکن، می‌تواند جایگزین استفاده از تریفلورالین

تیمار شعله افکنی در ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه
 (F₄₀)، با ۲۵ درصد آسیب نیز این موضوع را تایید
 می کند؛ چرا که در این تیمار، بوته ها، ارتفاع و رشد
 رویشی بیشتری داشته و استفاده از شعله افکن را
 نسبت به ارتفاع ۲۰ سانتی متری بوته پنبه، بیشتر
 تحمل می نمایند.

جدول ۶- مقایسه میانگین آسیب به بوته های پنبه در تیمارهای مختلف

تیمار	آسیب به بوته های پنبه (درصد)
علفکش تریفلورالین (T)	c
علف کش تریفلورالین + یک بار وجین در هفته هشتم (T+H)	c
علفکش تریفلورالین + شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری بوته پنبه (T+F ₄₀)	b ۲۷/۵
شعله افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی متری بوته پنبه (F ₂₀)	a ۷۵/۰
شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری بوته پنبه (F ₄₀)	b ۲۵/۰
دو بار استفاده از شعله افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی متری بوته پنبه (F ₂₀ +F ₄₀)	a ۷۵/۵
کنترل تمام فصل علف های هرز (شاهد) (H)	d
عدم کنترل علف های هرز (شاهد) (NC)	a

میانگین های با حروف یکسان اختلاف معنی دار ندارند (دانکن ۵/۰).

ارتفاع بوته پنبه و عملکرد محصول: نتایج
 میانگین های به دست آمده از ارتفاع بوته پنبه و
 عملکرد وش پنبه در جدول ۷، نشان داده شده است.
 در بین تیمارهای استفاده از شعله افکن، بیشترین
 ارتفاع بوته پنبه مربوط به استفاده از علفکش
 تریفلورالین به همراه شعله افکن در ارتفاع ۴۰
 سانتی متری بوته پنبه با ۹۱/۱۳ سانتی متر بود که
 اختلاف معنی داری را در سطح ۵ درصد با تیمار وجین
 در کل دوره رویش با ارتفاع بوته ۹۱/۲۵ سانتی متر
 نشان نداد. تیمار استفاده از شعله افکن در ارتفاع ۴۰
 سانتی متری بوته، استفاده از تریفلورالین به تنهایی و
 تیمار استفاده از تریفلورالین و وجین علف های هرز در
 هفته هشتم نیز به ترتیب با ۸۷/۸۸، ۸۸/۲۵ و ۸۹/۱۳
 سانتی متر ارتفاع بوته پنبه و عدم اختلاف معنی دار در
 سطح ۵ درصد با تیمار وجین در کل دوره رویش در
 رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین ارتفاع بوته نیز
 مربوط به تیمار عدم کنترل علف های هرز با ۶۱/۷۵
 سانتی متر بود که اختلاف معنی داری در سطح ۵
 درصد با تیمار استفاده از شعله افکن در مرحله ۲۰
 سانتی متری ارتفاع بوته پنبه نداشت. در تیمار F₂₀،
 گیاه پنبه رشد کافی نداشته و حرارت حاصل از
 شعله افکن، آسیب ۷۵ درصدی را به گیاه وارد نمود
 (جدول ۶). همچنین در تیمار عدم کنترل علف های

تلفیق استفاده از علفکش تریفلورالین و شعله افکن در
 مرحله ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه نیز با ۲۷/۵
 درصد آسیب به بوته های پنبه تفاوت معنی داری را در
 سطح ۵ درصد با تیمار F₄₀، نشان نداد. با توجه به
 نتایج به دست آمده از تیمارهای مختلف و به منظور
 کاهش آسیب به بوته های پنبه (جدول ۶)، و نیز نتایج
 وزن خشک علف های هرز (جدول ۵)، باید تیماری
 انتخاب شود که هر دو مزیت کاهش درصد آسیب به
 بوته های پنبه و کاهش وزن خشک علف های هرز را به
 دنبال داشته باشد. با توجه به جدول ۵، وزن خشک
 علف های هرز در تیمار شعله افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰
 سانتی متری بوته پنبه (F₂₀+F₄₀)، تیمار تلفیقی
 علفکش تریفلورالین و شعله افکن در ارتفاع ۴۰
 سانتی متری بوته پنبه (T+F₄₀) و تیمار شعله افکن در
 ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه (F₄₀)، به ترتیب
 ۸۰۵، ۹۵۰ و ۱۲۸۵ کیلوگرم بر هکتار بود. همچنین
 کمترین درصد آسیب به بوته های پنبه نیز در
 تیمارهای استفاده از شعله افکن در تیمار F₄₀، به
 دست آمد. بنابراین، تیمار کاربرد شعله افکن در ارتفاع
 ۴۰ سانتی متری بوته پنبه (F₄₀)، نسبت به سایر
 تیمارها در کنترل علف های هرز مزارع پنبه ارجحیت
 دارد.

هرز، رشد علف‌های هرز، باعث کاهش ارتفاع بوته‌های پنبه شد. در تیمار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته‌های پنبه نیز، استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری، دلیل اصلی کاهش ارتفاع بوته (۶۶ سانتی‌متر) در این تیمار بود. این مورد توسط سایر محققان نیز تایید شده است. نجار و همکاران (۲۰۲۳) اظهار داشتند که اگر به هر دلیلی برگ‌ها دچار آسیب شوند، ادامه رشد رویشی فراهم نشده و کاهش ارتفاع بوته را به دنبال خواهد داشت.

بیشترین عملکرد وش پنبه در تیمار وجین در کل دوره رویش (H) با ۴۴۰۰ کیلوگرم بر هکتار به دست آمد. این تیمار اختلاف معنی‌داری (در سطح پنج درصد) با تیمار استفاده از علفکش تریفلورالین و یک بار وجین در هفته هشتم (T+H) با عملکرد ۴۲۵۰ کیلوگرم بر هکتار، نداشت. در بین تیمارهای استفاده

از شعله‌افکن، بیشترین عملکرد وش پنبه مربوط به استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₄₀) و به مقدار ۳۷۵۰ کیلوگرم بر هکتار بود. این تیمار اختلاف معنی‌داری را در سطح پنج درصد با تیمار تلفیقی استفاده از علفکش تریفلورالین و شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (T+F₄₀) و عملکرد وش ۳۶۵۰ کیلوگرم بر هکتار، نداشت. کمترین مقدار تولید وش در دو تیمار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀) و تیمار شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F₂₀+F₄₀)، به ترتیب با ۹۲۵ و ۱۲۴۰ کیلوگرم بر هکتار به دست آمد. کاهش ارتفاع بوته در این دو تیمار در اثر استفاده از تیمارهای شعله‌افکن در ابتدای دوره رویش، کاهش عملکرد وش پنبه را به دنبال داشت (جدول ۷).

جدول ۷- مقایسه میانگین ارتفاع بوته و عملکرد وش پنبه در تیمارهای مختلف

تیمار	ارتفاع بوته (سانتی‌متر)	عملکرد وش پنبه (کیلوگرم بر هکتار)
علفکش تریفلورالین (T)	۸۸/۲۵ ^a	۱۵۰۰ ^c
علفکش تریفلورالین + یک بار وجین در هفته هشتم (T+H)	۸۹/۱۳ ^a	۴۲۵۰ ^a
علفکش تریفلورالین + شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (T+F ₄₀)	۹۱/۱۳ ^a	۳۶۵۰ ^b
شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F ₂₀)	۶۲/۲۵ ^b	۹۲۵ ^d
شعله‌افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F ₄₀)	۸۷/۸۸ ^a	۳۷۵۰ ^b
دو بار استفاده از شعله‌افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری بوته پنبه (F ₂₀ +F ₄₀)	۶۶/۰۰ ^b	۱۲۴۰ ^c
کنترل تمام فصل علف‌های هرز (شاهد) (H)	۹۱/۲۵ ^a	۴۴۰۰ ^a
عدم کنترل علف‌های هرز (شاهد) (NC)	۶۱/۷۵ ^b	۷۲۷ ^d

میانگین‌های با حروف یکسان اختلاف معنی‌دار ندارند (دانکن ۵/۰).

افشار و مهرآبادی (۲۰۰۳)، ضریب همبستگی مثبت و معنی‌دار را بین ارتفاع بوته پنبه و عملکرد وش پنبه گزارش نمودند. همچنین نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داد که ارتفاع بیشتر بوته، چه در نتیجه افزایش فاصله میان گره‌ها و چه تعداد گره‌ها در ساقه، باعث توزیع بهتر نور و تولید شاخه‌زایی بیشتر شده و در نهایت افزایش عملکرد را به دنبال دارد (مهرآبادی ۲۰۱۶؛ باقرآبادی ۲۰۱۹).

محاسبات اقتصادی: به منظور تعیین مناسب‌ترین تیمار از نظر اقتصادی و تعیین ارجحیت یا عدم ارجحیت هر یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد، به بررسی درآمدها، هزینه‌ها و بازده ناخالص آن‌ها مبادرت شد. از آنجا که در شرایط معمول و متداول بین زارعین، کنترل علف‌های هرز به عنوان شیوه رایج در کشت محصول پنبه می‌باشد، تیمار وجین در کل دوره رویش (H)، به عنوان تیمار شاهد در ارزیابی اقتصادی تیمارهای مورد مطالعه مورد توجه قرار

گرفت. از طرف دیگر، با توجه به این که میزان مصرف سموم، اجرای عملیات سمپاشی، اجرای عملیات وجین، و نیز استفاده از شعله افکن در تیمارهای مختلف با یکدیگر متفاوت بود، این موارد موجب ایجاد اختلاف در هزینه های کنترل علف های هرز در قالب هزینه های خرید سم، هزینه عملیات سمپاشی، هزینه نیروی کار و هزینه گاز مصرفی تیمارهای مورد مطالعه شده و در نهایت اختلاف در مجموع هزینه های کنترل علف های هرز را در پی داشت. در جدول ۸، میانگین هزینه های کنترل علف های هرز در تیمارهای مختلف ارائه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول یادشده، تیمار شاهد (H) که وجین در کل دوره رویش گیاه زراعی می باشد، با هزینه ای معادل ۶۰۰ میلیون ریال، بیشترین هزینه کنترل را در بین تیمارهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب تیمارهای استفاده از علفکش تریفلورالین و یکبار وجین در هفته هشتم (T+H)، استفاده از علفکش تریفلورالین و استفاده از شعله افکن در مرحله ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه (T+F₄₀)، استفاده از شعله افکن در مرحله ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه (F₄₀)، استفاده از علفکش تریفلورالین (T) و استفاده از شعله افکن در مرحله ۲۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه (F₂₀) به

ترتیب با هزینه ای معادل ۲۲۳/۵، ۵۹/۴، ۳۱/۱، ۲۹/۲ و ۲۰/۷ میلیون ریال قرار گرفته اند. تیمار عدم کنترل علف های هرز نیز هیچ گونه هزینه ای را به همراه نداشته است.

لازم به ذکر است در تیمار F₄₀، به دلیل آن که علف های هرز، مدت زمان بیشتری برای رشد در مزرعه پنبه نسبت به تیمار F₂₀ در اختیار داشتند، از تراکم و حجم بیشتری در مزرعه برخوردار بودند. بنابراین، مدت زمان استفاده از نیروی کار و میزان گاز مصرفی برای کنترل علف هرز در تیمار F₄₀ بیشتر از تیمار F₂₀ شد. به طوری که، هزینه نیروی کار در تیمار F₂₀ معادل ۱۲/۵۰ میلیون ریال و در تیمار F₄₀ معادل ۲۰/۳۱ میلیون ریال بود. همچنین، هزینه گاز مصرفی در تیمار F₂₀ معادل ۸/۲۷ میلیون ریال و در تیمار F₄₀ معادل ۱۰/۸۸ میلیون ریال به دست آمد. مجموعه این موارد موجب گردید که هزینه کنترل علف های هرز در تیمار F₄₀، ۱۰/۴۲ میلیون ریال بیشتر از هزینه کنترل در تیمار F₂₀ شود.

بر این اساس، تیمار عدم کنترل (NC)، کمترین و تیمار وجین در کل دوره رویش (H)، بیشترین هزینه کنترل علف هرز را بر فرآیند تولید محصول پنبه تحمیل نموده و سایر تیمارها از این نظر، در دامنه بین این دو تیمار قرار گرفته اند.

جدول ۸- میانگین هزینه های کنترل علف های هرز در تیمارهای مختلف در دوره مورد مطالعه (هزار ریال بر هکتار)

تیمار	هزینه سم	هزینه سمپاشی	هزینه نیروی کار	هزینه گاز مصرفی	مجموع هزینه های کنترل
T	۱۴۲۵۰	۱۵۰۰۰	۰	۰	۲۹۲۵۰
T+H	۱۴۲۵۰	۱۵۰۰۰	۱۹۴۲۷۰	۰	۲۲۳۵۲۰
T+F ₄₀	۱۴۲۵۰	۱۵۰۰۰	۱۹۲۷۰	۱۰۹۰۲	۵۹۴۲۲
F ₂₀	۰	۰	۱۲۵۰۰	۸۲۷۳	۲۰۷۷۳
F ₄₀	۰	۰	۲۰۳۱۳	۱۰۸۸۱	۳۱۱۹۴
F ₂₀ +F ₄₀	۰	۰	۳۸۵۴۲	۸۵۹۰	۴۷۱۳۲
H	۰	۰	۶۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰
NC	۰	۰	۰	۰	۰

با توجه به این که انجام هر یک از عملیات های کنترل علف های هرز بر روی عملکرد محصول زراعی تاثیر داشته است، این موضوع در جدول شماره ۹، به عنوان درآمد حاصل از کشت محصول پنبه با توجه به هر یک از تیمارهای کنترل علف های هرز مورد توجه قرار گرفته است.

نتایج مربوط به تیمارهای واقع شده در منتهی الیه‌های درآمد‌های حاصله، مشابه وضعیت هزینه‌های کنترل علف‌های هرز می‌باشد. بدین ترتیب که، تیمار وجین در کل دوره رویش (H)، با درآمدی معادل ۲۹۲۶ میلیون ریال، بیشترین و تیمار عدم کنترل علف‌های هرز (NC)، با درآمدی معادل ۴۸۳/۷ میلیون ریال، کمترین درآمد را در پی داشته است. درآمد حاصل از سایر تیمارها نیز به گونه‌ای بوده که آن‌ها را بینابین این دو تیمار قرار داده است. بر این اساس می‌توان دریافت که هرچند عدم کنترل علف‌های هرز موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، اما این امر دارای تاثیرات نامطلوب بر درآمد فعالیت زراعی است. از طرف دیگر، کنترل علف‌های هرز نیز، هرچند موجب تحمیل هزینه بر فرآیند تولید می‌شود، اما افزایش درآمد را در پی دارد. بدین ترتیب، به منظور انتخاب

مناسب‌ترین گزینه و تیمار مورد مطالعه، توجه همزمان به هزینه‌های کنترل علف‌های هرز و درآمد‌های تولید ضروری است. این موضوع در قالب بازده ناخالص تیمارهای مورد مطالعه بررسی شد.

جدول ۹، در ستون‌های پنجم تا هشتم به ارائه بازده ناخالص تیمارهای مورد مطالعه و تغییرات آن نسبت به بازده ناخالص تیمار شاهد و در نهایت رتبه‌بندی تیمارها با توجه به این موضوع پرداخته است. بر این اساس، هرچند تیمار عدم کنترل علف‌های هرز، هیچ گونه هزینه‌ای را بر تولید تحمیل نمی‌نماید، اما از آنجا که افت شدید عملکرد و در نتیجه کاهش شدید درآمد را به همراه دارد، پایین‌ترین سطح بازده ناخالص را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب، پایین‌ترین رتبه را از این دیدگاه در بین تیمارهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

جدول ۹- کل درآمد، کل هزینه کنترل علف‌های هرز، میزان سودآوری، تغییرات سودآوری (بازده ناخالص) و رتبه‌بندی تیمارها

تیمار	مقدار (هزار ریال)	رتبه‌بندی	مقدار (هزار ریال)	رتبه‌بندی	بازده ناخالص تیمارها	
					نسبت تغییرات در تیمارها	
					نسبت به شاهد	رتبه‌بندی
					مقدار تغییرات (هزار ریال)	نرخ تغییرات (درصد)
T	۲۹۲۵۰	۳	۹۹۷۵۰۰	۵	۹۶۸۲۵۰	-۵۸/۳۷۳
T+H	۲۲۳۵۲۰	۷	۲۸۲۶۲۵۰	۲	۲۶۰۲۷۳۰	۱۱/۸۹۷
T+F ₄₀	۵۹۴۲۲	۶	۲۴۲۷۲۵۰	۴	۲۳۶۷۸۲۸	۱/۷۹۸
F ₂₀	۲۰۷۷۳	۲	۶۱۵۱۲۵	۷	۵۹۴۳۵۲	-۷۴/۴۴۷
F ₄₀	۳۱۱۹۴	۴	۲۴۹۳۷۵۰	۳	۲۴۶۲۵۵۶	۵/۸۷۱
F ₂₀ +F ₄₀	۴۷۱۳۲	۵	۸۲۴۶۰۰	۶	۷۷۷۴۶۸	-۶۶/۵۷۵
H	۶۰۰۰۰	۸	۲۹۲۶۰۰۰	۱	۲۳۲۶۰۰۰	.
NC	.	۱	۴۸۳۷۸۷	۸	۴۸۳۷۸۷	-۷۹/۲۰۱

به این ترتیب، می‌توان چنین استنباط نمود که کنترل علف‌های هرز برای افزایش بازده اقتصادی فعالیت زراعی تولید پنبه، یکی از ضرورت‌های فرآیند تولید است. از طرف دیگر، با اعمال مدیریت در کنترل علف‌های هرز می‌توان توازن بین هزینه‌ها و درآمد‌ها را به گونه‌ای برقرار نمود که بازده بیشتری را نسبت به وجین علف‌های هرز در کل دوره رویش به دست آورد.

علاوه بر آن، رتبه‌بندی بازده ناخالص اقتصادی نشان می‌دهد که تیمارهای استفاده از علفکش تریفلورالین همراه با وجین در هفته هشتم (T+H) و تیمار استفاده از شعله‌افکن در مرحله ۴۰ سانتی‌متری ارتفاع بوته پنبه (F₄₀)، به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را بین تیمارهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده‌اند.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از شعله افکن با در نظر گرفتن ملاحظات آسیب به گیاه و دقت لازم در هنگام استفاده از این وسیله، می تواند به عنوان یک روش مناسب در کنترل علف های هرز مزارع پنبه به کار رود. نتایج نشان داد که استفاده از شعله افکن در مرحله ۲۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه (F_{20})، درصد کنترل علف های هرز بالاتری به دلیل کوچک بودن این علف ها داشت؛ اما به دلیل رشد مجدد علف های هرز در طول دوره رشد و آسیب به بوته های پنبه در اثر استفاده از شعله افکن و عدم توانایی بازیافت بوته ها در رقابت با علف های هرز، بیشترین وزن خشک علف های هرز در بین تیمارهای استفاده از شعله افکن را به خود اختصاص داد. داده های به دست آمده از درصد کنترل و وزن خشک علف های هرز در استفاده از شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری بوته های پنبه (F_{40})، و استفاده از شعله افکن در ارتفاع ۲۰ و ۴۰ سانتی متری بوته های پنبه ($F_{20}+F_{40}$)، نشان داد که کاربرد شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری نسبت به ارتفاع ۲۰ سانتی متری موثرتر است. تیمار

استفاده از شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری بوته ها (F_{40})، عملکرد و ش پنبه بیشتری نسبت به تیمار استفاده از تریفلورالین به همراه شعله افکن در ارتفاع ۴۰ سانتی متری بوته ها ($T+F_{40}$)، داشت. بر اساس محاسبات اقتصادی، در صورت عدم وجود محدودیت در استفاده از علف کش (نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی)، استفاده از علف کش همراه با وجین، مناسبترین شیوه از نظر اقتصادی است. اما چنانچه به دلایل زیست محیطی، استفاده از علف کش ها محدود گردد، استفاده از شعله افکن در مرحله ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه، مناسبترین شیوه کنترل علف های هرز مزارع پنبه از نظر اقتصادی خواهد بود. بر اساس محاسبات اقتصادی، در صورت عدم وجود محدودیت در استفاده از علف کش (نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی)، استفاده از علف کش همراه با وجین، مناسبترین شیوه از نظر اقتصادی است. اما چنانچه به دلایل زیست محیطی، استفاده از علف کش ها محدود گردد، استفاده از شعله افکن در مرحله ۴۰ سانتی متری ارتفاع بوته پنبه، مناسبترین شیوه کنترل علف های هرز مزارع پنبه از نظر اقتصادی خواهد بود.

منابع

- Abbaspoor, M., Chitband, A.A., Rajabzadeh, M., and Ganjimoghadam, E. 2013. Non-chemical methods of weed control in pistachio (*Pistachio vera*) garden in Feyzabad region. *Iranian Plant Protection Research*, 27(2): 222-230. (in Persian with English abstract).
- Afshar, H., and Mehrabadi, H.R. 2003. Investigation of different method of alternate furrow irrigation on water use and cotton responses. Final report, Agricultural Engineering Research Institute Press, Karaj, Iran. (In Persian with English abstract).
- Avishek, D., Stepanovic, S., Neilson, B., Bruening, C., Gogos, G., and Knezevic, S. 2012. Effect of flaming and cultivation on weed control and yield in maize and soybean. Pp. 61-66. *In: Proceedings 1st International Conference on Robotics and Associated High-Technologies and Equipment For Agriculture. Applications of Automated Systems and Robotics for Crop Protection in Sustainable Precision Agriculture*, 19-21 Sep., Pisa, Italy.
- Babaei, S., Ahmadi, S., Amanollahi, S.H., Tahmasebi, I. 2022. Efficiency of chemical and non-chemical weed control approaches in strawberry (*Fragaria ananassa*) fields in Kurdistan. *Iranian Journal of Weed Science*, 18(1): 11-22. (in Persian with English abstract).
- Bagherabadi, H., Armin, M., and Filehkesh, E. 2019. The effect of planting date on yield and yield components of cotton under common cultivation conditions and cultivation with very short row spacing. *Iranian Journal of Cotton Researches*, 7(1): 1-14. (In Persian with English abstract).
- Dress, A., and Balah, M.A. 2016. Using flame for weed control in some crops. *Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering*, 7(10): 751- 756.

- Ghorbani, R., Koocheki, A., Hosseini, A., Jahani, M., Asadi, Gh., Aghel, H., and Mohammadabadi, A.A. 2010. Effects of planting date, time and methods of weed control on weed density and biomass in cumin fields. *Iranian Journal of Field Crops Research*, 8(1): 120-127. (In Persian with English abstract).
- Gursoy, S., and Ozaslan, C. 2021. Evaluating the Performance of Rotary and Tine Inter-Row Cultivators at Different Working Speeds. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 23(6): 1255-1267.
- James B., Atcha-Ahowe, C., Godonou, I., Baimey, H., Goergen, H., Sikirou, R., and Toko, M. 2002. Integrated crop and pest management guidelines for commercial vegetable production. International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Nigeria, 120 pp.
- Kang, W.S. 2001. Development of a flame weeder. *Transactions of the American Society of Agricultural Engineers*, 44: 1065-1070.
- Knezevic, S.Z., Stepanovic, S., Datta, A., Nedeljkovic, D., and Tursun, N. 2013. Soybean yield and yield components as influenced by the single and repeated flaming. *Crop Protection*, 50: 1-5.
- Loni, R., and Loghavi, M. 2014. Development and evaluation of a gas flamer with the ability of targeted- discrete flaming in locating and eradicating weeds. *Journal of Agricultural Machinery*, 4(1): 88-97. (in Persian with English abstract).
- Loni, R., Loghavi, M., and Jafari, A. 2014. Design, development and evaluation of targeted discrete-flame weeding for inter-row weed control using machine vision. *American Journal of Agricultural Science and Technology*, 2(1): 17-30.
- Mehrabadi, H.R. 2016. Effect of different planting dates and methods on quantity and quality traits of Varamin cotton cultivar. *Journal of Crop Production and Processing*, 7 (2): 61-72. (in Persian with English abstract).
- Mohammadi, S., and Baghestani, M.A. 2014. Integrated weed management effects on the growth characteristics and yield of cotton (*Gossypium hirsutum*). *Iranian Journal of Cotton Researches*, 1(2): 93-104. (in Persian with English abstract).
- Mutch, D.R., Simmons, J., Monroe, J., and Vogel, G. 2005. Some helpful tips on flaming weed sin corn and soybeans. *The New Agricultural Network*, 3(2): 86-93.
- Najjar, H., Saeidnia, F., Taherian, M., and Mehrabadi, H.R. 2023. Evaluation of the effect of planting date on yield and yield components of new cotton cultivars in Kashmar region. *Iranian Journal of Cotton Researches*, 11 (2): 37-52. (in Persian with English abstract).
- Peruzzi, A., Ginanni, M., Fontanelli, M., Raffaelli, M., and Barberi, P. 2007. Innovative strategies for on-farm weed management in organic carrot. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 22(4): 246-259.
- Raofi, M., Giti, S., Mahzari, S., Golmohammadi, M.J. Non-chemical integrated weed management to control brome chess (*Bromus danthoniae Trin*) according to the time of cutting and application of flamer. 2015. Pp. 679-683. In: *Proceedings 6th Confrence on Weed Sciences*, 1-3 Sep., Birjand, Iran. (in Persian with English abstract)
- Remesan, R., Roopesh, M.S., Remya, N., and Preman, P.S. 2007. Wet land paddy weeding-a comprehensive comparative study from South India. *Agricultural Engineering International: the CIGRE journal*. 9: 1-21.
- Rifai, M.N., Miller, J., Gadus, J., Otepka, P., and Kosik, L. 2003. Comparison of infrared, flame and steam units for their use in plant protection. *Agricultural Engineering Research*, 49(2): 65-73.
- Saglam, C., and Kiran, T. 2010. Comparison of flame weeding with other methods in vineyard weed control. *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi*, 6(3): 130-136.
- Salami, H., Atri, A.R. and Rahimiyan Mashadi, H. 2001. Determination of the critical period of weed control in cotton fields. *Journal of Applied Entomology and Phytopathology*, 73: 47-60. (in Persian with English abstract).
- Salimi, H., and Samavat, S. 2012. Effect of flaming on wild mustard (*Sinapis arvensis* L.) soil seed bank, soil micro organisms and physicochemical characteristics. *Journal of Agroecology*, 3(4): 468-475. (in Persian with English abstract).

- Samavatian, M., Barzali, M., and Rafiei Kerh Roodi, Z. 2018. Evaluation of treflan application manner on weeds control under different tillage methods in cotton cultivation (*Gossypium hirsutum* L.). Iranian Journal of Cotton Researches, 5(2): 53-74. (in Persian with English abstract).
- Shimi, P. 2001. Physico- chemical control of weeds in oilseed rape with special reference to the control of *Sinapis arvensis* L. Final research report, Plant Pathology Research Institute of Iran. (In Persian with English abstract).
- Sniauka, P., and Pocius, A. 2008. Thermal weed control in strawberry. Agronomy Research, 6: 359-366.
- Stepanovic, S., Datta, A., Neilson, B., Bruening, C., Shapiro, C., Gogos, G., and Knezevic, S.Z. 2016. The effectiveness of flame weeding and cultivation on weed control, yield and yield components of organic soybean as influenced by manure application. Renewable Agriculture and Food Systems, 31(4): 288-299.
- Ulloa, S.M., Datta, A., Bruening, C., Gogos, G., Arkebauer, T.J., and Knezevic, S.Z. 2012. Weed control and crop tolerance to propane flaming as influenced by the time of day. Crop Protection, 31(1): 1-7.
- Ulloa, S.M., Datta, A., Bruening, C., Neilson, B., Miller, J., Gogos, G., and Knezevic, S.Z. 2011. Maize response to broadcast flaming at different growth stages: effects on growth, yield and yield components. European Journal of Agronomy, 34(1): 10-19.
- White, S.N., and Boyd, N.S. 2016. Effect of dry heat, direct flame, and straw burning on seed germination of weed species found in lowbush blueberry fields. Weed Technology, 30(1), 263-270.
- Wszelaki, A.L., Doohan, D.J., and Athanasios, A. 2007. Weed control and crop quality in cabbage (*Brassica oleracea*) and tomato (*Lycopersicon lycopersicum*) using a propane flamer. Crop Protection, 26(2): 134-144.
- Zand, E., Koocheki, A. Rahimiyan Mashadi, H. Deyhim-Fard, R., Soofizadeh, S., and Nassiri Mahallati, S.M. 2004. Studies on some ecophysiological traits associated with competitiveness of old and new Iranian bread wheat (*Triticum aestivum* L.) cultivars against wild oat (*Avena ludoviciana* L.). Journal of Iranian Field Crop Research, 2: 160-175. (in Persian with English abstract).