

## فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه *Bidens bipinnata* L. در مرحله میوه‌دهی

نغمه پیروزی<sup>۱\*</sup>، حسین آذرنیوند<sup>۲</sup>، اصغر کهنل<sup>۳</sup> و فرحتاز خلیقی سیگارودی<sup>۴</sup>

\*- نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیک: Naghmehipiroozi@yahoo.com

۲- دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۳- استادیار، پژوهشکده توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران

۴- استادیار، گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج

: : :

### چکیده

گونه *Bidens bipinnata* L. متعلق به خانواده کاسنی (Compositae) و جنس *Bidens* است. به منظور بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره مтанولی گیاه *Bidens bipinnata* L. تحقیقات انجام شد. به منظور بررسی فعالیت اثر آنتیاکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدهای گیاه، پس از شناسایی کامل گیاه و مشخص شدن رویشگاه آن در منطقه کرج، قسمت‌های هوایی گیاه در مرحله میوه‌دهی جمع‌آوری گردید. در این بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره مtanولی گیاه *Bidens bipinnata* L. با استفاده از سه روش (۱) DPPH، (۲) ABTS، (۳) FRAP، محتوای فلاونوئیدی و تام فنلی گیاه انجام شده‌است. نتایج نشان داد که IC<sub>50</sub> درصد مهار رادیکال DPPH عصاره مtanولی قسمت‌های هوایی گیاه *Bidens bipinnata* L. معادل ml ۸۲/۱۳ $\mu$ g/ml می‌باشد ( $IC_{50} < 100\text{ }\mu\text{g/ml}$ ). در روش FRAP میزان مصرف معرف سولفات آهن III بر گرم وزن خشک گیاه ۱۱۲/۶۶ $\mu$ M است. براساس نتایج روش ABTS میزان میلی گرم آسکوربیک اسید معادل mg ۹/۱۵ g براساس وزن خشک گیاه است و همچنین میزان فلاونوئیدهای تام گیاه با استفاده از معرف روتین در وزن خشک گیاه mg/g ۱۲/۲۱ و میزان ترکیب‌های فنلی تام عصاره گیاه با استفاده از معرف گالیک اسید mg/g ۲/۸۸ تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: آنتیاکسیدان، *Bidens bipinnata* L., FRAP, DPPH, ABTS.

### تأمین می‌شوند. به نظر می‌رسد که ترکیب‌های

آنتیاکسیدانی غشای سلول‌ها را در مقابل صدمات ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند (Halliwell, 2000; Maxwell, 1995).

اخیراً فلاونوئیدها به عنوان ضدویروس، ضدرماتیسم و سیتو توکسیک مورد مصرف قرار می‌گیرند (Villeda-

### مقدمه

آنتیاکسیدان‌ها ترکیب‌های مهمی هستند که محافظت بدن را در مقابل تخریب ناشی از استرس‌های اکسیداتیو در اثر رادیکال‌های آزاد بر عهده دارند. انواع متفاوتی از مهارکننده‌های رادیکالی در بدن موجود است که اغلب آنها از رژیم غذایی مانند میوه‌ها، سبزیجات و نوشیدنی‌ها

ترکیب‌های فلاونوئیدی و بررسی اثر محافظت کبدی آن می‌باشد (Zhong *et al.*, 2007; Yuan *et al.*, 2008) که به طور کلی با مطالعه حاضر متفاوت است، اما تحقیقاتی بر روی گونه‌های دیگر جنس *Bidens* انجام شده که از نظر داشتن اثرهای دارویی، با ارزش می‌باشند و نیز وجود اثر آنتیاکسیدانی، سیتوتوکسیک و تعدیل سیستم ایمنی را در گونه‌های جنس *Bidens* ثابت می‌کند.

## مواد و روش‌ها

### جمع‌آوری گیاه مورد بررسی

*Bidens bipinnata* L. پس از شناسایی رویشگاه گونه در سطح شهرستان کرج، برای جمع‌آوری نمونه گیاهی به منطقه رویشی مراجعه شد و در زمانی که در منطقه مورد نظر گیاه به مرحله میوه‌دهی رسیده بود نمونه‌برداری انجام شد. سپس قسمت‌های هوایی میوه‌دار گیاه در دمای محیط و در سایه خشک گردیدند. نمونه برای شناسایی به هر باریوم پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی منتقل گردید. نمونه مذکور با نمونه موجود در هر باریوم پژوهشکده با کد (ACECR) 604 تطیق و نام علمی آن تعیین گردید.

## مواد شیمیایی

کلیه حلال‌های شیمیایی از شرکت Merck (Darmstadt, Germany) و مواد استاندارد و معرفه‌های شیمیایی تست‌های آنتیاکسیدانی از شرکت سیگما (Sigma Steinheim, Germany) تهیه گردیدند.

## مشخصات دستگاه اسپکتروفوتومتر

دستگاه اسپکتروفوتومتر فرابنفش مدل X-ma2000pc ساخت شرکت Human corporation بود.

*Bidens bipinnata* L. (Hernández *et al.*, 2001) متعلق به خانواده کاسنی و جنس *Bidens* می‌باشد. گیاهی یک‌ساله، ایستاده، تقریباً علفی، سبز و بدون کرک می‌باشد. ریشه این گیاه به صورت عمودی است و موسم گل در ماههای تیر و شهریور می‌باشد (قهرمان، ۱۳۷۴). موطن اصلی این گیاه (دو دندان دو شاخه) جنوب آمریکا، اروپا، آسیا و جزایر آرام است. انتشار جغرافیایی این گونه در ایران در نقاطی از نواحی شمالی و مناطق اطراف تهران حالت بومی پیدا کرده و انتشار یافته است و بیشتر به صورت علف هرز در نقاط کاشته شده و زراعی، دشت‌ها، جنگل‌ها، نواحی از بین‌رفته، باغ‌ها و دشت‌ها، زیستگاه‌های نسبتاً مرطوب و کناره‌های جاده می‌روید (پیروزی، ۱۳۸۸). گیاه دو دندان دو شاخه با سابقه تاریخی دارای مصارف گوناگونی از قبیل مصارف دارویی، مصارف خوراکی و چاشنی غذا و مصارف علوفه‌ای Watt & Breyer-Alonzo & Hildebrans, 1999) (Brandwijk, 1962) (Huang *et al.*, 2006)، اثر ضدزخم معده و ضداسهالی در موش صحرایی (Atta & Mouneir, 2005)، اثر محافظت‌کنندگی کبدی در موش صحرایی (Zhong *et al.*, 2007) و اثر سیتوتوکسیک (Wang *et al.*, 1997) (پیروزی، ۱۳۸۸) همچنین دارای ترکیب‌های شیمیایی عمدۀ که شامل آلفا-پین، بتا-میرسن، جرمکرن D، بی‌سیکلوجرماکرن، گاما-المن و اسپاتولنول (پیروزی، ۱۳۸۸) می‌باشد که توسط محققان بررسی شده است.

تاکنون هیچ‌گونه مطالعه علمی بر روی این گونه در زمینه محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی گیاه و اثر آنتیاکسیدانی انجام نشده است و بررسی‌های انجام شده بر روی گونه *Bidens bipinnata* مربوط به جداسازی

اسپکتروفوتومتر ماورای بنسن (UV) با آب مقطر، در طول موج ۵۱۰ نانومتر ثبت شد. بنابراین براساس عصاره و وزن خشک گیاه میزان فلاونوئید براساس میزان معادل "میلی گرم روتین در گرم عصاره" و "میلی گرم روتین در وزن خشک گیاه" محاسبه شد. آزمایشها ۳ بار تکرار شده و میانگین آنها گزارش شد.

### بررسی میزان ترکیب‌های فنلی تام عصاره گیاه (Total Phenol)

بررسی محتوای تام فنلی با استفاده از روش Singleton & Rossi, Folin-Ciocalteu در این آزمایش غلظت‌های ۵۰-۲۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر در مтанول تهیه گردید و از گالیک‌اسید (Gallic acid) به عنوان ماده استاندارد برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد.

از هر غلظت به میزان یک میلی‌لیتر برداشته و در بالن ژوژه ۲۵ میلی‌لیتر ریخته شد. یک بالن ژوژه ۲۵ میلی‌لیتر برداشته و با اضافه کردن آب مقطر حجم آن به ۲۵ میلی‌لیتر رسانده شد و به عنوان شاهد مدنظر قرار داده شد. به بالنهای مورد نظر به میزان ۹ میلی‌لیتر آب مقطر و یک میلی‌لیتر معرف Folin اضافه شد. سپس آنها را به خوبی تکان داده و بعد از مدت زمان ۵ دقیقه، ۱۰ میلی‌لیتر سدیم کربنات ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) به همه آنها اضافه و بالافاصله بالنهای مورد نظر را با آب مقطر به حجم رسانده، به شدت آنها را تکان داده و به مدت ۹۰ دقیقه در شرایط آزمایشگاه با درجه حرارت ۲۳ تا ۲۵ درجه نگهداری شدند. بعد از ۹۰ دقیقه جذب نمونه‌ها پس از تنظیم صفر دستگاه اسپکتروفوتومتر uv با آب مقطر، در طول موج ۷۵۰ نانومتر ثبت شد. بنابراین براساس عصاره

### تهیه عصاره گیاه

عصاره‌گیری به روش خیساندن انجام گردید. قسمت‌های هوایی گیاه خشک و به‌طور کامل پودر شد. به مقدار ۵۰ گرم پودر گیاه در ۱۵۰ میلی‌لیتر مтанول خیسانده و به مدت یک ساعت هم زده شد و بعد به مدت یک شب در هوای آزمایشگاه قرار داده شد. پس از آن عصاره جدا و صاف شد. به رسوب باقیمانده دوباره ۱۵۰ میلی‌لیتر مтанول اضافه شد و عصاره‌گیری همانند روز قبل تکرار گردید. بعد از ۳ روز کلیه محلول‌های جدا شده در حرارت ۴۰ درجه سانتی‌گراد و در فشار پایین تبخیر شد تا حلal به‌طور کامل خارج شده و وزن عصاره حاصل از گیاه محاسبه گردید. عصاره تا زمان انجام آزمایش‌ها در یخچال نگهداری شد (Farhoosh *et al.*, 2007).

**بررسی میزان فلاونوئیدهای تام گیاه (Total Flavonoids)**  
محتوای فلاونوئیدهای تام عصاره گیاه با استفاده از سدیم نیتریت، آلومینیوم کلرید و هیدروکسید سدیم انجام شد (Zhishen *et al.*, 1999). در این آزمایش غلظت‌های ۵۰-۲۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر در مтанول تهیه گردید و از روتین (Rutin) به عنوان ماده استاندارد برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد.

بعد از تهیه غلظت‌های (stock) مورد نظر، ۳ تکرار از هر غلظت به میزان یک میلی‌لیتر برداشته و در بالن ژوژه‌های ۱۰ میلی‌لیتر ریخته و ۴ میلی‌لیتر آب مقطر به همراه  $\frac{1}{3}$  میلی‌لیتر سدیم نیتریت به بالنهای اضافه شد. بعد از ۵ دقیقه،  $\frac{1}{3}$  میلی‌لیتر کلرید آلومینیوم و بعد از ۶ دقیقه ۲ میلی‌لیتر هیدروکسید سدیم به بالنهای اضافه شد و به‌طور کامل آنها را تکان داده، و با آب مقطر بالنهای را به حجم رسانده و بعد جذب نمونه‌ها با استفاده از دستگاه

۲/۵ میلی لیتر از محلول TPTZ ۱۰ میلی مولار در اسید هیدروکلریک (HCl) ۴۰ میلی مولار به اضافه ۲/۵ میلی لیتر از کلرید آهن (III)  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ۲۰ میلی مولار و ۲۵ میلی لیتر بافر استات ۳۰۰ میلی مولار تا  $\text{pH} = ۲/۶$  تهیه می‌شود. مخلوط مورد نظر را به شدت به مدت ۳۰ ثانیه تکان داده و در ۳۷ درجه سانتی گراد گرم می‌نماییم. سپس ۲۸۵۰ میکرولیتر معرف FRAP تازه تهیه شده با ۱۵۰ میکرولیتر عصاره مخلوط شده و مخلوط واکنشی تحت تکان شدید با دستگاه ورتکس (Vortex) قرار داده شد. بعد از ۱۵ دقیقه در درجه حرارت آزمایشگاه جذب در ۵۹۳ نانومتر ارزیابی شده و داده‌ها به صورت ارزش FRAP بر حسب میلی مولار با استفاده از منحنی کالیبراسیون محلول  $\text{Fe}(\text{II})$  در محدوده  $200-000\mu\text{M}$   $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O) بیان می‌شوند. آزمایشها ۳ بار تکرار شده و میانگین آنها گزارش شد. افزایش جذب در مخلوط واکنش به مفهوم افزایش قدرت احیاء‌کنندگی (آنتی‌اکسیدانی) خواهد بود. البته از آسکوربیک اسید به عنوان شاهد برای مقایسه استفاده شد.

بنابراین براساس عصاره و وزن خشک گیاه میزان  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  براساس میزان معادل "میکرومول  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  در گرم عصاره" و "میکرومول  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  در وزن خشک گیاه" محاسبه شد.

#### بررسی فعالیت رادیکال ABTS

برای بررسی فعالیت رادیکال ABTS از روش تغییر یافته Re و همکاران (۱۹۹۹) استفاده گردید. محلول‌های استوک شامل محلول  $\text{ABTS}^+$  ۷ میلی مولار و محلول پتاسیم پرسولفات ۲/۴ میلی مولار بودند. برای تهیه محلول کار دو محلول استوک در

و وزن خشک گیاه میزان محتوای تام فنلی براساس میزان معادل "میلی‌گرم گالیک اسید در گرم عصاره" و "میلی‌گرم گالیک اسید در وزن خشک گیاه" محاسبه شد. آزمایشها ۳ بار تکرار شده و میانگین آنها گزارش شد.

#### بررسی فعالیت رادیکال آزاد DPPH

فعالیت رادیکال آزاد DPPH با استفاده از روش (Liyana-Pathirana & Shahidi, 2005) انجام شد. در این آزمایش غلظت‌های ۱۰-۱۰۰ میکرو‌گرم در میلی‌لیتر Ascorbic acid) به عنوان شاهد استفاده گردید. از هر غلظت با ۳ تکرار، ۱/۵ میلی‌لیتر عصاره برداشته با ۱/۵ میلی‌لیتر DPPH مخلوط و داخل لوله آزمایش ریخته، سپس در دستگاه ورتکس به شدت آنها را تکان داده و به مدت ۳۰ دقیقه آنها را در تاریکی رها می‌کنیم. جذب نمونه‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV با حلal مтанول در طول موج ۵۱۷ نانومتر ثبت شد. آزمایشها ۳ بار تکرار شده و میانگین آنها گزارش شد.

درصد بازداری از DPPH نمونه با مقایسه نمونه عصاره و نمونه کنترل با استفاده از رابطه زیر بدست آمد:

$$\text{DPPH} = [1 - (\text{SSampel} - \text{SBblank sampel}) / \text{Ccontrol}] \times 100\%$$

#### بررسی قدرت آنتی‌اکسیدانی-احیاء‌کنندگی فریک FRAP

بررسی قدرت آنتی‌اکسیدانی از طریق یون  $\text{Fe}^{3+}$  (FRAP) یک روش ساده و معتبر رنگ‌سنجی است و به طور معمول برای اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش توسط Benzie و Strain (۱۹۹۶) ارائه شد. معرف FRAP شامل

شد. ۳۰ میکرولیتر عصاره‌های گیاه با ۲۹۷۰ میکرولیتر از محلول ABTS+ مخلوط شد و جذب آنها بعد از ۶ دقیقه در ۷۳۴ نانومتر با اسپکتروفوتومتر گرفته شد. آزمایشها ۳ بار تکرار شده و میانگین آنها گزارش شد. از اسکوربیک اسید به عنوان شاهد استفاده گردید. درصد مهار + ABTS نمونه با مقایسه نمونه کنترل با استفاده از رابطه زیر بدست آمد:

$$\text{ABTS+} = \frac{[(\text{Abscontrol}-\text{Abssample})]/(\text{Abscontrol})] \times 100}{}$$

شکل ۱ نمودار غلظت-پاسخ را در عصاره متانولی گالیک اسید نشان می‌دهد. در این تحقیق مشخص شد که میزان گالیک اسید در تمامی غلظت‌های عصاره با افزایش غلظت، افزایش می‌یابد. اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های عصاره گیاه با گالیک اسید وجود داشت ( $p < 0.05$ ). محتوای فلاونوئید نیز بر مبنای معادله خط منحنی استاندارد ( $y = 0.0015x$ ,  $r^2 = 0.996$ ) برای همین مجموعه به ترتیب  $18/22 \pm 113/05$  و  $1/97 \pm 12/21$  میلی گرم روتین در گرم پودر عصاره و وزن خشک گیاه بدست آمد. شکل ۲ نمودار غلظت-پاسخ را در عصاره متانولی روتین نشان می‌دهد. در این تحقیق مشخص شد که میزان روتین در تمامی غلظت‌های عصاره با افزایش غلظت، افزایش می‌یابد. اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های عصاره گیاه با روتین وجود داشت ( $p < 0.05$ ).

مقادیر هم ارز با هم مخلوط شد. اجازه داده شد برای تکمیل واکنش به مدت ۱۲ ساعت در تاریکی باقی بمانند. سپس ۱ میلی‌لیتر از محلول ABTS را با ۸۸ میلی‌لیتر متانول رقیق نموده تا جذبی برابر  $700 \pm 100$  واحد در ۷۳۴ نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر بدست آید. محلول ABTS+ تازه تهیه شده برای هر آزمایش آماده



## محاسبات آماری

تمام اندازه‌گیری‌ها ۳ بار تکرار شده و کلیه اطلاعات به صورت Mean $\pm$ SD گزارش شد. آنالیز واریانس یک‌سویه (ANOVA) برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. نتایج با احتمال  $p < 0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شد. سپس مقادیر IC50 از روی رگرسیون خطی بین درصد مهار و غلظت‌های مربوطه بدست آمد.

## نتایج

### محتوای فنل و فلاونوئید


محتوای تام فنلی با متد فولین سیوکالتیو به صورت میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره و در گرم وزن خشک گیاه براساس معادله خط منحنی استاندارد ( $y = 0.0045x$ ,  $r^2 = 0.995$ ) محاسبه شد. محتوای تام فنلی برای عصاره متانولی و وزن خشک گیاه به ترتیب  $26/64 \pm 0/57$  و  $2/88 \pm 0/06$  میلی گرم گالیک اسید در گرم پودر عصاره و وزن خشک گیاه بدست آمد.

شکل ۱- بررسی میزان گالیک اسید عصاره متانولی گیاه در غلظت (۵۰-۲۵۰) ( $\mu\text{g}/\text{ml}$ )شکل ۲- بررسی میزان روتین عصاره متانولی گیاه در غلظت (۵۰-۲۵۰) ( $\mu\text{g}/\text{ml}$ )

فعالیت رادیکال DPPH  $\pm ۰/۰۰۳ ۸/۶۷$  میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.

شکل ۳ نمودار غلظت-پاسخ را در عصاره متانولی (عصاره DPPH+ و عصاره DPPH) نشان می‌دهد. البته اختلاف معنی‌داری بین غلظت‌های عصاره گیاه در فعالیت به داماندازی رادیکال وجود داشت ( $p < ۰/۰۵$ ).

**فعالیت رادیکال DPPH**  
در این تحقیق مشخص شد که فعالیت به داماندازی رادیکال در تمامی غلظت‌های عصاره با افزایش غلظت، افزایش می‌یابد. غلظت مهار  $٪ ۵۰$  (IC<sub>50</sub>) در عصاره متانولی گیاه  $\pm ۰/۰۰۱ ۸۲/۱۳$  میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد. برای آسکوربیک اسید IC<sub>50</sub>




شکل ۳- بررسی فعالیت رادیکال DPPH عصاره مтанولی گیاه در غلظت ۱۰-۱۰۰۰ ( $\mu\text{g/ml}$ )

آسکوربیک اسید  $1/77 \pm 10813/059$  میکرومول در گرم بدست آمد.

شکل ۴ نمودار غلظت-پاسخ را در عصاره مтанولی  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  نشان می‌دهد. البته اختلاف معنی داری بین غلظت‌های عصاره گیاه در قدرت احیاء‌کنندگی وجود داشت ( $p < 0.05$ ).

#### قدرت احیاء‌کنندگی FRAP

در این تحقیق مشخص شد که قدرت احیاء‌کنندگی در تمامی غلظت‌های عصاره با افزایش غلظت، افزایش می‌یابد. محتوای سولفات‌آهن IV برای عصاره مтанولی گیاه و وزن خشک گیاه به ترتیب  $1/05 \pm 1043/19$  و  $0/11 \pm 112/66$  میکرومول سولفات‌آهن IV در گرم پودر عصاره و وزن خشک بدست آمد. سولفات‌آهن IV برای




شکل ۴- بررسی قدرت احیاء‌کنندگی عصاره مтанولی گیاه در غلظت ( $\mu\text{mol/l}$ )

برای عصاره مтанولی گیاه و وزن خشک گیاه به ترتیب  $۸۷/۰\pm ۰/۴۰$  و  $۹/۱۵\pm ۰/۰۴$  میلی گرم بر گرم پودر عصاره و وزن خشک بدست آمد. شکل ۵ نمودار غلظت-پاسخ را در عصاره مтанولی ABTS نشان می دهد. البته اختلاف معنی داری بین غلظت های عصاره گیاه در فعالیت رادیکال ABTS وجود داشت ( $p < ۰/۰۵$ ).

### فعالیت رادیکال ABTS

نتایج نشان داد که فعالیت رادیکال ABTS در تمامی غلظت های عصاره با افزایش غلظت، افزایش می یابد. غلظت مهار  $۵۰\% (IC_{50})$  در عصاره مтанولی گیاه بر میلی لیتر  $۱۳۲۳/۸۳\pm ۰/۰۲$  میکرو گرم بر میلی لیتر بدست آمد. IC<sub>50</sub> برای آسکوربیک اسید  $۱۱۴/۰۱\pm ۰/۰۰۲$  میکرو گرم بر میلی لیتر بدست آمد. همچنین میزان آسکوربیک اسید



شکل ۵- بررسی فعالیت رادیکال ABTS عصاره مтанولی گیاه در غلظت  $(\mu\text{g/ml}) ۱۵۰۰-۳۰۰$

فنل تام و فلاونوئید نسبت به گیاه خام بود. فنل ها و ترکیب های پلی فنلی، مانند فلاونوئیدها به طور گستردگی در محصولات غذایی یافت شده و نشان داده شده که فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای دارند (Van Acker et al., 1996). مطالعات نشان داده که افزایش سطح فلاونوئیدها در رژیم غذایی، می تواند منجر به کاهش برخی بیماریها در انسان شود (Hertog et al., 1993). میزان فنل تام و فلاونوئید در این تحقیق می تواند فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در عصاره تهیه شده از گیاه را توجیه کند.

### بحث

محتوای تام فنلی با متدهای فولین سیوکالتیو بر اساس معادله خط منحنی استاندارد برای عصاره مтанولی و وزن خشک گیاه به ترتیب  $۲۶/۶۴\pm ۰/۰۶$  و  $۲/۸۸\pm ۰/۵۷$  میلی گرم گالیک اسید در گرم پودر عصاره و وزن خشک گیاه بدست آمد. محتوای فلاونوئید نیز بر مبنای معادله خط منحنی استاندارد برای همین مجموعه به ترتیب  $۱۲/۲۱\pm ۱/۹۷$  و  $۱۸/۲۲\pm ۱۱۳/۰۵$  میلی گرم روتین در گرم پودر عصاره و وزن خشک گیاه بدست آمد. عصاره مtanولی گیاه به طور قابل ملاحظه ای دارای مقادیر بالاتری از

نتایج سایر تحقیقات که در ذیر به آنها اشاره شده است، وجود اثرهای آنتی اکسیدانی، سیتو توکسیک و تعديل سیستم ایمنی می باشد که در گونه های جنس *Bidens* آن را اثبات می کند. این فعالیت ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آنتی اکسیدان ها مرتبط می شوند. به عنوان مثال طبق گزارش Chiang و همکاران (۲۰۰۷)، بر روی گونه *B. pilosa* مشاهده گردید که ترکیب های فلاونوئیدی گیاه می توانند باعث تعديل سیستم ایمنی شوند. در مطالعه دیگری بر روی این گیاه Deba و همکاران (۲۰۰۸)، اسانس و عصاره های آبی *B. pilosa* را برای اثر آنتی اکسیدان به روشن DPPH در معرض آزمایش گذاشتند. میزان C50 اسانس و عصاره های آبی به ترتیب ۴۹/۷ و ۴۷/۵  $\mu\text{g}/\text{ml}$  بودند که این یافته ها نشان دهنده این است که گیاه دارای اثر آنتی اکسیدان می باشد. براساس گزارش Chiang و همکاران (۲۰۰۴)، ترکیب های موجود در عصاره گیاه *B. pilosa* اثرهای آنتی اکسیدانی و سیتو توکسیک قابل توجهی داشته اند و در یافته های مرتبط طبق تحقیقات Abajo و همکاران (۲۰۰۴)، اثر دم کرده آبی این گیاه در پیشگیری از همولیز ناشی از رادیکال های آزاد و همچنین اثر تعديل کنندگی سیستم ایمنی نشان داده شده است.

Zhu و همکاران (۲۰۰۹)، به بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی قسمت های هوایی گیاه *B. ceruna* به روشن DPPH پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد که ناشی از وجود ترکیب های فلاونوئیدی است. طبق گزارش Wolniak و همکاران (۲۰۰۷)، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های سرشاخه های گلدار گیاه *B. tripartita* نسبت به عصاره گیاه دو برابر بیشتر مشاهده شده است. نتایج نشان داد که

اهمیت ترکیب های آنتی اکسیدان برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های ناشی از رادیکال های آزاد شناخته شده است. با اینکه اتیولوژی بسیاری از بیماری ها همچنان ناشناخته است، اما مشاهدات زیادی ثابت می کند که واکنش های اکسیداسیون ناشی از رادیکال های آزاد نقش مهمی در ایجاد شرایط پاتولوژیک بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی، نقص کلیوی، دیابت، Noguchi & Niki, (2000). در این مطالعه نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد که در روش IC50 DPPH عصاره متانولی گیاه نسبت به IC50 آسکوربیک اسید دارای اثر آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی قوی می باشد ( $\text{IC50} < 100 \mu\text{g}/\text{ml}$ ). در روش FRAP قدرت احیا کنندگی آسکوربیک اسید نسبت به ABTS<sup>+</sup> گیاه بهتر بوده است و در روش آسکوربیک اسید اثر آنتی اکسیدانی بهتری را نسبت به عصاره گیاه نشان داد.

با توجه به این که در خصوص گونه *Bidens bipinnata* L. بررسی های صورت گرفته مربوط به جداسازی ترکیب های فلاونوئیدی و بررسی اثر محافظت کبدی آن می باشد، از این رو به طور کلی با مطالعه حاضر متفاوت بوده است، نتایج این تحقیقات که در ذیر به آنها اشاره شده وجود اثر محافظت کبدی را در گونه *Bidens bipinnata* و *Zhong bipinnata* همکاران (۲۰۰۷) و Yuan و همکاران (۲۰۰۸)، بر روی گونه *Bidens bipinnata* مشاهده شد که فلاونوئید های تام گیاه، اثر محافظت کنندگی کبدی قابل توجهی دارند و بخشی از مکانیسم اثر آنها به دلیل خواص آنتی اکسیدانی آنها می باشد. ولی گونه های دیگر جنس *Bidens* نیز از نظر داشتن اثرهای دارویی با ارزش می باشند. از جمله

پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی-عروقی مورد مصرف قرار می‌گیرند، بنابراین کاربرد چنین گیاهانی در صنایع غذایی و کاهش سیر بیماری در طیف وسیعی از بیماریها می‌تواند مطرح باشد.

### منابع مورد استفاده

- پیروزی، ن. ۱۳۸۸. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و اثرات آنتیاکسیدانی قسمت‌های هوایی گیاه دو دندان دوشاخه (*Bidens bipinnata* L.) و ترکیبات شیمیایی اسانس در کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
- قهرمان، ا. ۱۳۷۴. فلور رنگی ایران (جلد چهاردهم). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.
- Abajo, C., Boffill, M.A., Del Campo, J., Mendez, M.A., Gonzalez, Y., Mitjans, M. and Vinardell, M.P., 2004. In Vitro study of the antioxidant and immunomodulatory activity of aqueous infusion of *Bidens pilosa*. Journal of Ethnopharmacology, 93(2-3): 319-323.
- Alonso, D.S. and Hildebrans, J.W., 1999. *Bidens* L.: 150-155. In: Padva, L.S.D., Bunyapraphatsara, N. and Lemmens, R.H.M.J., (Eds). Plant Resources of South-East Asia No 12(1). Medicinal and Poisonous Plants 1. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands, 711p.
- Atta, A.H. and Mouneir, S.M., 2005. Evaluation of some medicinal plant extracts for antidiarrhoeal activity. Phytotherapy Research, 19(6): 481-485.
- Benzie, I.F. and Strain, J.J., 1996. The Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239(1):70-76.
- Chiang, Y.M., Chang, C.L.T., Chang, S.L., Yang, W.C. and Shyur, L.F., 2007. Cytopiloyne, a novel polyacetylenic glucoside from *Bidens pilosa*, functions as a T helper cell modulator. Journal of Ethnopharmacology, 110(3): 532-538.
- Chiang, Y.M., Chuang, D.Y., Wang, S.Y., Kuo, Y.H., Tsai, W. and Shyur, L.F., 2004. Metabolite profiling and chemopreventive bioactivity of plant extracts from *Bidens pilosa*. Journal of Ethnopharmacology, 95(2-3): 409-419.
- Deba, F., Xuan, T.D., Yasuda, M. and Tawata, S., 2008. Chemical composition antioxidant, antibacterial and antifungal activities of the essential oils from *Bidens pilosa* Linn. Var. *Radiata*. Food Control, 19(4): 346-352.

این افزایش مربوط به ترکیب‌های فلاونوئیدی به میزان بالا در سرشاره‌های گلدار گیاه می‌باشد. با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگر، اثر آنتیاکسیدانی در گونه‌های *B. bipinnata* و *B. pilosa* وجود داشت، ولی میزان IC50 این دو گونه متفاوت بود که می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی، متغیرهای آزمایش و روش‌های متفاوت اندازه‌گیری باشد. همچنین در تحقیقات دیگر، دو گونه *B. ceruna* و *B. tripartita* بودند که این افزایش در اثر ترکیب‌های فلاونوئیدی بوده است، پس این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که اثر آنتیاکسیدانی گیاه مورد مطالعه ناشی از وجود ترکیب‌های *B. pilosa* دارای اثرهای سیتوکسیک و تعدیل‌کننده سیستم ایمنی می‌باشد که ناشی از وجود ترکیب‌های فلاونوئیدی است (Chiang et al., 2007) (Abajo et al., 2004; Deba et al., 2008; 2004).

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه در زمینه اثر آنتیاکسیدان و ترکیب‌های فنلی تام و فلاونوئیدها می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل دارا بودن اثر آنتیاکسیدانی این گیاه قابلیت بالقوه استفاده در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماریها نظیر دیابت، التهاب، سرطان، صدمات کبدی، آزاییمر و بیماریهای عروق کرونر قلب را پس از تحقیقات لازم داشته باشد. همچنین از آنجایی که آنتیاکسیدان‌ها به عنوان مواد محافظ در صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شوند و این گیاه نیز دارای ترکیب‌های فنلی و فلاونوئیدی است که این ترکیب‌ها مسئول اثر آنتیاکسیدان می‌باشند و اخیراً فلاونوئیدها به عنوان ضدویروس، ضدروماتیسم و

- Villeda-Hernández, J., Barroso-Moguel, R., Méndez-Armenta, M., Nava-Ruiz, C., Huerta-Romero, R. and Río, C., 2001. Enhanced Brain regional Lipid peroxidation in developing rats exposed to low level lead acetate. *Brain Research Bulletin*, 55(2): 247-251.
- Wang, J., Qin, H., Zhang, H., Wang, M., Zhang, L., Wang, Y., Guo, M. and Mao, H., 1997. Inhibition of 5 Compounds from *Bidens bipinnata* on leukemia cells in vitro. *Zhong yao cai Zhongyaocai Journal of Chinese medicinal materials*, 20(5): 247-249.
- Watt, J.M. and Breyer-Brandwijk, M.G., 1962. *The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eastern Africa*. E. and. S. Livingstone, London, United kingdom, 1457p.
- Wolniak, M., Tomczykowa, M., Tomczyk, M., Gudej, J. and Wawer, I., 2007. Antioxidant activity of extracts and flavonoids from *Bidens tripartita*. *Acta Poloniae Pharmaceutica-Drag Research*, 63(5): 441-447.
- Yuan, L.P., Chen, F.H., Ling, L., Bo, H., Chen, Z.W., Li, F., Zhong, M.M. and Xia, L.J., 2008. Protective effects of total flavonoids of *Bidens bipinnata* L. against carbon tetrachloride induced liver fibrosis in rat. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 60(10): 1393-1402.
- Zhishen, J., Mengcheng, T. and Jianming, W., 1999. The determination of Flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. *Food Chemistry*, 64(4): 555-559.
- Zhong, M.M., Chen, F.H., Yuan, L.P., Wang, X.H., Wu, F.R., Yuan, F.L. and Cheng, W.M., 2007. Protective effect of total flavonoids from *Bidens bipinnata* L. against carbon tetrachloride-induced liver injury in mice. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 59(7): 1017-1025.
- Zhu, N., Li, X.W., Liu, G.Y., Shi, X.L., Gui, M.Y., Sun, C.Q. and Jin, Y.R., 2009. Constituents from aerial parts of *Bidens ceruna* L. and their DPPH radical scavenging activity. *Chemical Research in Chinese Universities*, 25(3):328-331.
- Farhoosh, R., Golmovahed, G.A. and Khodaparast, M.H., 2007. Antioxidant activity of various (*Camellia sinensis* L.). *Food Chemistry*, 100(1): 231-236.
- Halliwell, B., 2000. The antioxidant paradox. *Lancet*, 355: 1179-1180.
- Hertog, M.L.G., Feskens, E.J.M., Hollman, P.H.C., Katan, M.B. and Kromhout, D., 1993. Dietary antioxidant flavonoids and the risk of coronary heart disease: the zutphen elderly study. *Lancet*, 342: 1007-1011.
- Huang, M.Z., Chen, H.S.m., Liu, J.G., Zou, X.H., Du, J.L. and Xiang, Z.B., 2006. Studies on the chemical constituents of *Bidens bipinnata* L. *Academic Journal of Second Military Medical University*, 27(8): 881-891.
- Liyanan-pathirana, C.M. and Shahidi, F., 2005. Antioxidant activity of commercial soft and hard wheat (*Triticum aestivum* L.) as affected by gastric pH conditions. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53(7): 2433-2440.
- Maxwell, S.R.J., 1995. Prospects for the use of antioxidant therapies. *Drugs*, 49(3)345-361.
- Noguchi, N. and Niki, E., 2000. Phenolic antioxidant: a rationale for design and evaluation of novel antioxidant drug for atherosclerosis. *Free Radical Biology and Medicine*, 28(10): 1538-1546.
- Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. and Rice-Evans, C., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. *Free Radical Biology and Medicine*, 26(9-10): 1231-1237.
- Singleton, V.L. and Rossi, J.r., J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic - Phosphotungstic acid reagents. *American Journal of Enology and Viticulture*, 16(3): 144-158.
- Van Acker, S.A.B.E., Van Den Berg, D.J., Tromp, M.N.J.L., Griffioen, D.H., Van Bennekom, W.P., Van der Vijgah, W.J.F. and Bast, A., 1996. Structural aspects of antioxidant activity of flavonoids. *Free Radical Biology and Medicine*, 20(3):331-342.

## Antioxidant activity of the aerial parts extract of *Bidens bipinnata* L. at fruiting stage

N. Piroozi<sup>1\*</sup>, H. Azarnivand<sup>2</sup>, A. Kohandel<sup>3</sup> and F. Khalighi-Sigaroodi<sup>4</sup>

1\*- Corresponding author, MSc. Student, Research & Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  
E-mail: Naghmehipiroozi@yahoo.com

2- Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3- Technology Development Institute, Jahad Daneshgahi, Tehran Unit, Karaj, Iran

4- Research Institute of Medicinal Plants, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Karaj, Iran

Received: December 2010

Revised: July 2011

Accepted: July 2011

### Abstract

*Bidens bipinnata* L. belongs to the family Asteraceae (Compositae) and genus of *Bidens*. In order to study the antioxidant activity, total phenolic and flavonoid content of methanolic extract of *Bidens bipinnata* L., were investigated. For this purpose, after full identification of the species and determination of its habitat in Alborz province, aerial parts of the plant were collected at fruiting stage. In this research, three methods including DPPH, ABTS, and FRAP were applied to measure flavonoid and total phenolic content of the species. Results showed that for methanol extract of the aerial parts of *Bidens bipinnata*, percentage of radical inhibition was 82.13 µg/ml (IC50 <100 µg/ml). The amount of ferrous sulfate reagent was 112.66 µM/g based on the dry weight of plant in FRAP method. According to the results of ABTS method, the amount of Ascorbic Acid, total flavonoids and total phenolic compounds were respectively calculated based on the dry weight of plant as 9.15 mg and also the amount of total flavonoids in dry weight of plant using rutin reagent was determined 12.21 mg/g and the amount of total phenolic compounds of the extract using Gallic Acid reagent was determined 2.88 mg/g.

**Key words:** *Bidens bipinnata* L., antioxidant, DPPH, FRAP, ABTS.