

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج خروس (*Amaranthus caudatus L.*) بر کاهش بدخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک

نجمه کبیری^{۱*}، صدیقه عسگری^۲ و پریوش حیمی^۳

۱- کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

پست الکترونیک: kabir_s97@yahoo.com

۲- دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳- کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۹

تاریخ اصلاح نهایی: آبان ۱۳۸۹

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۸۹

چکیده

هایپرکلسترولمی، رژیم‌های سرشار از کلسترول و فشارهای اکسیداتیو موجب افزایش سطح کلسترول تام و در نتیجه سبب پیشرفت آترواسکلروز می‌شوند. آنتی‌اکسیدان‌ها نقش مهمی در بازدارندگی و جمع‌آوری رادیکال‌های آزاد دارند. گیاه تاج خروس (*Amaranthus caudatus L.*) کاهش دهنده لیپید و یک عامل آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. هنوز مشخص نیست که تاج خروس موجب کاهش آترواسکلروز است که با کاهش فشارهای اکسیداتیو ارتباط دارد. در این تحقیق، خرگوش‌ها به طور تصادفی در ۴ گروه ۵ تابی تقسیم شدند. گروه اول با رژیم غذایی استاندارد به مدت ۷۵ روز، گروه دوم با رژیم پرکلسترول (کلسترول ۱٪ وزن غذا) به مدت ۷۵ روز، خرگوش‌ها در گروه ۳ و ۴ برای ۴۵ روز رژیم پرکلسترول ۱ و پس از آن به ترتیب در گروه سوم رژیم معمولی و گروه چهارم عصاره تاج خروس (۱۵۰mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. نمونه خون در ابتدا، ۴۵ روز و بعد از ۷۵ روز به ترتیب رژیم غذایی برای اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین B (apoB)، مالون دی‌آلثید (MDA)، آپولیپوپروتئین A (apoA) و OX-LDL جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعات نشان داد که بیمار با تاج خروس برای ۳۰ روز موجب کاهش معنی‌دار apoB، apoA و LDL می‌شود. همچنین سطح apoA افزایش معنی‌داری داشته است. حیواناتی که رژیم معمولی را به مدت ۳۰ روز دریافت کرده بودند کاهش معنی‌داری در این فاکتورها نشان ندادند. تأثیر تاج خروس احتمالاً به دلیل کاهش فشارهای اکسیداتیو می‌باشد و احتمالاً اثر آنتی‌آتروژنیک بوده و می‌تواند به عنوان یک رژیم غذایی مهم در کاهش آترواسکلروز نقش داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: رگرسیون، تاج خروس (*Amaranthus caudatus L.*), خرگوش، آپولیپوپروتئین B، آپولیپوپروتئین A، MDA، OX-LDL

مقدمه

دنبال ترکیب‌هایی که بتوانند با کاهش فشارهای اکسیداتیو، علاوه بر کاهش در پیشرفت ضایعات عروقی موجب افزایش رگرسیون نیز شوند بود. آنتیاکسیدان‌ها و ترکیب‌های هایپولیپیدمیک موجب توقف پیشرفت آترواسکلروز و درمان آترواسکلروز می‌شوند. توقف پیشرفت آترواسکلروز با کاهش فشارهای اکسیداتیو و لیپیدهای سرم ارتباط دارد (Amenour *et al.*, 2009; Martirosyan *et al.*, 2007; Prasad, 2007).

Amaranthus caudatus گیاه تاج‌خرروس با نام علمی *Amaranthus paniculatus* L. و مترادف *Amaranthaceae* می‌باشد. دانه و برگ گیاه تاج‌خرروس به عنوان مواد غذایی برای انسان و نیز حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند (Martirosyan *et al.*, 2007). برگ گیاه تاج‌خرروس منبع بسیار خوبی از پروتئین، فیبر، اسکوالین، آنتوسیانین و توکوتینول‌ها می‌باشد (Heinz *et al.*, 2010; Kadoshnikov *et al.*, 2005; Tikekar *et al.*, 2008). اسکوالین یک ترکیب واسطه در بیوستتر کلسترول است و در زیر پوست و بافت چربی انسان وجود دارد (Tikekar *et al.*, 2008). فلاونول‌ها و آنتوسیانین‌ها نقش مهمی در تنظیم و یا کاهش ریسک فاکتورها و جلوگیری از بیماریهای قلبی-عروقی دارند (Heinz *et al.*, 2010; Pascual-Teresa *et al.*, 2010). اخیراً نشان داده شده‌است که عصاره گیاه تاج‌خرروس منجر به کاهش شاخص‌های التهابی می‌شود (Kabiri *et al.*, 2010). در این مطالعه توانایی عصاره تاج‌خرروس در کاهش سطح برخی از ریسک فاکتورهای مهم در آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی به‌وسیله بررسی برخی از مارکرهای بیوشیمیایی بررسی شده‌است.

افزایش سطح کلسترول یک ریسک فاکتور برای بیماریهای قلبی-عروقی می‌باشد (Sengupta & Ghosh, 2010). افزایش سطح پلاسمایی کلسترول موجب افزایش فشارهای اکسیداتیو در عروق و تغییر در فعالیت عروق خون و پلاکت می‌شود (Aviram & Brook, 1987; Kojda & Harrison, 1999). افزایش سطح کلسترول با آغاز پیشرفت ضایعات آترواسکلروز و نقص در آندوتیال با مشارکت رادیکال‌های اکسیژن و OX-LDL دیده می‌شود (Kugiyama *et al.*, 1990; Harrison, 1997). افزایش فشارهای اکسیداتیو با افزایش تولید رادیکال‌های آزاد و کاهش تولید تیتر اکساید همراه می‌باشد که ظاهرآ ن نقش مهمی در فرایند التهاب و آغاز آترواسکلروز دارد (Sengupta & Ghosh, 2010). از دیگر عامل‌هایی که با بیماریهای قلبی-عروقی ارتباط دارد، آپولیپروتئین‌ها می‌باشند که از مهمترین اجزاء لیپوپروتئین‌ها بوده و یک شاخص مهم در پیش‌بینی بیماریهای قلبی-عروقی می‌باشند (Genest Jr *et al.*, 1992). افزایش سطح آپولیپروتئین B و لیپوپروتئین‌هایی مانند LDL، VLDL و لیپوپروتئین A تحریک‌کننده چرخه التهاب می‌باشند. apoA از طریق افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی به عنوان یک جزء آنتی‌آتروژنیک عمل نموده و از اکسیداسیون جلوگیری و دارای فعالیت ضدالتهابی می‌باشد که بازدارنده تغییر LDL بوده و مانع بیان مولکول‌های چسبندگی می‌شوند و بازدارنده لیپوکسیژناز که منجر به اکسیداسیون apoA لیپیدها می‌شود است. مطالعات نشان داده‌است که apoB موجب کاهش لیپیدها و ماکروفازهای عروق و از آترواسکلروز جلوگیری می‌کند. بنابراین تغییر در سطح پلاسمایی apoB با رگرسیون آترواسکلروز ارتباط دارد.

تطابق با محیط، خرگوش‌ها به مدت دو هفته تحت رژیم پایه و شرایط استاندارد از لحاظ نور (۲ ساعت نور ۱۲ ساعت تاریکی)، رطوبت نسبی (۴۰-۷۰ درصد) و درجه حرارت (دماهی 2 ± 23 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. در این مدت با رژیم استاندارد Super Foskorn تهیه شده از انسنتیتو پاستور تغذیه شدند. هر ۱۰۰۰ گرم از Super Foskorn شامل ۱۴۰ گرم پروتئین، ۱۵۰ گرم فیبر و ۳۰ گرم آب می‌باشد.

سپس خرگوش‌ها به طور تصادفی در ۴ گروه ۵ تایی تقسیم شدند. گروه اول با رژیم غذایی استاندارد به مدت ۷۵ روز، گروه دوم با رژیم پرکلسترول (کلسترول٪۱ وزن غذا) به مدت ۷۵ روز، خرگوش‌ها در گروه ۳ و ۴ برای ۴۵ روز رژیم پرکلسترول ۱ و پس از آن به ترتیب در گروه سوم رژیم معمولی و گروه چهارم عصاره تاج خروس دم‌گربه‌ای (۱۵۰mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند.

اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی

قبل از شروع مطالعه، ۳۰ و ۴۵ روز خرگوش‌ها برای ۱۲ ساعت در حالت ناشتا قرار گرفتند. سپس نمونه خون از رگ میانی گوش جهت بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی گرفته شد.

نمونه خون در ۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شد. غلظت سرمی آپولیپوپروتئین A و B با کیت پارس آزمون و دستگاه Hitachi 902 به روش ایمنوتوربیدومتری تعیین شد. مالون دی‌آلدئید نیز با روش Immune اسپکتروفتومتریک و OX-LDL با کیت diagnostic و به روش الیزا اندازه‌گیری شد.

مواد و روشها آماده‌سازی گیاه

گیاه تاج خروس دم‌گربه‌ای از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه و جنس و گونه این گیاه توسط هرباریوم دانشکده علوم اصفهان مورد تأیید قرار گرفت. نمونه در هرباریوم دانشگاه اصفهان با شماره ۱۳۶۴۹ ذخیره شده است.

تهیه عصاره هیدروالکلی

بخش‌های هوایی گیاه به مدت ۱۰ روز در دمای اتاق خشک شد و بعد توسط مخلوطکن برقی به صورت پودر در آورده شد. سپس ۱۰۰ گرم از پودر گیاه تاج خروس دم‌گربه‌ای در اتانول ۹۶ به مدت ۷۲ ساعت خیس شد و پس از فیلتر، توسط دستگاه تقطیر در خلا تغییض گردید. محلول غلیظ شده در سه مرحله (یک بار با ۱۰۰ میلی‌لیتر و دو بار با ۵۰ میلی‌لیتر کلروفرم) دکانته شد، سپس محلول بدست آمده از آخرین مرحله درون ظرفی ریخته شد و تحت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و شرایط سترون شده خشک گردید. پودر خشک از آخرین مرحله بدست آمده در بطری شیشه‌ای تیره در ۴ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد (Eseyin et al., 2007).

مقدار فلاونونیدهای گیاه با روش اسپکتروفتومتری در طول موج ۴۲۵ نانومتر و مقدار آنتوسیانین‌ها نیز با روش اسپکتروفتومتری و در طول موج ۵۳۵ نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفتند (قاسمی دهکردی، ۱۳۸۱).

گروه‌بندی و تیمار خرگوش‌ها

۲۰ رأس خرگوش نر بالغ از نژاد نیوزیلندری با وزن متوسط ۱۷۰۰-۲۰۰۰g از مؤسسه رازی کرج خریداری و به لانه حیوانات دانشکده علوم انتقال یافتند. به منظور

در گروههای دارای رژیم پرکلسترول (گروه ۲، ۳ و ۴) بعد از ۴۵ روز افزایش معنی داری در میزان apoA، apoB و MDA و OX-LDL در مقایسه با گروه ۱ و ابتدای دوره نشان می دهند (شکل ۱).

در گروه دارای رژیم پرکلسترول (گروه ۲) بعد از ۷۵ روز افزایش معنی داری در میزان apoB و OX-LDL و MDA و کاهش سطح apoA در مقایسه با گروه ۱ و ابتدای دوره نشان می دهند (شکل ۱).

کاهش معنی داری در میزان apoA، apoB و MDA در گروه ۳ در مقایسه با گروه ۲ در پایان دوره وجود داشت (شکل ۱).

کاهش معنی داری در میزان apoB، apoA و OX-LDL و افزایش معنی دار apoA در گروه ۴ در مقایسه با گروه ۲ در پایان دوره وجود داشت (شکل ۱).

در طی دوره درمان، در گروه تیمار شده با عصاره تاج خروس برای ۳۰ روز به دنبال مصرف کلسترول ۱٪ برای ۴۵ روز (گروه ۴) کاهش معنی داری در میزان apoB و MDA و کاهش OX-LDL و افزایش معنی دار apoA در مقایسه با گروه ۳ مشاهده شد (شکل ۱).

آنالیز آماری

نتایج به صورت $\text{Mean} \pm \text{SD}$ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای بررسی نتایج بیوشیمیایی و مقایسه میانگین گروههای آزمایشی از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA و سپس از آزمون دانکن استفاده شد و $p < 0.05$ معنی دار تلقی گردید. کلیه شکل های مربوط نیز در برنامه نرم افزاری Excel رسم شد.


نتایج

میزان فلاونوئیدها و آنتوسبیانین ها
به ازای هر ۱۰۰ گرم پودر گیاه تاج خروس به طور متوسط 37.7 ± 0.029 گرم پودر عصاره هیدروالکلی تاج خروس بدست آمد. نتایج نشان داد که میزان فلاونوئیدهای موجود در تاج خروس 0.028 ± 0.0379 mg و میزان آنتوسبیانین های موجود در تاج خروس 0.29 ± 0.24 mg می باشد.

فاکتورهای بیوشیمیایی

ابتدای دوره در میانگین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در بین گروه های مورد مطالعه تغییر معنی داری وجود ندارد (شکل ۱).

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج خروس...



شکل ۱- تغییرات فاکتورهای بیوشیمیابی سرم در ۴ گروه در ابتداء، ۴۵ روز و ۷۵ روز

روز

۷۵ روز

۴۵ روز و سپس رژیم معمولی به مدت ۳۰ روز

ت ۴۵ روز سپس عصاره تاج خروس (۱۵۰mg/kg.bw) به مدت ۳۰ روز

ده با رژیم معمولی III و گروه تیمار شده با عصاره تاج خروس IV نسبت به گروه II بعد از ۷۵ روز

عصاره تاج خروس IV نسبت به گروه III بعد از ۷۵ روز

نشان می دهد.

بحث

بدن و در نتیجه افزایش فعالیت رادیکال‌ها از سلول‌های التهابی تولید می‌شوند (Bloomer & Fisher-Wellman, 2009). اخیراً مشخص شده که کوئرستین که یک فلاونوئید Hapner گیاهی می‌باشد دارای فعالیت ضدالتهابی می‌باشد (Hapner et al., 2010). فلاونول‌ها و آنتوسیانین‌ها نقش مهمی در کاهش ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی از طریق کاهش تجمع پلاکت، آترواسکلروز، فشار خون و دارا بودن فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی بر فعالیت آندوتیلیال اثر دارند و جمع‌کننده رادیکال‌های آزاد می‌باشند و از مرگ سلول‌های آندوتیلیال جلوگیری می‌کنند (Borradaile et al., 2002; Pascual-Teresa et al., 2006; Pignatelli et al., 2006). آنتوسیانین‌ها بر توزیع کلستروول و حفاظت از سلول‌های آندوتیلیال در مقابل CD40 که موجب آغاز التهاب شده اثربارند (Xie et al., 2003).

تاج‌خرروس سرشار از فیبر، اسکوالین و توکوتريینول می‌باشد (Singhal & Kulkami, 1988). اسکوالین یک ترکیب هایپوکلسترولومیک بوده و بازدارنده فعالیت HMG-CoA می‌باشد که یک آنزیم ضروری در بیوسنتر کلستروول است (Tikekar et al., 2008). اخیراً مطالعات نشان داده‌است که فلاونوئیدها منجر به کاهش ترشح apoB در کبد می‌شوند. اثر هایپوکلسترولومیک این ترکیب‌ها در ارتباط با کاهش HMG-CoA ردوکتاز کبد و فعالیت ACAT می‌باشد (Borradaile et al., 2002; Pignatelli et al., 2006).

نتایج در این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خرروس می‌تواند سطح برخی از ریسک فاکتورهای مهم در آترواسکلروز (apoB، OX-LDL و MDA) را کاهش دهد. با توجه به مطالعاتی که قبلاً انجام شده و نشان داده‌است که تاج‌خرروس کاهش دهنده لیپیدها

مطالعه حاضر نشان داده‌است که رژیم غذایی با کلستروول بالا (۱) در طی ۴۵ روز و ۷۵ روز منجر به افزایش سطح apoA، apoB و MDA در خرگوش‌ها می‌شود. نتایج در این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی تاج‌خرروس به طور معنی داری دارای اثر آنتی‌اکسیدانی می‌باشد، بهدلیل این‌که عصاره در طی دوره رگرسیون (۳۰ روز) منجر به کاهش سطح MDA و apoB و OX-LDL می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که با کاهش سطح کلستروول و تری‌گلیسرید در سرم و آئورت در خرگوش‌ها فرایند پراکسیداسیون لیپیدها نیز به آهستگی انجام می‌شود و سطح MDA و OX-LDL کاهش می‌یابد که منجر به کاهش التهاب و تسريع کاهش ضایعات آترواسکلروز می‌شود (Lee & Prasad, 2003; Boban et al., 2009). Rژیم معمولی به دنبال رژیم پرکلستروول در مقایسه با عصاره تاج‌خرروس نتوانسته سطح MDA را کاهش دهد. افزایش سطح MDA همراه با افزایش سطح فشارهای اکسیداتیو می‌باشد (Prasad, 2008). آتروژنر با افزایش در پراکسیداسیون لیپیدها و تولید MDA که یک شاخص مهم برای ROS (Reactive oxygen stress) می‌باشد، و کاهش سطح فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارتباط دارد (Lee & Prasad, 2003). مطالعات اخیراً نشان داده‌است که عصاره تاج‌خرروس با کاهش سطح لیپیدها و برخی از فاکتورهای بیوشیمیای از پیشرفت آترواسکلروز جلوگیری می‌کند (Kabiri et al., 2010). نقش مهمی در بیماریهای قلبی-عروقی دارد و به عنوان یک شاخص برای فشارهای اکسیداتیو محسوب می‌شود (Fitó et al., 2007). گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن با افزایش فشارهای اکسیداتیو در

- Borradaile, N.M., Dreu, L.E., Barrett, P.H.R. and Huff, M.W., 2002. Inhibition of hepatocyte apoB secretion by naringenin: enhanced rapid intracellular degradation independent of reduced microsomal cholestryl esters. *Journal of Lipid Research*, 43(9): 1144-1154.
- Eseyin, O., Ebong, P., Igboasoiyi, A. and Oforah, E., 2007. Hypoglycemic effect of the seed extract of *Telfairia occidentalis* in rat. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 10(3): 498-501.
- Fitó, M., Guxens, M., Corella, D., Sáez, G., Estruch, R., de la Torre, R., Francés, F., Cabezas, C., López-Sabater Mdel, C., Marrugat, J., García-Arellano, A., Arós, F., Ruiz-Gutierrez, V., Ros, E., Salas-Salvadó, J., Fiol, M., Solá, R. and Covas, M.I., 2007. Effect of a traditional Mediterranean diet on lipoprotein oxidation: a randomized controlled trial. *Archives of Internal Medicine*, 167(11): 1195-1203.
- Genest Jr, J., McNamara, J.R., Ordovas, J.M., Jenner, J.L., Silberman, S.R., Anderson, K.M., Wilson, P.W., Salem, D.N. and Schaefer, E.J., 1992. Lipoprotein cholesterol, apolipoprotein A-I and B and lipoprotein (a) abnormalities in men with premature coronary artery disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 19(4):792-802.
- Hapner, C.D., Deuster, P. and Chen, Y., 2010. Inhibition of oxidative hemolysis by quercetin, but not other antioxidants. *Chemico-Biological Interactions*, 186(3): 275-279.
- Harrison, D.G., 1997. Cellular and molecular mechanisms of endothelial cell dysfunction. *Journal of Clinical Investigation*, 100(9): 2153-2157.
- Heinz, S.A., Henson, D.A., Nieman, D.C., Austin, M.D. and Jin, F., 2010. A 12-week supplementation with quercetin does not affect natural killer cell activity, granulocyte oxidative burst activity or granulocyte phagocytosis in female human subjects. *The British journal of nutrition*, 104(6): 849-857.
- Kabiri, N., Asgary, S., Madani, H. and Mahzouni, P., 2010. Effects of *Amaranthus caudatus* L. extract and lovastatin on atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits. *Journal of Medicinal Plants Research*, 4(5): 355-361.
- Kadoshnikov, S.I., Kadoshnikova I.G. and Martirosyan, D.M., 2005. Investigation of Fractional Composition of the Protein in Amaranth. 81-104, In: Book "Non-Traditional Natural Resources, Innovation Technologies and Products" Issue 12 Moscow. Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, 625p.
- Kojda, G. and Harrison, D., 1999. Interactions between NO and reactive oxygen species: pathophysiological importance in atherosclerosis, hypertension, diabetes and heart failure. *Cardiovascular Research*, 43(3): 562-571.
- Kugiyama, K., Kerns, S.A., Morrisett, J.D., Roberts, R. and Henry, P.D., 1990. Impairment of endothelium-dependent arterial relaxation by lysolecithin in

و فاکتورهای التهابی می باشد، احتمالاً در درمان ضایعات آترواسکلروز نیز مؤثر می باشد. هر چند مکانیسم هایی که عصاره تاج خروس در دوره رگرسیون موجب کاهش این فاکتورها می شود هنوز مشخص نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، اما با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی ترکیب های طبیعی احتمالاً گیاه تاج خروس دارای اثر آنتی اکسیدانی است و اثر حفاظتی در مقابل فشارهای اکسیداتیو دارد.

سپاسگزاری

تحقیق حاضر قسمتی از طرح تحقیقاتی شماره ۸۴۱۴۱ مصوب مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان می باشد و قسمتی به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان انجام شده است. بدین وسیله از کادر محترم آزمایشگاه مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان جهت انجام آزمایش های بیوشیمیایی و همچنین خانم دکتر پروفیون محزونی قدردانی می شود.

منابع مورد استفاده

- قاسمی دهکردی, ن., ۱۳۸۱. فارماکوپه گیاهی ایران. انتشارات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, تهران, تعداد کامل صفحات.
- Amensour, M., Sendra, E., Abrini, J., Bouhdid, S., Pérez-Alvarez, J.A. and Fernández-López, J., 2009. Total phenolic content and antioxidant activity of myrtle (*Myrtus communis*) extracts. *Natural Product Communications*, 4(6): 819-824.
- Aviram, M. and Brook, J.G., 1987. Platelet activation by plasma lipoproteins. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 30(1): 61-72.
- Bloomer, R.J. and Fisher-Wellman, K.H., 2009. Systemic oxidative stress is increased to a greater degree in young, obese women following consumption of a high fat meal. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2(1): 19-25.
- Boban, P.T., Nambisan, B. and Sudhakaran, P.R., 2009. Dietary mucilage promotes regression of atheromatous lesions in hypercholesterolemic rabbits. *Phytotherapy Research*, 23(5): 725-730.

- Prasad, K., 2008. Regression of hypercholesterolemic atherosclerosis in rabbits by secoisolaricresinol diglucoside isolated from flaxseed. *Atherosclerosis*, 197(1): 34-42.
- Sengupta, A. and Ghosh, M., 2010. Modulation of platelet aggregation, haematological and histological parameters by structured lipids on hypercholesterolemic rats. *Journal of Lipids*, 45(5): 393-400.
- Singhal, R. and Kulkami, P., 1988. Amaranths-an underutilized resource. *International Journal of Food Science and Technology*, 23(2): 125-139.
- Tikekar, R.V., Ludescher, R.D. and Karwe, M.V., 2008. Processing stability of squalene in Amaranth and antioxidant potentioa of Amaranth extract. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56(22): 10675-10678.
- Walldius, G. and Jungner, I., 2004. Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-modifying therapy. *Journal of Internal Medicine*, 255(2): 188-205.
- Xie, D.Y., Sharma, S.B., Paiva, N.L., Ferreira, D. and Dixon, R.A., 2003. Role of anthocyanidin reductase, encoded by BANYULS in plant flavonoid biosynthesis. *Science*, 299(5605): 396-399.
- modified low-density lipoproteins. *Nature*, 344(6262):160-162.
- Lee, P. and K. Prasad., 2003. Suppression of oxidative stress as a mechanism of reduction of hypercholesterolemic atherosclerosis by cyclooxygenase inhibitor in rabbits. *International Journal of Angiology*, 12, 13-23.
- Martirosyan, D.M., Miroshnichenko, L.A., Kulakova, S.N., Pogojeva, A.V. and Zoloedov, V.I., 2007. Amaranth oil application for coronary heart disease and Hypertension. *Lipids in Health and Disease*, 6: 1-12.
- Pascual-Teresa, S., Moreno, D.A. and García-Viguera, C., 2010. Flavanols and Anthocyanins in Cardiovascular Health: A Review of Current Evidence. *International Journal of Molecular Sciences*, 11(4): 1679-1703.
- Pignatelli, P., Di Santo, S., Buchetti, B., Sanguigni, V., Brunelli, A. and Violi, F., 2006. Polyphenols enhance platelet nitric oxide by inhibiting protein kinase C-dependent NADPH oxidase activation: effect on platelet recruitment. *The FASEB Journal*, 20: 1082-1089.
- Prasad, K., 2007. A study on regression of hypercholesterolemic atherosclerosis in rabbits by Flax Lignan complex. *Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics*, 12(4): 304-313.

Effects of hydroalcoholic extracts of *Amaranthus caudatus L.* on reduction of some of risk factors of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits

N. Kabiri^{1*}, S. Asgary² and P. Rahimi³

1*- Corresponding author, Department of Biology, Faculty of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

E-mail: kabiri_s97@yahoo.com

2- Isfahan Cardiovascular Research Center, Division of Basic Sciences, Isfahan, Iran

3- Department of Biology, Faculty of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

Received: August 2010

Revised: November 2010

Accepted: December 2010

Abstract

Hypercholesterolemia, cholesterol-enriched diet and oxidative stress may cause an increase in serum total cholesterol (TC) levels resulting in development of atherosclerosis. Antioxidants play an important role in inhibiting and scavenging free radicals. *Amaranthus caudatus L.* is a lipid-lowering and antioxidant agent. The objectives of this study were to determine the effect of *Amaranthus caudatus L.* in reduction of some risk factor for atherosclerosis associated with reduction of oxidative stress. rabbits were assigned to four groups: Group I, regular diet (control); Group II, 1% cholesterol diet for 75 days; Group III, 1% cholesterol diet (45 days) followed by regular diet(30 days); Group IV, 1% cholesterol diet (45 days) followed by regular diet and *Amaranthus caudatus* (30 days) (150 mg/kg body wt). Blood samples were collected from rabbits before (0 time) and after 45 days and 75 days of experimental diets for measurement of apolipoproteinB (apoB), malondialdehyde (MDA), apolipoproteinA (apoA) and OX-LDL. The results showed that application of *Amaranthus caudatus* for 30 days caused a significant decrease in apolipoproteinB (apoB), malondialdehyde (MDA) and OX-LDL. However apolipoproteinA (apoA) increased significantly. Whereas, no significant decrease of risk factors was observed in animals received only normal diet. Consequently, these effects of Amaranthus are associated with reductions in oxidative stress probably due to the antiatherogenic effects and it could be considered as an important diet in regression of atherosclerosis.

Key words: Regression, *Amaranthus caudatus L.*, rabbits, OX-LDL, MDA, apolipoprotein B, apolipoprotein A.