

اثرات غلظت‌های مختلف سرب و مس بر مقدار مالون‌دآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز (*Portulaca oleracea L.*) خرفه و کاتالاز در گیاه دارویی خرفه

مهلقا قربانلی^{*} و عادله کیاپور[†]

۱- نویسنده مسئول، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، پست الکترونیک: mghorbanli@goganiau.ir

۲- کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز تهران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۱

تاریخ اصلاح نهایی: اردیبهشت ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: شهریور ۱۳۸۹

چکیده

گیاه خرفه (*Portulaca oleracea L.*) متعلق به تیره Portulacaceae، عموماً به عنوان علف هرز شناخته شده و از نقطه نظر فیزیولوژیکی دارای قابلیت تحمل پذیری بسیار بالا در محیط‌های شور یا آلوده به فلزات سنگین بوده و گیاه مناسبی جهت کاشت و پالایش محیط و خاک از این گونه تنش‌ها به شمار می‌رود. به منظور نشان دادن اثرات دو فلز سنگین سرب و مس بر مالون‌دآلدهید، پرولین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان آزمایش‌هایی در طرحی کاملاً تصادفی اجرا شد. بدین منظور پس از کاشت گیاهان با شرایط یکسان در بستر استریل لیکا و تعذیب آنها با محلول غذایی هوگلن، تیمارهایی با غلظت‌های متفاوت (۰، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰۰ میکرومولار) از نمک دو فلز سنگین سرب (Pb(NO₃)₂) و مس (CuSO₄.5H₂O) به صورت جداگانه و همگی در سه تکرار به گیاهان اعمال گردید. پس از ده روز اعمال تیمار گیاهان جهت انجام آزمایشها برداشت شدند. نتایج نشان داد که جذب فلزات سرب و مس در تیمارهای دارای غلظت بالا در مقایسه با نمونه شاهد افزایش دارد. میزان جذب اتمی این عناصر در نمونه‌های ریشه بیشتر از اندام هوایی بود. میزان مالون‌دآلدهید در اندام هوایی و ریشه هر دو تنش سرب و مس از نمونه شاهد به سمت غلظت‌های بالا به طور معنی‌داری افزایش یافت. میزان اسید آمینه پرولین در هر دو تنش سرب و مس و هر دو قسمت اندام هوایی و ریشه به طور معنی‌دار روند افزایشی داشت. فعالیت آنزیم پراکسیداز در هر دو تنش سرب و مس و هر دو قسمت اندام هوایی و ریشه روند افزایشی و آنزیم کاتالاز روند کاهشی را به طور معنی‌دار نشان داد. به طور کلی میزان مالون‌دآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در نمونه‌های ریشه بیشتر از اندام هوایی بود و این نتیجه نشان داد که ریشه در گیاه خرفه جمع‌کننده عnde فلزات سنگین سرب و مس است. کمتر بودن فعالیت آنزیم کاتالاز در ریشه نسبت به اندام هوایی، حساسیت این آنزیم را نسبت به تجمع زیاد سرب و مس در ریشه اثبات نمود.

واژه‌های کلیدی: خرفه (*Portulaca oleracea L.*), فلزات سنگین، سرب، مس، پالایش گیاهی.

مقدمه

کشاورزی، پساب‌های صنعتی و لجن فاضلاب‌ها شاهد

رهاسازی فلزات سنگین به محیط زیست هستیم. فلزات سنگین مشکلات جدی برای محیط زیست بوجود آورده‌است. سرب و مس دو گونه از این فلزات هستند که

امروزه به دلیل گسترش صنایع، حفر معدن، استخراج فلزات، تخلیه فاضلاب‌ها و انهدام زباله‌ها، استفاده از کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها در

قابل توجهی هنوز در ارتباط با این گیاه گزارش نشده است (Okwuasaba *et al.*, 1986; Okwuasaba *et al.*, 1987b; Okwuasaba *et al.*, 1987a). در مطالعه‌ای برای فلاونوئیدها اثر ضد دردی و ضد التهابی گزارش شده است. عصاره‌ی الکلی و آبی این گیاه دارای اثرات مختلفی بر روی سیستم عصبی است که شامل کاهش فعالیت حرکتی، اثرات ضد تشنجی، مهار انقباضات عصبی عضلانی به دنبال تحریک الکتریکی و فعالیت شلکنندگی عضلانی در رت‌های هوشیار می‌باشد. این گیاه به عنوان آنتی‌سپتیک، ضد اسکوربیوت، ضد اسپاسمودیک، ضد دیورتیک، ضد کرم روده‌ای، ضد تب، شلکنندگی عضلانی، آنتی‌اکسیدان، تصفیه‌کننده‌ی خون و در جلوگیری از حمله قلبی و تقویت سیستم ایمنی کاربرد درمانی دارد (Okwuasaba *et al.*, 2000; Chan *et al.*, 2000; Rashed *et al.*, 2003; 1987c).

خرفه گیاهیست که مردم چین از آن به عنوان داروی ضد دیابت استفاده می‌کنند (Meng & Wu, 2008). *Portulaca oleracea* (POP) پلی‌ساکاریدهای این گیاه (Polysaccharides فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی زیادی شناخته‌اند. Li و همکاران (۲۰۰۹) با بررسی پلی‌ساکاریدهای گیاه خرفه دریافتند که این ماده ضد افزایش گلوکز خون است. دوز ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم POP بیشترین اثر را در پایین آوردن قند خون در موش‌های آزمایشگاهی دیابتیک نشان داد. علاوه‌بر این دوز ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم این ماده توانست سطح انسولین سرمی موش‌های آزمایشگاهی دیابتیک را تا حد قابل توجهی بالا ببرد. همان‌طور که می‌دانیم بیماران مبتلا به دیابت علاوه‌بر هایپرگلایسمی دچار هایپرلیپیدمی هم هستند. زیرا کاهش سطح لیپولیز (تجزیه چربی) نیز تحت تأثیر انسولین است

علاوه‌بر آلدگی محیط زیست، درون بافت‌های گیاهی تجمع می‌یابند و باعث سمیت گیاهی می‌شوند. به تکنولوژی استفاده از گیاهان انباست کننده فلزات برای جذب فلزات از خاک و انتقال آنها به شاخه‌های قابل برداشت گیاهان، پالایش گیاهی گویند (Tiwari *et al.*, 2006; Mohanapriya, 2006; Deepa *et al.*, 2008).

گیاه خرفه (*Portulaca oleracea*) متعلق به زیر رده Caryophyllidae می‌شود، در بیشتر اقلیم‌ها به خصوص آب و هوای گرم و خشک یا استپی قادر به رویش است. این گیاه دارای بوته‌های علفی، خوابیده و گوشتی با ساقه‌های بدون کرک، گوشتی و اغلب قرمز رنگ می‌باشد. به دلیل تجمع زیاد آب در برگ‌ها برای رفع گرمایندگی، التهاب، آفتاب‌سوختگی و یا دردهای سوختگی مورد استفاده دارد. در برخی از منابع خواص درمانی دیگری از جمله درمان کوفتگی، رفع میخچه و خواص تب‌بری را برای آن ذکر کرده‌اند و این خواص ضد التهابی را به اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ در آن نسبت داده‌اند (Teixeirats *et al.*, 2010).

آزمایش‌های فیتوشیمیایی عصاره‌ی خرفه نشان داد که این گیاه یک منبع غنی از اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶، موسیلاز، ویتامین‌های آ، ب، ث، آلفا-توکوفرول، اسکوربیک اسید، بتا-کاروتون، گلوتاتیون، آلفا-لینولئیک اسید، پروتئین، ساکارید، پکتین، موسیلاز، نورادرنالین، دوپامین، مواد معدنی شامل کلسیم، پتاسیم، آهن، فسفر، منگنز، مس و اسیدهای آلی شامل سینامیک اسید، کافئیک اسید، مالیک اسید، اگزالیک اسید، سیتریک اسید و نیز شامل کومارین‌ها، فلاونوئیدها و گلیکوزیدهای آنتراکینونی می‌باشد (Chan *et al.*, 2000).

خاصیت التیام بخشیدن به زخم توسط عصاره‌ی خرفه نیز گزارش شده است. قابل ذکر است که هیچ نشانه سمی

تنش تولید شده و باعث محافظت از گیاه در مقابل صدمات می‌گردد (Posmyk *et al.*, 2008; Wang *et al.*, 2009). کاتالاز و پراکسیداز نیز متالوآنژیم‌هایی هستند که اثر تحریب یون‌های سوپراکسید را دفع می‌کنند. این آنزیم‌ها سیستم دفاعی را جهت بقاء موجودات هوایی فراهم می‌آورند (Pandey *et al.*, 2009; Posmyk *et al.*, 2006; Srivastava *et al.*, 2008).

در رابطه با تحقیقات گذشته در مورد گیاه خرفه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیان ژن آنزیم امگا-۳-۲ فتی اسید دساقچوراز در بافت‌های مختلف گیاه خرفه و در پاسخ به تنش‌های سرما و خودگی بررسی گردید (Teixeirats *et al.*, 2010). خاصیت ضددیابتی پلی‌ساقاریدهای گیاه خرفه شناسایی شد (Li *et al.*, 2009). قابلیت پالایش گیاهی در دو گونه Portulaca tuberosa rox و Portulaca oleracea L. متفاوت از گیاه خرفه (*Portulaca oleracea* L.) مطالعه شد و تغییرات رشد طبیعی آنها در اماكن صنعتی هندوستان مورد بررسی قرار گرفت (Tiwari *et al.*, 2008). میزان تجمع فلز سنگین مس در گیاه خرفه و دو نوع خاک مورد بررسی قرار گرفت و قابلیت قلمه‌های ساقه به عنوان جمع‌کننده این فلز اثبات گردید (Deepa *et al.*, 2006). تأثیر نمک‌های سولفات مس و نیترات مس در محیط آبی و به طور مقایسه‌ای بر قابلیت تجمع فلز مس مورد مطالعه قرار گرفت و خرفه به عنوان گیاهی دارویی معرفی شد (Mohanapriya *et al.*, 2006).

به دلیل فراوانی بذر و انتشار آسان گیاه خرفه، همچنین تحمل بالا به خشکی، شوری و فلزات سنگین (Deepa *et al.*, 2006; Tiwari *et al.*, 2008) بررسی این علف هرز به عنوان گیاه انباستکننده فلزات سنگین

(Sharma *et al.*, 2003). استفاده از مکمل خوراکی POP در موش‌های آزمایشگاهی دیابتیک باعث کاهش قابل‌توجهی در سطح چربی سرمی نسبت به گروه شاهد شد که ضد هایپرلیپیدمی بودن POP را اثبات می‌کند. POP با بستن کانال‌های K^+ -ATP، دی‌لاریزاسیون غشاء سلولی و تحریک انتشار به درون یون Ca^{2+} ترشح انسولین را القا می‌نمایند (Ryle *et al.*, 1984).

اثر سمتی فلزات سنگین از جمله مس و سرب مربوط به تنش‌های اکسیداتیو ثانویه است که به افزایش تولید گونه‌های مضر و فعال اکسیژن (ROS) منجر می‌گردد (Nasim & Dhir, 2010; Pandey *et al.*, 2009). این گونه‌های مضر و فعال شامل رادیکال‌های هیدروکسیل (OH[−]), فنوکسی (RO[°]), پراکسید (ROO[°]), سوپراکسید (O₂[°]), هیدروژن پراکسید (H₂O₂), و اکسیژن یکتاوی (O₂¹) است. مس فلزی ردوكس-فعال است که از طریق واکنش فتوتون تولید رادیکال هیدروکسیل را تسريع می‌نماید. به علاوه فلزاتی چون روی و سرب ردوكس-غیرفعال یا غيرردوكس هستند که منابع آنتی‌اکسیدان سلولی را غيرفعال کرده و به تعادل متابوليکی صدمه وارد می‌کنند. در نتیجه هر دو فلز سرب و مس باعث افزایش تولید ROS می‌شوند (Choudhary *et al.*, 2007). تولید رادیکال‌های آزاد نتیجه انواع مختلفی از شرایط استرس‌زاست (Apel & Hirt, 2004). گونه‌های فعال اکسیژن به غشاء پلاسمایی صدمات اکسیداتیو می‌زنند. در نهایت، به دلیل فعالیت پراکسیدی تجزیه اسیدهای چرب غیراشباع صورت گرفته و یون‌های پراکسید و مالون‌آلدهید آزاد می‌شود که در نهایت باعث مرگ سلول می‌گردد (Hall, 2002; Choudhary *et al.*, 2007). اسید‌آمینه پرولین به مقدار زیاد در گیاهان تحت شرایط

آنژیمی بود که در اندازه‌گیری دو فلز سنگین از وزن خشک اندام هوایی و ریشه و در بقیه سنجش‌ها از وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاه استفاده شد.

اندازه‌گیری میزان عناصر

نمونه‌های خشک گیاهی تهیه شده از اندام هوایی و ریشه دو تیمار شاهد و ۱۵۰۰ میکرومولار، جهت سنجش دقیق عناصر و مقایسه میزان جذب توسط محلولی از HCl:HNO₃ به مدت یک ساعت در بن‌ماری ۹۵ درجه سانتی‌گراد هضم شدند. بعد از طی زمان لازم، نمونه‌ها خنک و صاف شدند. غلظت عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل An-200 Spectra آندازه گرفته و بر حسب ppm بیان شد (Allen *et al.*, 1986; Morghan, 1993).

اندازه‌گیری مقدار مالون‌دآلدهید

طبق این روش (Heath & Packer, 1969)، ۰/۲ گرم از بافت تازه برگ یا ریشه را توزین و در هاون چینی حاوی ۵ میلی‌لیتر تری‌کلرواستیک اسید (TCA) ۰/۱٪ ساییده شد. عصاره حاصل با استفاده از دستگاه سانتریفوژ به مدت ۵ دقیقه در ۱۰۰۰g سانتریفوژ گردید. به ۱ میلی‌لیتر از محلول رویی حاصل، ۴/۵ میلی‌لیتر از محلول TCA که حاوی ۰/۵٪ تیوباریتوريک اسید (TBA) بود، اضافه شد. محلول حاصل به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد حمام آب گرم حرارت داده شد. سپس بلافارسله در یخ سرد و دوباره مخلوط به مدت ۱۰ دقیقه در ۱۰۰۰g سانتریفوژ گردید. جذب این محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۳۲ نانومتر خوانده شد. غلظت کمپلکس MDA-TBA با استفاده از معادله $A = \epsilon BC$ محاسبه شد، که در آن A: جذب خوانده شده در دستگاه اسپکتروفوتومتر، ε: ضریب خاموشی معادل

و استفاده از آن در تکنولوژی موسوم به پالایش گیاهی (Phytoremediation) جالب به نظر می‌رسد. همچنین بررسی نحوه واکنش آن نسبت به غلظت‌های افزایش‌یافته سرب و مس در ارتباط با مکانیسم‌های دفاعی این گیاه از اهداف این پژوهش است.

مواد و روشها

این پژوهش براساس طرحی کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد که در آن گیاهان در مععرض تنفس فلز سنگین سرب و مس قرار گرفتند. بذرهای مورد استفاده گیاه خرفه از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در بهار ۱۳۸۸ تهیه گردید. ابتدا بذرها توسط محلول ۵٪ هیپوکلریت سدیم به مدت ۵ دقیقه ضدغونی و سپس سه مرتبه توسط آب مقطر شستشو داده شدند. بذرها بعد از سترون‌سازی به منظور تولید دانه‌رس است در ظروف محتوی لیکا (دانه‌های رس سبک منبسط شده) کاشته شدند و تا زمان تولید دانه رس‌هایی به طول ۸ سانتی‌متر با آب مقطر آبیاری و پس از آن جهت رشد با محلول غذایی هوگلن، (Hogland & Arnon, 1950)، تغذیه گردیدند.

در مرحله بعد تیمارهایی با غلظت‌های متفاوت ۰، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ میکرومولار از نمک دو فلز سنگین سرب (Pb(NO₃)₂) و مس (CuSO₄.5H₂O) به صورت جداگانه تولید شده و تیماردهی به مدت ده روز انجام گرفت. گیاهان جمع‌آوری و به خوبی با آب مقطر شستشو داده شدند. پس از خشک شدن، اندام هوایی و ریشه از محل یقه جدا و از آنها جهت انجام آنالیزهای مختلف استفاده شد. این آنالیزها شامل اندازه‌گیری دو فلز سنگین، سنجش مقدار مالون‌دآلدهید، سنجش مقدار پرولین، استخراج عصاره پروتئینی و اندازه‌گیری فعالیت

خارج و محلول رویی از چند لایه صافی عبور داده شد (Sudhakar *et al.*, 2001). عصاره‌های پروتئینی حاصل برای بررسی میزان فعالیت آنزیم‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

اندازه‌گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز
پس از استخراج عصاره پروتئینی، مقدار ۲ میلی‌لیتر بافر تریس ۱۰۰ میلی‌مولار با pH ۷/۵، ۰/۳ میلی‌لیتر آب اکسیژنه ۵ میلی‌مولار و ۰/۲ میلی‌لیتر پیروگالل ۱۰ میلی‌مولار، در حمام یخ با ۵۰ میکرولیتر عصاره آنزیمی مخلوط و پس از ۲ دقیقه تغییرات جذب در طول موج ۴۲۵ نانومتر خوانده شد و بر حسب $\mu\text{mol}^{-1} (\text{protein}) \text{min}^{-1}$ (H₂O₂) بیان گشت (Kar & Mishra 1976).

اندازه‌گیری فعالیت آنزیم کاتالاز
پس از استخراج عصاره پروتئینی، مقدار ۲/۵ میلی‌لیتر بافر فسفات ۵۰ میلی‌مولار با pH برابر ۷ و ۰/۳ میلی‌لیتر آب اکسیژنه ۳/۳٪ را در حمام یخ با ۰/۲ میلی‌لیتر عصاره آنزیمی مخلوط و پس از ۲ دقیقه تغییرات جذب در طول موج ۵۳۰ نانومتر خوانده شد و بر حسب $\mu\text{mol}^{-1} (\text{protein}) \text{min}^{-1}$ (Aebi, 1984) بیان گشت.

نتایج

پس از انجام محاسبات با استفاده از برنامه آماری spss، نتایج زیر بدست آمد. مقایسه جذب اتمی نمونه‌های شاهد و ۱۵۰۰ میکرومولار دو فلز سنگین سرب و مس در دو بافت اندام هوایی و ریشه نشان داد که در نمونه‌های شاهد اندام هوایی غلظت فلز مس ۴۸۷/۶۷ و بیشتر از غلظت فلز سرب ۱۱۰٪ است. در نمونه‌های شاهد ریشه غلظت فلز مس ۵۲۲/۶۷ و بیشتر از غلظت فلز سرب

$155 \text{ cm}^{-1} \text{ mM}^{-1}$ ، B: عرض کووت برابر ۱ سانتی‌متر و C: غلظت کمپلکس بر حسب $\mu\text{mol g}^{-1} \text{ FW}$ می‌باشد.

اندازه‌گیری مقدار پروولین

طبق روش Bates و همکاران (۱۹۷۳) ۰/۵ گرم از بافت تر گیاهی توزین و در هاون چینی حاوی ۱۰ میلی‌لیتر سولفوسالیسیلیک اسید ساییده شد. مخلوط همگن بدست آمده با استفاده از کاغذ واتمن شماره ۲ صاف گردید. از هر کدام از محلول‌های حاصل ۲ میلی‌لیتر برداشته شد و در لوله‌های آزمایش ریخته شد و سپس به هر یک ۲ میلی‌لیتر معرف نین‌هیدرین و ۲ میلی‌لیتر استیک اسید خالص افزوده شد. لوله‌ها به مدت یک ساعت در بن‌ماری ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و سپس در حمام یخ قرار گرفت. به هر کدام از لوله‌ها ۲ میلی‌لیتر تولوئن افزوده و به شدت تکان داده شدند. آنگاه ۲۰ ثانیه در حال سکون نگه داشته شد تا دو فاز کاملاً مجزا تشکیل گردید. مقدار معینی از لایه رنگی فوقانی جهت سنجش غلظت پروولین در دستگاه اسپکتروفتوometر قرار گرفت و جذب آن در طول موج ۵۳۲ نانومتر خوانده شد. با استفاده از منحنی استاندارد پروولین مقدار این ماده بر حسب $\mu\text{mol g}^{-1} \text{ FW}$ محاسبه شد.

استخراج عصاره پروتئینی

مقدار یک گرم از اندام هوایی و ریشه به صورت جداگانه در هاون چینی محتوی ۵ میلی‌لیتر بافر تریس ۰/۰۵ HCl ۷/۵ pH مولار با به مدت ۳۰ دقیقه در حمام یخ کاملاً ساییده شد. همگنای حاصل پس از ۱۰ دقیقه سکون، مدت ۲۰ دقیقه در ۱۳۰۰۰ دور و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد با استفاده از دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار، سانتریفوژ گردید. در پایان لوله‌ها به آرامی از دستگاه

تنش مس بیشتر از سرب و در ریشه بیشتر از اندام هوایی بدست آمد (جدول ۳). افزایش کاملاً معنی‌دار فعالیت آنزیم پراکسیداز در همه تیمارها نسبت به نمونه شاهد، هم در اندام هوایی و هم در ریشه و هر دو تنش سرب و مس دیده شد. فعالیت پراکسیداز در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز مس به ترتیب برابر $0/771$ و $0/798$ بدست آمد که به $0/808$ و $0/835$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار افزایش یافت. غلظت این ماده در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز سرب به ترتیب برابر $0/722$ و $0/720$ بدست آمد که به $0/733$ و $0/740$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار افزایش یافت. یعنی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش مس بیشتر از سرب و در ریشه بیشتر از اندام هوایی است (جدول ۴). کاهش کاملاً معنی‌دار فعالیت آنزیم کاتالاز در همه تیمارها نسبت به نمونه شاهد، هم در اندام هوایی و هم در ریشه و هر دو تنش سرب و مس دیده شد. فعالیت کاتالاز در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز مس به ترتیب برابر $0/367$ و $0/357$ بدست آمد که بتدريج کاهش یافت و به $0/288$ و $0/240$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار رسید. غلظت این ماده در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز سرب به ترتیب برابر $0/392$ و $0/365$ بدست آمد که بتدريج کاهش یافت و به $0/357$ و $0/334$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار رسید. بنابراین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در تنش مس کمتر از سرب و در ریشه کمتر از اندام هوایی بدست آمد (جدول ۵).

$156/0$ است. در نمونه‌های تیمار 1500 میکرومولار غلظت فلز سرب در ریشه گیاه برابر $4925/0$ و تقریباً سه برابر اندام هوایی با غلظت برابر $1275/67$ است. غلظت فلز مس در ریشه گیاه برابر $3805/67$ و نسبت به اندام هوایی با غلظت برابر $2207/67$ تقریباً 3 به 2 است (جدول ۱). افزایش معنی‌دار غلظت مالون‌آلدهید در بیشتر تیمارها نسبت به نمونه شاهد دیده شد. غلظت مالون‌آلدهید در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز مس به ترتیب برابر $0/024$ و $0/028$ بدست آمد که به $0/029$ و $0/033$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار افزایش یافت. غلظت این ماده در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز سرب به ترتیب برابر $0/022$ و $0/027$ بدست آمد که به $0/028$ و $0/032$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار افزایش یافت. بنابراین غلظت مالون‌آلدهید در تنش مس اندکی بیشتر از سرب و در ریشه بیشتر از اندام هوایی بدست آمد (جدول ۲). افزایش کاملاً معنی‌دار غلظت پرولین در همه تیمارها نسبت به نمونه شاهد، هم در اندام هوایی و هم در ریشه و هر دو تنش سرب و مس دیده شد. غلظت پرولین در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز مس به ترتیب برابر $0/0001$ و $0/0002$ بدست آمد که بتدريج افزایش یافت و به $0/0098$ و $0/0144$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار رسید. غلظت این ماده در نمونه‌های شاهد اندام هوایی و ریشه تیمار دیده با محلول نمک فلز سرب به ترتیب برابر $0/0008$ و $0/0001$ و $0/0001$ بدست آمد که بتدريج افزایش یافت و به $0/0043$ و $0/0072$ در نمونه‌های تیمار دیده با غلظت 1500 میکرومولار رسید. به این معنا که غلظت پرولین در

جدول ۱- تغییرات جذب عناصر در اندام هوایی و ریشه بر حسب ppm
نسبت به افزایش غلظت سرب و مس در محلول غذایی

ریشه	اندام هوایی				تیمارها
	مس	سرب	مس	سرب	
۵۲۲/۶۷	۱۵۶/۰۰	۴۸۷/۶۷	۱۱۰/۰۰	± ۱/۱۰۵	شاهد
± ۴/۲۵۶	± ۲/۸۸۷	± ۱/۴۵۳	± ۳/۱۸۰		
۳۸۰۵/۶۷	۴۹۲۵/۰۰	۲۲۰۷/۶۷	۱۲۷۵/۶۷	± ۳/۹۳۰	۱۵۰۰ μM
± ۲/۶۰۳	± ۲/۶۴۶	± ۳/۹۳۰	± ۳/۱۸۰		

مقایسه میانگین‌ها (میانگین سه تکرار ± انحراف معیار) براساس آزمون دانکن $p \leq 0.05$

جدول ۲- تغییرات مالوندآلدهید در اندام هوایی و ریشه بر حسب FW $\mu\text{mol g}^{-1}$
نسبت به افزایش غلظت سرب و مس در محلول غذایی

ریشه	اندام هوایی				تیمارها
	مس	سرب	مس	سرب	
۰/۰۲۸ d	۰/۰۲۷ c	b ۰/۰۲۴	۰/۰۲۳ d	± ۰/۰۰۱	شاهد
± ۰/۰۰۱	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۱	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۲۹ d	۰/۰۲۸ c	b ۰/۰۲۵	۰/۰۲۳ d	± ۰/۰۰۰	۱۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۳۰ c,d	۰/۰۲۸ c	b ۰/۰۲۶	۰/۰۲۴ c,d	± ۰/۰۰۰	۵۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۳۱ b,c	۰/۰۲۹ c	۰/۰۲۶ b	۰/۰۲۵ c,d	± ۰/۰۰۰	۱۰۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۱	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۳۲ a,b	۰/۰۳۰ b,c	۰/۰۲۸ a	۰/۰۲۶ b,c	± ۰/۰۰۰	۵۰۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۳۳ a	۰/۰۳۱ a,b	۰/۰۲۹ a	۰/۰۲۷ a,b	± ۰/۰۰۰	۱۰۰۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰		
۰/۰۳۳ a	۰/۰۳۲ a	۰/۰۲۹ a	۰/۰۲۸ a	± ۰/۰۰۰	۱۵۰۰ μM
± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰	± ۰/۰۰۰		

مقایسه میانگین‌ها (میانگین سه تکرار ± انحراف معیار) براساس آزمون دانکن $p \leq 0.05$
حروف غیرمشترک معرف تفاوت معنی‌دار در سطح ۵٪ است.

جدول ۳- تغییرات پرولین در اندام هوایی و ریشه بر حسب $\mu\text{mol g}^{-1}\text{FW}$
نسبت به افزایش غلظت سرب و مس در محلول غذایی

ریشه	اندام هوایی				تیمارها
	مس	سرب	مس	سرب	
•/••••٢ e ± •/•••	•/••••١ f ± •/•••	•/••••١ e ± •/•••	•/••••٨ g ± •/•••	شاهد	$10\mu\text{M}$
•/•••٥٢ d ± •/•••	•/••••١٨ e ± •/•••	•/••••٦ e ± •/•••	•/••••٤ f ± •/•••		
•/•••٦٢ d ± •/•••	•/••••٢٣ d,e ± •/•••	•/••••٢٢ d ± •/•••	•/••••٧ e ± •/•••	$50\mu\text{M}$	$100\mu\text{M}$
•/•••٧ d ± •/•••	•/••••٣١ c,d ± •/•••	•/••••٣٩ c ± •/•••	•/••••١١ d ± •/•••		
•/•••٨٣ c ± •/•••	•/••••٣٢ c ± •/•••	•/••••٤٦ c ± •/•••	•/••••١٨ c ± •/•••	$500\mu\text{M}$	$1000\mu\text{M}$
•/•••١٢٧ b ± •/•••	•/••••٤٦ b ± •/•••	•/••••٧٥ b ± •/•••	•/••••٣٥ b ± •/•••		
•/•••١٤٤ a ± •/•••	•/••••٧٢ a ± •/•••	•/••••٩٨ a ± •/•••	•/••••٤٣ a ± •/•••	$1000\mu\text{M}$	$1500\mu\text{M}$

مقایسه میانگین‌ها (میانگین سه تکرار ± انحراف معیار) براساس آزمون دانکن $p \leq 0.05$
 حروف غیرمشترک معرف تفاوت معنی‌دار در سطح ۵٪ است.

جدول ۴- تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی و ریشه بر حسب $\text{mol (H}_2\text{O}_2\text{) mg}^{-1}$ (protein) min^{-1}
نسبت به افزایش غلظت سرب و مس در محلول غذایی

ریشه	اندام هوایی				تیمارها
	مس	سرب	مس	سرب	
•/•٩٨ e ± •/••١	•/•٧٢٢ e ± •/••١	•/•٧٧١ e ± •/••١	•/•٧١٠ d ± •/••١	$10\mu\text{M}$	شاهد
•/•٨٠٧ d ± •/•••	•/•٧٢٦ d ± •/•••	•/•٧٧٤ d,e ± •/•••	•/•٧١٣ c,d ± •/•••		
•/•٨٠٩ c,d ± •/••١	•/•٧٢٩ c ± •/•••	•/•٧٧٧ d ± •/•••	•/•٧١٤ c,d ± •/•••	$50\mu\text{M}$	$100\mu\text{M}$
•/•٨١٠ c,d ± •/•••	•/•٧٣٠ b,c ± •/•••	•/•٧٨٢ c ± •/•••	•/•٧١٦ b,c ± •/•••		
•/•٨١١ c ± •/•••	•/•٧٣١ b,c ± •/•••	•/•٧٨٣ c ± •/•••	•/•٧١٩ b ± •/•••	$100\mu\text{M}$	$500\mu\text{M}$
•/•٨١٨ b ± •/•••	•/•٧٣٢ b ± •/•••	•/•٧٩٥ b ± •/•••	•/•٧٢٠ b ± •/•••		
•/•٨٣٥ a ± •/••٢	•/•٧٤٠ a ± •/••١	•/•٨٠٨ a ± •/••٢	•/•٧٣٣ a ± •/••٢	$1000\mu\text{M}$	$1500\mu\text{M}$

مقایسه میانگین‌ها (میانگین سه تکرار ± انحراف معیار) براساس آزمون دانکن $p \leq 0.05$
 حروف غیرمشترک معرف تفاوت معنی‌دار در سطح ۵٪ است.

جدول ۵- تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز در اندام هوایی و ریشه بر حسب $\mu\text{mol} (\text{H}_2\text{O}_2) \text{ mg}^{-1} (\text{protein}) \text{ min}^{-1}$

ریشه	اندام هوایی				تیمارها
	مس	سرب	مس	سرب	
۰/۳۵۷ a ± ۰/۰۰۰	۰/۳۶۵ a ± ۰/۰۰۰	۰/۳۶۷ a ± ۰/۰۰۷	۰/۳۹۲ a ± ۰/۰۰۱	۰/۳۹۲ a ± ۰/۰۰۱	شاهد $10\mu\text{M}$
۰/۲۸۷ b ± ۰/۰۰۰	۰/۳۶۴ a,b ± ۰/۰۰۰	۰/۳۵۰ b ± ۰/۰۰۶	۰/۳۸۶ b ± ۰/۰۰۱	۰/۳۸۶ b ± ۰/۰۰۱	
۰/۲۸۳ b ± ۰/۰۰۱	۰/۳۶۱ b,c ± ۰/۰۰۱	۰/۳۴۲ b,c ± ۰/۰۰۶	۰/۳۸۲ c ± ۰/۰۰۱	۰/۳۸۲ c ± ۰/۰۰۱	$50\mu\text{M}$
۰/۲۸۱ b ± ۰/۰۰۱	۰/۳۵۹ c,d ± ۰/۰۰۱	۰/۳۳۲ c,d ± ۰/۰۰۴	۰/۳۷۹ c,d ± ۰/۰۰۰	۰/۳۷۹ c,d ± ۰/۰۰۰	
۰/۲۷۷ b,c ± ۰/۰۰۱	۰/۳۵۷ d ± ۰/۰۰۱	۰/۳۲۱ d ± ۰/۰۰۴	۰/۳۷۸ d ± ۰/۰۰۰	۰/۳۷۸ d ± ۰/۰۰۰	$100\mu\text{M}$
۰/۲۶۸ c ± ۰/۰۰۱	۰/۳۴۸ e ± ۰/۰۰۱	۰/۳۰۵ e ± ۰/۰۰۲	۰/۳۶۳ e ± ۰/۰۰۱	۰/۳۶۳ e ± ۰/۰۰۱	
۰/۲۴۰ d ± ۰/۰۰۲	۰/۳۳۴ f ± ۰/۰۰۲	۰/۲۸۸ f ± ۰/۰۰۲	۰/۳۵۷ f ± ۰/۰۰۱	۰/۳۵۷ f ± ۰/۰۰۱	$1500\mu\text{M}$

مقایسه میانگین‌ها (میانگین سه تکرار ± انحراف معیار) براساس آزمون دانکن $p \leq 0/05$ است.
حروف غیر مشترک معرف تفاوت معنی‌دار در سطح ۵٪ است.

صدمات اکسیداتیو است و معمولاً به عنوان معیاری برای استرس اکسیداتیو شناخته می‌شود (Sun *et al.*, 2010; Nasim & Dhir, 2010). پراکسیداسیون لیپیدها وابسته به تولید رادیکال سوپراکسید (O_2^-) است و در نتیجه تخریب غشاهای زیستی ماده‌ای به نام مالون‌دآلدهید در سلول‌ها افزایش می‌یابد. از طرفی اسید آمینه پروولین که از گلوتامات بوجود می‌آید نقشی کلیدی در تنظیم اسمزی Laliberte & Hellebust, (Ahmad & Hellebust, 1988; Nikolopoulos & Manetas, 1989), حفاظت آنزیمی (Paleg *et al.*, 1984; 1991; Pandey *et al.*, 2009; Wang *et al.*, 2009)، پایداری و بقاء ماشین ستر پروتئین (Kadpal & Rao, 1985)، تنظیم اسیدیتیه سلول

بحث

اثرات سمی فلزات سنگین به دلیل تولید رادیکال‌های آزاد است. در گیاهان عالی فلزات سنگین از جمله سرب و مس باعث القای تولید رادیکال سوپراکسید، هیدروژن پراکسید، هیدروکسیل و اکسیژن یکتاپی می‌گردد (Tiwari *et al.*, 2008) به سرعت می‌تواند تمام انواع ملکول‌های زیستی مانند اسیدهای نوکلئیک، پروتئین‌ها، اسیدهای آمینه و لیپیدها را هدف حمله قرار بدهد که به نقص عملکرد متابولیکی غیرقابل بازگشت و نهایتاً مرگ سلولی منجر می‌گردد (Pandey *et al.*, 2009). پراکسیداسیون لیپیدها نشانه ایجاد و توسعه

انتقال الکترون و دیگر آنزیم‌های چرخه‌های بی‌شمار زیستی است. برخلاف آن سرب جزء فلزات تشکیل‌دهنده پیکره گیاه نبوده و تنها ممکن است به‌دلیل آلودگی هوا و سرب ناشی از آلاینده‌های محیط و یا آلودگی محیط‌های آزمایشگاهی وارد گیاه شود. از طرفی ذکر نکته مهمی حائز اهمیت است و آن اینکه علاوه بر مطلب فوق، باید توجه داشته باشیم که محلول غذایی هوگلنند دارای مس و بدون سرب است. نمونه‌های اندام هوایی و ریشه در هر دو فلز سرب و مس تا حد زیادی مشابه بودند که شاهد بودن و تیمار نشدن این دو اندام را با فلز سنگین به خوبی گواهی می‌دهد. از سویی دیگر مقایسه گیاهان گروه تیمار دیده با غلظت ۱۵۰۰ میکرومولار از این دو فلز نشان داد که به‌دلیل ضروری بودن مس جذب آن بیشتر صورت گرفته و بالعکس گیاه سعی بر ممانعت از ورود سرب به خود داشته است. همچنین بیشتر بودن غلظت فلز در ریشه نسبت به اندام هوایی بیانگر بیشتر انجام گرفتن عمل جذب در این اندام است. تفاوت قابل توجهی میان غلظت فلز در اندام‌های هوایی گیاهان تیمار دیده با فلزات سرب و مس وجود دارد. بدین معنا که غلظت فلز مس در اندام هوایی به‌طور مشخصی بیشتر از غلظت فلز سرب است و این نتیجه کم تحرکی سرب و متحرک‌تر بودن مس را به اثبات می‌رساند. همین پدیده عامل اصلی صدمه دیدن بیشتر گیاه از غلظت‌های افزایش یافته فلز مس نسبت به سرب است. زیرا در چرخه فتوستز و انتقال الکترون اختلال ایجاد کرده و رادیکال‌های آزادی که از واکنش فتوون بوجود می‌آید، موجب سمیت بیشتر گیاه می‌شود. نتایج ما مشابه MacFarlane و Burchett (۲۰۰۱) بود. در گیاه حرا (*Avicennia marina*) جذب مس در بافت برگ به سرعت و تا غلظت معینی (۴۰۰ µg/g DW) به‌طور

(Venekemp, 1989) و جمع‌آوری رادیکال‌های آزاد (Smirnoff & Cumbes, 1989) ایفا می‌کند. همچنین این ماده به‌طور مؤثری اثرات مضر اکسیژن یکتایی را تعدیل می‌نماید (Mohanty & Matysik, 2001)، بنابراین افزایش این ماده در تنفس‌ها انتظار می‌رود. به علاوه تخریب سوپراکسید و هیدروژن پراکسید نیاز به فعالیت مؤثر تعداد زیادی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان دارد. سوپراکسید به Bowler سرعت با فعالیت SOD به H_2O_2 تبدیل می‌شود (et al., 1992) کاتالازها H_2O_2 را در پراکسیزوم‌ها به آب و اکسیژن ملکولی تبدیل می‌نمایند (Noctor & Foyer, 1998). روش دیگر از بین رفتن H_2O_2 توسط پراکسیدازهاست. پراکسیدازها که سرتاسر سلول یافت می‌شوند میل ترکیبی بیشتری با H_2O_2 نسبت به کاتالاز دارند (Jimenez et al., 1997). آنزیم‌هایی که در چرخه آسکوربات-گلوتاتیون هستند، یعنی چرخه‌ای که در آن H_2O_2 جاروب می‌شود، بسیار فعالند. در این چرخه آسکوربات پراکسیداز به‌واسطه آسکوربات، فرایند احیاء H_2O_2 را به آب تسریع می‌کند و دهیدروآسکوربات بوجود آمده مجدداً به کمک GR (گلوتاتیون ردوکتاز) به آسکوربات تبدیل می‌شود (Iturbe-ormaetxe et al., 2001). پراکسیداز و کاتالاز دو نمونه از آنزیم‌هایی هستند که تغییر فعالیتشان در تنفس‌ها به‌طور گستردگی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است.

در این تحقیق مقایسه گیاهان گروه شاهد نشان داد که غلظت مس در گیاهان شاهد بسیار بیشتر از میزان سرب در این دسته از گیاهان است. این نتیجه ضرورت و ریزمندی بودن فلز مس و غیرضروری بودن فلز سرب را اثبات می‌کند. چون مس به‌طور عادی در گیاهان وجود دارد. این فلز جزء جدایی‌ناپذیر آنزیم‌های متعدد چرخه

مالون‌دآلدهید در ریشه‌های تنش دیده با هر دو فلز نسبت به اندام هوایی بیشتر بود. از طرفی بررسی‌های آماری بیانگر بیشتر بودن غلظت مالون‌دآلدهید در هر دو بخش اندام هوایی و ریشه تنش مس نسبت به تنش سرب است. همچنین افزایش تولید رادیکال‌های آزاد در شرایط تنش فلزات سنگین از طریق افزایش غلظت مالون‌دآلدهید اثبات شد که مطابق با کارهای Posmyk و همکاران (۲۰۰۸) بر روی کلم قرمز است. انجام آزمایش روی نخودفرنگی (Li, Limonium bicolor (Chaoui et al., 1997) (2008) نشان داد که پراکسیداسیون چربی‌ها و تجمع هیدروژن پراکسید در سلول‌ها باعث تخریب فسفولیپیدهای غشاء و افزایش غلظت مالون‌دآلدهید می‌گردد.

افزایش غلظت مالون‌دآلدهید و پرولین نسبت به افزایش غلظت فلزات سنگین نشان‌دهنده ارتباط بین تولید رادیکال‌های آزاد و تجمع پرولین است. در تحقیق ما افزایش معنی‌دار پرولین در هر دو تنش سرب و مس و هر دو اندام بخش هوایی و ریشه دیده شد (جدول ۳). غلظت پرولین در ریشه هر دو فلز نسبت به اندام هوایی بیشتر بود. از طرفی بررسی‌های آماری بیانگر بودن غلظت این ماده در هر دو بخش اندام هوایی و ریشه تنش مس نسبت به تنش سرب است. در گزارش ارائه شده توسط Choudhary و همکاران (۲۰۰۷) بر روی نوعی سیانوباکتری (*Cyanobacterium spirulina platensis*) تحت تنش فلزات سنگین افزایش غلظت پروتئین کل دیده شد که نشان‌دهنده افزایش اسید آمینه پرولین به طور خاص بود. ضمن اینکه سنجش این اسید آمینه به تنها بی نیز افزایش مقدار را نشان می‌داد. افزایش پرولین به دلیل قابلیت کلات شدن این اسید آمینه با یون‌های فلزی و

افزایشی جذب می‌شود و از آن به بعد تقریباً ثابت می‌ماند. حال آنکه الگوی تجمع و جذب سرب در بافت برگ تا دامنه وسیعی از غلظت‌ها کم و تدریجی است به‌طوری که بعد از غلظت DW $400 \mu\text{g/g}$ نیز همین‌طور آرام، تدریجی و افزایشی جذب می‌گردد و مانند مس در این غلظت تقریباً ثابت نمی‌گردد. بعد از این مرحله سدّ دفاعی گیاه نسبت به سرب از بین رفته و جلوگیری از انتقال صورت نمی‌گیرد و از این غلظت به بعد انتقال بی‌رویه فلز سرب به اندام هوایی شروع می‌شود. همین جذب کم و بسیار تدریجی فلز سرب در اندام هوایی گیاه مانگرو نشان‌دهنده MacFarlane & Hallalit کم و بی‌تحرکی فلز سرب است (Burchett, 2001). فلز مس نیز ابتدا از راه ریشه گیاه جذب شده و نسبت به نوع گیاه تا حد معینی غلظت آن در ریشه افزایش می‌یابد، اما از آنجایی که عنصری متحرك، ریزمغذی و ضروری برای گیاهان است و نیز چون آهن و روی فلزی ناقل ردوكس شناخته می‌شود، انتقال بیشتری را نسبت به فلز سرب به سمت اندام هوایی خصوصاً برگ‌ها (محل انجام واکنش‌های فتوستنتزی) از خود نشان می‌دهد. جذب بیشتر این فلز به این دلیل اتفاق می‌افتد که هم متحرك است و هم گیاه مس را برای فعالیت‌های متابولیکی، بهخصوص فرایندهای فتوستنتزی نیاز دارد. وقتی جذب بالاتر از نیاز متابولیکی باشد آثار سمیّت آشکار می‌گردد. هر چند مس عنصری متحرك در گیاه است، به دلیل وجود نوار کاسپاری جابجایی محدودی MacFarlane & Liu et al., 2001؛ Burchett, 2001 را به سمت اندام هوایی انجام می‌دهد ().

در این تحقیق افزایش معنی‌دار و تدریجی مالون‌دآلدهید در هر دو تنش سرب و مس و هر دو اندام ریشه و بخش هوایی دیده شد (جدول ۲). غلظت

ایزوآنزیم‌های آن می‌شود (Posmyk *et al.*, 2008). از طرفی افزایش فعالیت پراکسیداز به عنوان آنزیم اصلی و کلیدی در تنفس‌های مربوط به فلز سنگین به اثبات رسیده است، تا جایی که این آنزیم را به عنوان مارکرهای استرس در تنفس فلزات سنگین می‌شناسند (Choudhary *et al.*, 2007).

در این تحقیق کاهش معنی‌دار فعالیت کاتالاز در هر دو تنفس سرب و مس و هر دو اندام بخش هوایی و ریشه دیده شد (جدول ۵). فعالیت کاتالاز در اندام هوایی گیاهان تنفس دیده با هر دو فلز نسبت به ریشه بیشتر بود. از طرفی بررسی‌های آماری بیانگر بیشتر بودن فعالیت این ماده در هر دو بخش اندام هوایی و ریشه در تنفس مس نسبت به تنفس سرب است. کاهش فعالیت این آنزیم در تنفس مس مشهودتر است. نتایج ما همانند نتایجی بود که Wang و همکاران (۲۰۰۴) بدست آوردند. آنها در آزمایش‌های خود بر روی دانه‌رست‌های نوعی کلم (Brassica junica) تیمار شده با غلظت‌های مختلف فلز سنگین مس افزایش فعالیت پراکسیداز، سوپراکسیدیدیسموتاز، آسکوربات‌پراکسیداز و کاهش کاتالاز را گزارش کردند. از سوی دیگر با آزمایش بر روی فلزات حساس معرفی نمودند (Wójcik *et al.*, 2006). تحقیق بر روی گیاهان میکوریزی‌دار نیز به همین نتیجه منجر شد (Azcón *et al.*, 2009).

نتیجه‌گیری

افزایش مالون‌آلدهید، پرولین و تغییر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نسبت به بالا رفتن غلظت فلزات

افزودن بر مکانیزم دفاعی جهت بقای بیشتر است (Choudhary *et al.*, 2007). در تحقیق انجام شده بر Chlamydomonas reinhardtii نیز افزایش فلز سنگین مس سبب افزایش پرولین شد (Zhang *et al.*, 2008). تحقیقی بر روی گیاه برنج (Wang *et al.*, 2009) حاکی از افزایش اسید آمینه پرولین نسبت به تنفس فلز سنگین جیوه بود. همچنین تأثیر تعدادی از فلزات سنگین بر میزان کلروفیل، پرولین و مواد آنتی‌اکسیدان گیاه لوبيا بررسی شد Zengin & Munzuroglu, (2005).

با افزایش سطح ROS در سلول‌ها، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان افزایش می‌یابد و متعاقب با آن تغییری در فعالیت آنزیم‌هایی چون پراکسیداز، سوپراکسیدیدیسموتاز و کاتالاز دیده می‌شود. در تحقیق ما افزایش معنی‌دار فعالیت پراکسیداز در هر دو تنفس سرب و مس و هر دو اندام بخش هوایی و ریشه دیده شد (جدول ۴). فعالیت پراکسیداز در ریشه هر دو فلز نسبت به اندام هوایی بیشتر بود. از طرفی بررسی‌های آماری بیانگر بیشتر بودن فعالیت این ماده در هر دو بخش اندام هوایی و ریشه تنفس مس نسبت به تنفس سرب است. تحقیق در مورد کلم قرمز، به عنوان گیاهی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی و آنزیمی، افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌هایی چون پراکسیداز و سوپراکسیدیدیسموتاز را در تنفس فلزات سنگین نشان داد (Posmyk *et al.*, 2008). در تحقیقی دیگر نیز همین افزایش فعالیت در گیاه اسفناج اثبات گردید (Pandey *et al.*, 2009). در بسیاری از گونه‌های گیاهی جذب افزایش یافته فلزات سنگین چون مس، سرب، نیکل و کادمیوم افزایش بسیار زیاد فعالیت پراکسیداز را القاء می‌کند و باعث تغییرات کیفیتی در

- Baccouch, S., Chaoui, A. and El Feriani, E., 2001. Nickel toxicity induces oxidative damage in *Zea mays* roots. *Journal of Plant Nutrition*, 24(7): 1085-1097.
- Bowler, C., Vanmontagu, M.V. and Inze, D., 1992. Superoxide dismutase and stress tolerance. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology*, 43: 83-116.
- Chan, K., Islam, M.W., Kamil, M., Radhakrishnan, R., Zakaria, M.N., Habibullah, M. and Attas, A., 2000. The analgesic and anti-inflammatory effects of *Portulaca oleracea* L. sub sp. *Sativa* (Haw.) Celak. *Journal of Ethnopharmacology*, 73(3): 445-451.
- Chaoui, A., Mazhoudi, S., Ghorbal, M.H. and Ferjani, E.E., 1997. Cadmium and zinc induction of lipid peroxidation and effects on antioxidant enzyme activities in bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Plant Science*, 127(2): 139-147.
- Choudhary, M., Jetley, U.K., Khan, M.A., Zutshi, S. and Fatma, T., 2007. Effect of heavy metal stress on proline, malondialdehyde, and superoxide dismutase activity in the cyanobacterium *Spirulina platensis*-S5. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 66(2): 204-209.
- Deepa, R., Senthilkumar, P., Sivakumar, S., Duraisamy, P. and Raam, C.V., 2006. Copper availability and accumulation by *Portulaca oleracea* L. *Environmental Monitoring and Assessment*, 116(1-3): 185-195.
- Hall, J.L., 2002. Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerance. *Journal of Experimental Botany*, 53(366): 1-11.
- Heath, R.L. and Packer, L., 1969. Photoperoxidation in isolated chloroplast. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 125: 189-198.
- Hogland, D.R. and Arnon, D., 1950. The Water Culture Method for Growing Plants without Soil. California College of Agriculture, University of California, 500p.
- Iturbe-Ormaetxe, I., Matamoros, M.A., Rubio, M.C., Dalton, D.A. and Becana, M., 2001. The antioxidants of legume nodule mitochondria. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 14(10): 1189-1196.
- Jiménez, A., Hernández, J.A., del Rio, L.A. and Sevilla, F., 1997. Evidence for the presence of the ascorbate-glutathione cycle in mitochondria and peroxisomes of pea leaves. *Plant Physiology*, 114: 275-284.
- Kadpal, R.P. and Rao, N.A., 1985. Alteration in the biosynthesis of proteins and nucleic acid in finger millet (*Eleucine coracana*) seedling during water stress and the effect of proline on protein biosynthesis. *Plant Science*, 40(2): 73-79.
- Kar, M. and Mishra, D., 1976. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence. *Plant Physiology*, 57: 315-319.
- Laliberte, G. and Hellebust, J.A., 1989. Regulation of proline content of *Chlorella autotica* in response to

سنگین، گواهی بر ارتباط بین تولید رادیکال‌های آزاد و افزایش تجمع مواد فوق است. میزان مالوندآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در نمونه‌های ریشه بیشتر از اندام هوایی بدست آمد که به دلیل نقش اصلی ریشه گیاه خرفه در تجمع فلزات سنگین است. پایین‌تر بودن فعالیت آنزیم کاتالاز در ریشه‌های تیمار دیده با سرب و مس گواهی بر تجمع بیشتر این فلزات در ریشه و نشان‌دهنده حساس بودن کاتالاز به دوز زیاد فلزات سنگین است. همچنین بررسی نتایج آماری نشان داد که تأثیرات مخرب مس بیشتر از سرب است. در نهایت این تحقیق نشان داد که گیاه خرفه به دلیل اینکه جمع‌کننده فلزات سنگین است و این تجمع را بیشتر در ناحیه ریشه انجام می‌دهد، می‌توان از آن جهت پالایش خاک‌های آلوده استفاده نمود.

منابع مورد استفاده

- Aebi, H., 1984. Catalase in vitro. *Methods in Enzymology*, 105: 121-126.
- Ahmad, I. and Hellebust, J.A., 1988. The relationship between inorganic nitrogen metabolism and proline accumulation in osmoregulatory responses of two euryhaline microalgae. *Plant Physiology*, 88: 348-354.
- Allen, S.E., Grimshaw, H.M. and Rowland, A.P., 1986. Chemical analysis: 285-344. In: Moore, P.D. and Chapman, S.B., (Eds.) *Methods in Plant Ecology*. Blackwell Scientific Publication, Oxford, London, 604p.
- Apel, K. and Hirt, H., 2004. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress and signal transduction. *Annual review of plant biology*, 55: 373-399.
- Azcón, R., Perálvarez, M.C., Biró, B., Roldán, A. and Ruíz-Lozano, J.M., 2009. Antioxidant activities and metal acquisition in mycorrhizal plants growing in a heavy-metal multicontaminated soil amended with treated lignocellulosic agrowaste. *Applied Soil Ecology*, 41(2): 168-177.
- Bates, L.S., Waldern, R.P. and Teare, I.D., 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil*, 39: 205-207.

- Okwuasaba, F., Ejike, C. and Parry, O., 1987c. Comparison of skeletal muscle relaxant properties of *Portulaca oleracea* extracts with dantrolene sodium and methoxyverapamil. *Journal of Ethnopharmacology*, 20(2): 85-106.
- Paleg, L.G., Steward, G.R. and Bradbeer, J.W., 1984. Proline and glycine betaine influence Protein solvation. *Plant Physiology*, 75(4): 974-978.
- Pandey, N., Pathak, G.C., Pandey, D.K. and Pandey, R., 2009. Heavy metals, Co, Ni, Cu, Zn and Cd produce oxidative damage and evoke differential antioxidant responses in spinach. *Brazilian Journal of Plant Physiology*, 21(2): 103-111.
- Posmyk, M.M., Kontek, R. and Janas, K.M., 2008. Antioxidant Enzymes activity and phenolic compounds content in red cabbage seedlings exposed to copper stress. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 72(2): 596-602.
- Rashed, A.N., Afifi, F.U. and Dishi, A.M., 2003. Simple evaluation of the wound healing activity of a crude extract of *Portulaca oleracea* L. (growing in Jordan) in mouse Muscle JVI-1. *Journal of Ethnopharmacology*, 88(2-3): 131-136.
- Ryle, P.R., Barker, J., Gaines, P.A. and Chakraborty, J., 1984. Alloxan-induced diabetes in the rat-protective action of (-) epicatechin. *Life Sciences*, 34(6): 591-595.
- Sharma, S.B., Nasir, A., Prabhu, K.M., Murthy, P.S. and Dev, G., 2003. Hypoglycaemic and hypolipidemic effect of ethanolic extract of seeds of *Eugenia jambolana* in alloxan-induced diabetic rabbits. *Journal of Ethnopharmacology*, 85(2-3): 201-206.
- Smirnoff, N. and Cumbes, Q.J., 1989. Hydroxyl radical scavenging activity of compatible solute. *Phytochemistry*, 28(4): 1057-1060.
- Srivastava, S., Mishra, S., Tripathi, R.D., Dwivedi, S. and Gupta, D.K., 2006. Copper induced stress and responses of antioxidants and phytochelatins in *Hydrilla verticillata* (L.f.) Royle. *Aquatic Toxicology*, 80(4): 405-415.
- Sudhakar, C., Lakshmi, A. and Giridarakumar, S., 2001. Changes in the antioxidant enzyme efficacy in two high yielding genotypes of mulberry (*Morus alba* L.) under NaCl salinity. *Plant Science*, 161(3): 613-619.
- Sun, S.Q., He, M., Wang, G.X. and Cao, T., 2010. Heavy metal-induced physiological alterations and oxidative stress in the moss *Brachythecium piligerum*. *Environmental Toxicology*, 26(5): 453-458.
- Teixeirats, M.C., Carvalhots, I.S. and Brodelius, M., 2010. Omega-3 fatty acid desaturase gene isolated from Purslane (*Portulaca oleracea*) expression in different tissues and response to cold and wound stress. *Journal Agricultural Food Chemistry*, 58(3): 1870-1877.
- Tiwari, K.K., Deviwedi, S., Mishra, S., Srivastava, S., Tripathy, R.D., Singh, N.K. and Chakraborty, S., 2008. Phytoremediation efficiency of *Portulaca tuberosa* rox and *Portulaca oleracea* L. naturally growing in an change in salinity. *Canadian Journal of Botany*, 67: 1959-1965.
- Li, Y., 2008. Kinetics of the antioxidant response to salinity in the halophyte *Limonium bicolor*. *Plant, Soil and Environment*, 54(11): 493-497.
- Li, F., Li, Q., Gao, D., Peng, Y. and Feng, C., 2009. Preparation and antidiabetic activity of polysaccharide from *Portulaca oleracea* L. *African Journal of Biotechnology*, 8(4): 569-573.
- Liu, D., Jiang, W. and Hou, W., 2001. Uptake and accumulation of copper by roots and shoots of maize. *Journal of Environmental Sciences*, 13: 228-232.
- MacFarlane, G.R. and Burchett, M.D., 2001. Photosynthetic pigments and peroxidase activity as indicators of heavy metal stress in the gray mangrove, *Avicennia marina* (Forsk) Vierh. *Marine Pollution Bulletin*, 42(3): 233-240.
- Meng, F.B. and Wu, R.G., 2008. Appraisal on medicinal values of *Portulaca oleracea* L. *Forest Investigations Design*, 1: 77-78.
- Mohanapriya, S., Senthilkumar, P., Sivakumar, S., Dineshkumar, M. and Raam, C.V., 2006. Effects of copper sulfate and copper nitrate in aquatic medium on the restoration potential and accumulation of copper in stem cuttings of the terrestrial medicinal plant, *Portulaca oleracea* Linn. *Environmental Monitoring and Assessment*, 121(1-3): 231-242.
- Mohanty, A.P. and Matysik, J., 2001. Effect of proline on the production of singlet oxygen. *Amino Acid*, 21(2): 195-200.
- Morghan, J.T., 1993. Accumulation of cadmium and selected elements in flax seed grown on calcareous soil. *Plant and Soil*, 150: 61-68.
- Nasim, S.A. and Dhir, B., 2010. Heavy metals alter the potency of Medicinal Plants. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 203: 139-149.
- Nikolopoulos, D. and Manetas, Y., 1991. Compatible solutes and in vitro stability of *Salsola soda* enzyme: proline incompatibility. *Phytochemistry*, 30(2): 411-413.
- Noctor, G. and Foyer, C.H., 1998. Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under control. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology*, 49: 249-279.
- Okwuasaba, F., Ejike, C. and Parry, O., 1986. Skeletal muscle relaxant properties of the aqueous extract of *Portulaca oleracea*. *Journal of Ethnopharmacology*, 17(2): 139-160.
- Okwuasaba, F., Parry, O. and Ejike, C., 1987a. Investigation into the mechanism of action of extracts of *Portulaca oleracea*. *Journal of Ethnopharmacology*, 21: 91-97.
- Okwuasaba, F., Ejike, C. and Parry, O., 1987b. Effects of extracts of *Portulaca oleracea* on skeletal muscle in vitro. *Journal of Ethnopharmacology*, 21: 55-63.

- Wójcik, M., Skórzyńska-Polit, E. and Tukiendorf, A., 2006. Organic acids accumulation and antioxidant enzyme activities in *Thlaspi caerulescens* under Zn and Cd stress. *Plant Growth Regulation*, 48(2): 145-155.
- Zengin, F.K. and Munzuroglu, O., 2005. Effects of some heavy metal s on content of chlorophyll, proline and some antioxidant chemicals in bean (*Phaseolus vulgaris* L.) seedlings. *Acta Biologica Cracoviensis Series Botanica*, 47: 157-164.
- Zhang, L.P., Mehta, S.K., Liu, Z.P. and Yang, Z.M., 2008. Copper-induced proline synthesis is associated with nitric oxide generation in *Chlamydomonas reinhardtii*. *Plant and Cell Physiology*, 49(3): 411-419.
- industrial effluent irrigated area in Vadodra, Gujrat, India. *Environmental Monitoring and Assessment*, 147(1-3): 15-22.
- Venekemp, J.H., 1989. Regulation of cytosolic acidity in plants under condition of drought. *Physiologia Plantarum*, 76: 112-117.
- Wang, S.H., Yang, Z.M., Yang, H., Lu, B., Li, S.Q. and Lu, Y.P., 2004. Copper-induced stress and antioxidative responses in roots of *Brassica juncea* L. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*, 45: 203-212.
- Wang, F., Zeng, B., Sun, Z. and Zhu, C., 2009. Relationship between proline and Hg^{2+} -induced oxidative stress in a tolerant rice mutant. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 56(4): 723-731.

Lead and copper-induced changes on malondialdehyde, proline, peroxidase and catalase enzymes activity in *Portulaca oleracea* L.

M. Ghorbanli^{1*} and A. Kiapour²

1* Corresponding author, Department od Biology, Faculty od Science, Islamic Azad University, Gorgan Unit, Iran
E-mail: mghorbanli@goganiau.ir

2- Payam-e-Noor University, Tehran Center, Iran

Received: September 2010

Revised: April 2012

Accepted: June 2012

Abstract

Portulaca oleracea L. belongs to Portulacaceae order. From the physiological point of view, *P. oleracea* L., generally known as ragwed, has a very high tolerance and compatibility to the environments polluted with salts or heavy metals. It is considered as a suitable species in planting as well as in refining soil and environment from these kinds of stresses. According to these contexts and in order to show the effects of two heavy metals, lead and copper, on malondialdehyde, proline and antioxidant enzymes activity some experiments were performed in a completely randomized design. For this purpose, plants were planted in sterile bed, leca, irrigated with Hogland nutrient solotion. Treatments included different concentrations of Pb (NO₃)₂ and CuSO₄.5H₂O (0, 10,50,100,500,1000 and 1500 μM) with three replications. After ten days of treatment, plants were harvested for experiments. According to the results, an increased absorption of lead and copper was recorded at high concentrations compared to the control treatment. The amount of atomic absorption of these two elements in roots was more than that of shoots. Stress increased significantly at high concentrations compared to the control. The amount of proline showed a significant upward trend in both lead and copper stress as well as in both roots and shoots. Peroxidase activity showed a significant upward trend in both lead and copper stress as well as in both shoots and roots while a significant downward trend was recorded for catalase activity. In general, a higher amount of malondialdehyde, proline and peroxidase activity was obtained in root samples compered to shoot samples, indicating the role of root as the main accumulator of heavy metals, lead and copper. The lower catalase activity in roots compared to shoots proved enzyme sensitivity towards high Pb and Cu accumulation in roots.

Key words: *Portulaca oleracea* L., heavy metals, lead, copper, phytoremediation.