

## بررسی سمیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دیاتیل مالثات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (*Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae))

مرضیه مبکی<sup>۱\*</sup>، سیدعلی صفوی<sup>۲</sup> و محمدحسن صفرعلیزاده<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>- نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

پست الکترونیک: m\_mobki@yahoo.com

<sup>۲</sup>- استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

<sup>۳</sup>- استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

تاریخ پذیرش: مرداد ۱۳۹۱

تاریخ اصلاح نهایی: مرداد ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۰

### چکیده

بسیاری از گیاهان ترکیب‌هایی با خواص حشره‌کشی دارند. در سال‌های اخیر استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سوم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا سمیت تدخینی اسانس پوست میوه نارنگی به عنیله حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (*Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae)) مورد بررسی قرار گرفت. سپس آزمایش در شرایط دمایی  $1 \pm 27$  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  $5 \pm 60$  درصد و در تاریکی انجام شد. تمامی آزمایش‌ها بر پایه طرح کامل تصادفی انجام گردیدند. مقادیر LC<sub>50</sub> و LC<sub>95</sub> به ترتیب  $88/93$  و  $20.5/54$  میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید که نشان‌دهنده سمیت مناسب این اسانس علیه این آفت انباری بود. اثر تشدیدکنندگی دیاتیل مالثات و استون بر خاصیت حشره‌کشی اسانس نارنگی علیه این آفت نیز بررسی شد. LC<sub>50</sub> برای حشرات در معرض اسانس براساس تجزیه پروفیت  $88/93$  میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد و برای حشره در معرض ترکیب اسانس و دیاتیل مالثات  $54/54$  میکرولیتر بر لیتر هوا بود. اثر تشدیدکنندگی استون نیز در کشندگی اسانس نارنگی بررسی شد، به این منظور مقادیر LC<sub>25</sub> این آزمایش با مقدار LC<sub>25</sub> حاصل از تدخین اسانس نارنگی به صورت تلفیقی علیه حشرات کامل آزمایش شد که نتایج نشان داد که استون و دیاتیل مالثات دارای خاصیت تشدیدکنندگی معنی‌داری در سمیت تنفسی اسانس نارنگی علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: اثر تشدیدکنندگی، اسانس نارنگی، دیاتیل مالثات، سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (*Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae)).

به عنوان داروهای ضدسرفعه، ضدانگل داخلی، ضدغوفنی‌کننده، ضدرماتیسم و غیره مصرف می‌شوند (Bouda *et al.*, 2001). محصولات انباری به خصوص حبوبات همواره در معرض خسارت ناشی از حشرات هستند و گاهی در انبارداری سنتی این خسارت به صد درصد می‌رسد (Shaaya *et al.*, 1997). یکی از مهمترین آفت انباری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (*Callosobruchus maculatus*) است که به طیف وسیعی از حبوبات انباری

مقدمه

خطرات آفتکش‌های متدائل برای انسان و محیط‌زیست، به همراه پیدایش مقاومت در آفات، موجب شده که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کنترل این عوامل خسارت‌زا به گیاهان صورت بگیرد (Park *et al.*, 2003). ترکیب‌هایی با منشأ گیاهی در مقایسه با سوم رایج برای انسان و محیط‌زیست پیرامون وی بسیار کم خطر می‌باشند، در موارد زیادی همین ترکیب‌ها توسط انسان

آتشسوزی ناچیز می‌باشد. در این تحقیق سمیت تنفسی انسانس نارنگی و نیز خاصیت تشیدکنندگی دی‌ای‌تل‌مالثات و استون در سمیت تنفسی انسانس نارنگی علیه حشرات کامل سوسک چهارتقطه‌ای حبوبات بررسی می‌شود.

## مواد و روشها

### پرورش حشره

حشرات مورد آزمایش از اتاق پرورش حشرات بخش حشره‌شناسی دانشگاه ارومیه تهیه و روی لوبيا چشم‌بلبلی در دمای  $1\pm 27$  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  $\pm 5\%$  در تاریکی پرورش داده شدند.

### تهیه انسانس نارنگی

میوه‌های تازه نارنگی از واریته نارنگی بمی از بازار میوه‌فروشی ارومیه تهیه گردید. میوه‌های تازه نارنگی به دقت شسته شدند و بعد پوست میوه‌ها به آرامی و با کمترین فشار از میوه‌ها جدا گردید. پوست‌های تازه کنده شده روی پارچه‌ای در آزمایشگاه تحقیقاتی بخش حشره‌شناسی، در سایه و در دمای اتاق  $25-27$  درجه سلسیوس پهن شدند تا خشک شوند. بعد از یک هفته پوست‌ها خشک شده و تا زمان انسانس‌گیری در محیط تاریک و خشک نگهداری شدند. برای حفظ روغن‌های فرار پوست میوه‌ها باید از دمای پایین برای خشک کردن آنها استفاده نمود. به طور متوسط از یک کیلو میوه تازه نارنگی  $300$  گرم پوست تازه بدست می‌آید و پس از خشک کردن مقدار  $200$  گرم پوست خشک شده باقی می‌ماند. برای انسانس‌گیری ابتدا پوست‌های خشک شده میوه نارنگی به وسیله آسیاب برقوی به حالت پودر درآورده شدند. انسانس‌گیری با دستگاه انسانس‌گیر شیشه‌ای مدل کلونجر انجام گردید. در هر نوبت انسانس‌گیری، مقدار  $45-50$  گرم پودر پوست نارنگی همراه با  $600$  میلی‌لیتر آب م قطره با استفاده از دستگاه کلونجر در دمای  $100$  درجه سلسیوس به روش تقطیر با آب انسانس‌گیری شد. زمان انسانس‌گیری برای هر نمونه  $2$  ساعت بود و در هر بار انسانس‌گیری مقدار  $1/5$  میلی‌لیتر انسانس پوست میوه نارنگی گرفته شد. انسانس تولید شده در ظروف پلاستیکی دریوش‌دار تیره در داخل یخچال با دمای  $4$  درجه سلسیوس نگهداری شد.

شامل لوبيا چشم‌بلبلی، باقلاء، نخود، ماش و عدس خسارت می‌زند. این آفت علاوه بر خسارت مستقیم، بر قوه نامیه بذرها اثر منفی گذاشته و در آسودگی شدید منجر به کاهش کیفیت بذر و رشد کیک‌ها در محصول می‌شود (باقری زنوز، ۱۳۷۵). تحقیقات وسیعی در رابطه با اثر ترکیب‌های گیاهی روی مراحل مختلف زندگی این آفت صورت گرفته است (Ketoh *et al.*, 2002). تدرست و همکاران (*Tribolium confusum* (Du Val.) *Rhizoperta domenica* (F.) *cunfusum* (Du Val.) *Callosobruchus maculatus* (F.) آزمایشگاهی بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که حشرات *Tribolium confusum* (Du Val.) کمترین حساسیت را به انسان داشتند. بررسی Boeke و همکاران (۲۰۰۴) نشان داد که عصاره‌های تاتوره (*Datura stramonium*)، *Zygophillum iva* (Agalia iva) و قیچ لوبيایی (Zygophillum fabago)  $70$  تا  $100$  درصد تلفات را روی سوسک چهارتقطه‌ای حبوبات ایجاد می‌کند. سینرژیست‌ها به طور وسیعی برای غلبه بر مقاومت و کمک به کنترل گونه‌های مختلف آفات در مزرعه و مخصوصاً دانه‌های انبار شده استفاده می‌شوند (Lorini & Galley, 2000). زیرا سینرژیست‌ها بر روی سیستم‌های آنزیمی که در ایجاد تحمل در نسل‌های حساس نقش دارند، فعالیت بازدارندگی دارند (Lopez *et al.*, 2010). دی‌ای‌تل‌مالثات سینرژیستی است که مهارکننده قوی سیستم آنزیمی گلوتاتیون S ترانسفراز است (Lopez *et al.*, 2010). استون از متابولیت‌های بدن انسان و شماری از پستانداران بوده، و در خون و ادرار آنها وجود دارد (Tunc *et al.*, 1997). Lee (2002) دو استرین *Oryzaephilus surinamensis* و *Lavender Ylang-Ylang* که به انسان مقاوم بودند را در معرض سینرژیست پی‌پرونیل بوتوکساید قرار داد و سپس حشرات را در معرض غلظت‌های  $15$  و  $200$  میکرولیتر بر لیتر هوا انسان به مدت  $12$  و  $24$  ساعت قرار داد که مقادیر LT<sub>50</sub> و LC<sub>50</sub> در هر دو استرین مقاوم کاهش یافت (Ellenhorn & Barceloux, 1988). بنابراین احتمال مسمومیت از مصرف توده انبار شده پس از عمل تدخین با استون غیرمحتمل می‌باشد. استون در دمای اتاق به سرعت تبخیر شده و آتشگیر است، ولی در شرایط تدخین، بهدلیل غلظت پایین استون مورد استفاده، احتمال

### اثر سینرژیستی استون

غلظت‌های اصلی استون با انجام آزمایش‌های مقدماتی روی این آفت بدست آمد که  $38/70$ ،  $50/51$ ،  $57/38$  و  $89/87$  میکرولیتر بر لیتر هوا در نظر گرفته شد. حشرات بالغ  $122/58$  روزه به تعداد  $30$  عدد در هر تیمار با سه تکرار و یک تیمار شاهد استفاده شد. زمان تیمارها  $24$  ساعت در نظر گرفته شد. ظروف شیشه‌ای با حجم  $310$  میلی‌لیتر که در مقابل ورود هوا غیرقابل نفوذ بودند به عنوان محفظه تدخین انتخاب شدند. در ارزیابی سمیّت تدخینی از کاغذ صافی (واتمن شماره یک) با قطر  $5$  سانتی‌متر در دیواره ظروف شیشه‌ای و میکروسپلر جهت اندازه‌گیری میزان استون میزان استون مصرفی در هر تیمار استفاده گردید. حشرات در محفظه‌های استوانه‌ای به طول  $5$  و عرض  $3$  سانتی‌متر که از یک طرف با تور پارچه‌ای  $40$  مش پوشیده شده بودند، قرار داده شدند و در ظروف شیشه‌ای به حالت معلق گذشت این زمان، تعداد تلفات حشرات کامل شمارش گردید. مقادیر  $LC_{25}$ ،  $LC_{50}$  و  $LC_{95}$  با استفاده از نرم‌افزار SPSS بدست آمدند. غلظت معادل  $LC_{25}$  حاصل از سمیّت تنفسی استون را با غلظت معادل  $LC_{25}$  حاصل از سمیّت تنفسی انسانس نارنگی بر علیه حشرات کامل سوسک چهارتقطه‌ای حبوبات به صورت تلفیقی با هم در سه تکرار در بازه‌ی زمانی  $24$  ساعته روی حشرات کامل این آفت آزمایش شد.

### نتایج

#### نتایج سمیّت تنفسی انسانس نارنگی

نتایج حاصل از آزمایش‌های زیست‌سنجدی بر روی حشرات کامل سوسک چهارتقطه‌ای حبوبات و مقادیر  $LC_{25}$ ،  $LC_{50}$  و  $LC_{95}$  در جدول  $1$  ارائه شده است. نتایج حاصل از تجزیه آماری داده‌ها نشان می‌دهد شبیه خط رگرسیونی (b) بالا می‌باشد که نشان‌دهنده وابستگی شدید بین افزایش میزان مرگ و میر و افزایش غلظت انسانس می‌باشد. مقادیر ضریب تغییرات بدست آمده نشان‌دهنده دقت بالا و قابل قبول آزمایش‌ها است. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین تلفات این آفت در اثر سمیّت تدخینی انسانس نارنگی با استفاده از آزمون توکی نشان می‌دهد که بین میانگین تلفات ناشی از انسانس در زمان  $24$  ساعت با اطمینان  $99\%$  اختلاف معنی‌داری وجود دارد ( $F_{5,11} = 391/58$  و  $P = .000$ ).

### سمیّت تنفسی انسانس نارنگی

غلظت‌های اصلی انسانس نارنگی با انجام آزمایش‌های مقدماتی روی این آفت بدست آمد که  $58/06$ ،  $58/054$  و  $135/48$  میکرولیتر بر لیتر هوا در نظر گرفته شد. حشرات بالغ  $1-3$  روزه به تعداد  $30$  عدد در هر تیمار با سه تکرار و یک تیمار شاهد استفاده شد. زمان تیمارها  $24$  ساعت در نظر گرفته شد. در این آزمایش ظروف شیشه‌ای با حجم  $310$  میلی‌لیتر که در مقابل ورود هوا غیرقابل نفوذ بودند به عنوان محفظه تدخین انتخاب شدند. در ارزیابی سمیّت تدخینی از کاغذ صافی (واتمن شماره یک) با قطر  $5$  سانتی‌متر در دیواره ظروف شیشه‌ای و میکروسپلر جهت اندازه‌گیری میزان انسانس مصرفی در هر تیمار استفاده گردید. حشرات، در محفظه‌های استوانه‌ای به ارتفاع  $5$  و قطر  $3$  سانتی‌متر که از یک طرف با تور پارچه‌ای مش پوشیده شده بودند قرار داده شدند و در ظروف شیشه‌ای بزرگتری به حالت معلق قرار گرفتند. حشرات تیمار شده در دمای  $1 \pm 27$  درجه سلسیوس و در در شرایط تاریکی به مدت  $24$  ساعت قرار داده شدند. بعد از گذشت این زمان، تعداد تلفات حشرات کامل شمارش گردید. به منظور اطمینان از مرگ حشرات کامل، هر یک با نوک سوزن داغ تحریک شدند و در صورت عدم بروز واکنش مرده محسوب می‌شدند (Abdolmaleki *et al.*, 2011). مرگ و میر در تیمار شاهد مشاهده نگردید. مقادیر  $LC_{25}$ ،  $LC_{50}$  و  $LC_{95}$  با استفاده از نرم‌افزار SPSS  $16$  بدست آمدند.

### اثر سینرژیستی دی‌ایبل مالئات

برای تهیه محلول رقیق سینرژیست یک میلی‌لیتر سینرژیست با  $8$  میلی‌لیتر استون مخلوط گردید، سپس سطح داخلی کف و درب ظروف پتری  $12$  سانتی‌متری به  $1$  میلی‌لیتر از محلول رقیق سینرژیست آغشته گردید و ظروف پتری به مدت  $20$  دقیقه در معرض هوای آزاد قرار گرفت تا استون بخار شود، سپس حشرات به مدت یک ساعت در معرض سینرژیست قرار گرفتند. پس از قرار گرفتن حشرات در معرض سینرژیست آزمایش سمیّت تدخینی انسانس با غلظت‌های اصلی ( $35/48$ ،  $43/38$ ،  $53/03$ ،  $64/80$  و  $80/64$  میکرولیتر بر لیتر هوا) که با توجه به آزمایش‌های مقدماتی تعیین شد، انجام شد (Davoudi *et al.*, 2011؛ و مقادیر  $LC_{50}$  و  $LC_{95}$  با استفاده از نرم‌افزار SPSS  $16$  تعیین گردید).

آزمایش ۱/۶۳ بدست آمده است (Lopez *et al.*, 2010). اگر ضریب سمیت بیشتر از یک باشد سینرژیسم اتفاق افتاده است و ماده غیرسمی یک سینرژیست می‌باشد، ولی اگر این مقدار از یک کوچکتر باشد آتناگونیسم اتفاق افتاده است (سرایلو، ۱۳۷۶؛ خانجانی و پورمیرزا، ۱۳۸۰). در این آزمایش با توجه به مقدار ضریب سمیت بدست آمده (۱/۶۳) این نتیجه حاصل می‌شود که دی‌اتیل مالثات دارای فعالیت تشیدی‌کنندگی روی عمل تدخینی اسانس پوست میوه نارنگی می‌باشد.

نتایج اثر سینرژیستی استون براساس نتایج حاصل از آزمایش‌های زیست‌سنجدی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات مقادیر LC<sub>50</sub> و LC<sub>25</sub> در جدول ۳ محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه آماری داده‌ها نشان می‌دهد شبیه خط رگرسیونی (b) بالا می‌باشد که نشان‌دهنده وابستگی شدید بین افزایش میزان مرگ و میر و افزایش در استون می‌باشد. با توجه به بالاتر از ۵۰٪ بودن درصد تلفات در اثر سینرژیستی استون می‌توان نتیجه گرفت که استون دارای اثر سینرژیستی با اسانس نارنگی علیه این آفت می‌باشد (جدول ۴).

جدول ۱- نتایج تجزیه پروبیت و پارامترهای خط پروبیت حاصل از تأثیر اسانس پوست میوه نارنگی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در مدت ۲۴ ساعت

cv	عرض از مبدأ	شبیه خط	P	X <sup>2</sup>	LC <sub>25</sub> * (حدود اطمینان)	LC <sub>95</sub> * (حدود اطمینان)	LC <sub>50</sub> * (حدود اطمینان)
۱۶/۹	-۳/۸۱±۰/۹۶	۴/۵۲±۰/۵۰	۰/۸۳	۰/۸۴۴	۶۳/۰۷ (۵۶/۱۵-۶۸/۵)	۲۰/۵/۵۴ (۱۷۴/۵۳-۲۶۲/۸۳)	۸۸/۹۳ (۸۳/۴۵-۹۴/۹۱)

\*: مقادیر بر حسب میکرولیتر بر لیتر هوا می‌باشد.

جدول ۲- نتایج تجزیه پروبیت و پارامترهای خط پروبیت حاصل از تأثیر اسانس پوست میوه نارنگی و سینرژیست دی‌اتیل مالثات روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در مدت ۲۴ ساعت

cv	عرض از مبدأ	شبیه خط	P	X <sup>2</sup>	LC <sub>95</sub> * (حدود اطمینان)	LC <sub>50</sub> * (حدود اطمینان)
۱۷/۴۵	-۳/۶۲±۰/۹۱	۴/۹۶±۰/۵۳	۰/۴۵	۲/۶۲	۱۱۶/۹۱ (۱۰۱/۱۴-۱۴۵/۱۵)	۵۴/۵۴ (۵۱/۴۶-۵۷/۹۰)

\*: مقادیر بر حسب میکرولیتر بر لیتر هوا می‌باشد.

نتایج اثر سینرژیستی دی‌اتیل مالثات براساس نتایج حاصل از آزمایش‌های زیست‌سنجدی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات و مقادیر LC<sub>95</sub> و LC<sub>50</sub> در جدول ۲ ارائه شده است. نتایج حاصل از تجزیه آماری داده‌ها نشان می‌دهد که اثر سینرژیست دی‌اتیل مالثات به طور افزاینده‌ای بالا می‌باشد، زیرا مقایسه جدولهای ۱ و ۲ مشخص می‌شود که مقادیر LC<sub>50</sub> و حاصل از اثر سینرژیستی دی‌اتیل مالثات در سمیت تدخینی اسانس نارنگی علیه این آفت، در مقایسه با مقادیر LC<sub>95</sub> و حاصل از سمیت تدخینی اسانس نارنگی علیه این آفت از نظر آماری کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داده است. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی نشان می‌دهد که بین میانگین‌تلفات ناشی از اثر سینرژیستی دی‌اتیل مالثات در زمان ۲۴ ساعت با اطمینان ۹۹٪ نیز اختلاف معنی‌داری وجود دارد ( $F_{5,11} = ۵۱۴/۸۱$  و  $P = ۰/۰۰۰$ ). ضریب سمیت یا نسبت سینرژیستیک از تقسیم مقدار LC<sub>50</sub> حاصل از سمیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی (۸۸/۹۳) به مقدار LC<sub>50</sub> حاصل از اثر سینرژیستی دی‌اتیل مالثات در سمیت تدخینی اسانس پوست میوه نارنگی (۵۴/۵۴) در این

جدول ۳- نتایج تجزیه پروبیت و پارامترهای خط پروبیت حاصل از تأثیر استون روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در مدت ۲۴ ساعت

عرض از مبدأ	شیب خط	P	X <sup>2</sup>	LC <sub>25*</sub> (حدود اطمینان)	LC <sub>95*</sub> (حدود اطمینان)	LC <sub>50*</sub> (حدود اطمینان)
-۱/۰۳ ± ۰/۶۶	۳/۲۸ ± ۰/۳۷	۰/۹۴	۰/۳۷	۴۲/۷۲ (۳۶/۲-۴۷/۹)	۲۱۶/۸۵ (۱۷۳/۳-۲۰۵/۵)	۶۸/۵۲ (۶۲/۷-۷۴/۸)

\* مقادیر بر حسب میکرولیتر بر لیتر هوا می‌باشد.

جدول ۴- نتایج اثر سینرژیستی استون (مقایسه درصد تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در معرض استون با حشرات در معرض اسانس نارنگی و حشرات در معرض اسانس نارنگی) در مدت ۲۴ ساعت

استون و اسانس نارنگی	اسانس نارنگی	استون	درصد تلفات سمیت تنفسی
۹۲/۲۱	۲۶/۱۴	۲۴/۱۱	

اسانس پوست تازه چهار گونه از مرکبات بر علیه سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در زمان ۲۴ ساعت کمتر از مقدار محاسبه شده در این تحقیق است (Morrawej & Abbar, 2008). همچنین مقدارهای LC<sub>50</sub> محاسبه شده برای اسانس پوست لیمو علیه سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات نشان‌دهنده سمیت تدخینی بالای اسانس پوست لیمو نسبت به اسانس پوست نارنگی می‌باشد (Don-pedro, 1995). تفاوت در مقدار اسانس مصرفی در این تحقیق با تحقیقات مشابه می‌تواند به دلایل تفاوت در حشره‌ی مورد آزمایش و شرایط اسانس‌گیری مربوط باشد.

#### منابع مورد استفاده

- باقری زنوز، ا. ۱۳۷۵. آفات فرآورده‌های انباری و روش‌های مبارزه (سخت‌پالپشان زیان‌آور محصولات غذایی و صنعتی) (جلد اول). مرکز نشر سپهر، تهران، ۳۵۹ صفحه.
- تدرست، ر.، کریم‌پور، ی.، عبدالملکی، ا.، رزمی، م. و شریفیان، ا. ۱۳۸۹. بررسی سمیت تدخینی اسانس پوست *Tribolium confusum* و *Callosobruchus maculatus* بر *Rhizoperta domenica* در شرایط آزمایشگاهی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، تهران، ۹-۱۲ مرداد: ۱۹۶.
- خانجانی، م. و پورمیرزا، ع.ا. ۱۳۸۰. سمشناسی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ۲۷۵ صفحه.

#### بحث

با توجه به نتایج بدست آمده اسانس پوست نارنگی اثر حشره‌کشی خوبی علیه سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات داشته و جمعیت این حشره را به طور قابل قبولی کاهش داده است. با توجه به اینکه مقادیر ضریب سمیت (نسبت سینرژیستیکی) برای سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات ۱/۶۳ بدست آمده و این مقدار بیشتر از یک می‌باشد، بنابراین دی‌اتیل‌مالثات دارای فعالیت تشیدیدکنندگی روی عمل تدخینی اسانس پوست میوه نارنگی می‌باشد. همچنین بکار بردن سینرژیست دی‌اتیل‌مالثات باعث کاهش دوز مصرفی اسانس نارنگی گردیده است و اثر سینرژیستی استون در سمیت تدخینی اسانس نارنگی با بدست آمدن درصد تلفات بالای ۵۰٪ در آزمایش سمیت تدخینی اسانس نارنگی به همراه استون و درصد تلفات پایین ۵۰٪ در آزمایش سمیت تدخینی اسانس نارنگی در این تحقیق ثابت شده است. Lopez و همکاران (۲۰۱۰) حشرات بالغ حساس و مقاوم *Rhizoperta domenica*, *Sitophilus oryzae* و *Cryptolestes pusillus* دی‌اتیل‌مالثات، پی‌پرونیل بوتوکساید و S,S,S تری‌بوتیل فسفر تری‌تیوات و هشت مونوتیپنونید به مدت ۲۴ ساعت قرار دادند که علاوه بر کنترل گونه‌های مقاوم و حساس، مقدارهای LC<sub>50</sub> آنها کاهش یافت که نشان‌دهنده اثر سینرژیستی در این موارد است، که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. مقدارهای LC<sub>50</sub> و LC<sub>95</sub> محاسبه شده برای

- Ketoh, G.K., Glitoh, A.I. and Huignard, J., 2002. Susceptibility of the bruchid *Callosobruchus maculatus* (Coleoptera: Bruchidae) and its parasitoid *Dinarmus basalis* (Hymenoptera: Pteromalidae) to three essential oils. *Journal of Economic Entomology*, 95(1): 174-182.
- Lee, S.E., 2002. Biological mechanisms conferring cross-resistance to fumigant toxicities of essential oil in a chlorpyrifos-methyl resistant strain of *Oryzaephilus surinamensis* L. (Coleoptera: Silvanidae). *Journal of Stored Products Research*, 38(2): 157-166.
- Lopez, M.D., Contreras, J. and Pascual-Villalobos, M.J., 2010. Selection for tolerance to volatile monoterpenoids in *Sitophilus oryzae* (L.), *Rhyzopertha dominica* (F.) and *Cryptolestes pusillus* (Schonherr). *Journal of Stored Products Research*, 46: 52-58.
- Lorini, I. and Galley, D.J., 2000. Effect of the synergists piperonyl butoxide and DEF in deltamethrin resistance on strains of *Rhyzopertha dominica* (F.). *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, 29(4): 749-755.
- Park, I.K., Lee, S.G., Choi, D.H., Park, J.D. and Ahn, Y.J., 2003. Insecticidal activities of constituents identified in the essential oil from leaves of *Chamaecyparis obtusa* against *Callosobruchus chinensis* (L.) and *Sitophilus oryzae* (L.). *Journal of Stored Products Research*, 39(4): 37-384.
- Shaaya, E., Kostjukovski, M., Eilberg, J. and Sukprakarn, C., 1997. Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-product insect. *Journal of Stored Products Research*, 33(1): 7-15.
- Tunc, I., Erler, F., Dagli, F. and Calis, O., 1997. Insecticidal activity of acetone vapours. *Journal of Stored Products Research*, 33(2): 181-185.
- سرایلو، م.ح.، ۱۳۷۶. سمشناسی حشرات (ترجمه). انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ۲۴۶ صفحه.
- Abdolmaleki, A., Safavi, S.A., Safaralizadeh, M.H., Allahvaii, S. and Sadeghi, G.R., 2011. Lethal effects of low atmosphere pressures on various developmental stages of *Tribolium castaneum* (Herbst) and *Ephestia kuehniella* (Zeller) under laboratory conditions. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 21(2): 159-163.
- Boeke, S.J., Banmgart, I.R., van Loon, J.J.A., van Huis, A., Dicke, M. and Kossou, D.K., 2004. Toxicity and repellence of African plant traditionally used for the protection of stored cowpea against *Callosobruchus maculatus* (Coleoptera: Bruchidae). *Journal of Stored Products Research*, 40(4): 423-428.
- Bouda, H., Taponjou, L.A., Fontem, D.A. and Gumedzoe, M.Y.D., 2001. Effect of essential oils from leaves of *Ageratum conyzoides*, *Lantana camara* and *Chromolaena odorata* on the mortality of *Sitophilus zeamais* (Coleoptera, Curculionidae). *Journal of Stored Products Research*, 37(2): 103-109.
- Davoudi, A., Shayesteh, N., Shirdel, D. and Hosseinzadeh, A., 2011. Effect of diethyl maleate on toxicity of linalool against two stored product insects in laboratory condition. *African Journal of Biotechnology*, 10(48): 9918-9921.
- Don-Pedro, K.N., 1995. Investigation of single and joint fumigant insecticidal action of citrus peel oil components. *Journal of Pesticide Science*, 46: 79-84.
- Ellenhorn, M.J. and Barceloux, D.G., 1988. *Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning*. Elsevier, New York, 1512p.

## Evaluation of fumigant toxicity of the essential oil of *Citrus reticulata* fruit peels and synergistic effect of diethyl maleate and acetone in the control of the adult cowpea weevils, *Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae)

M. Mobki<sup>1\*</sup>, S.A. Safavi<sup>2</sup> and M.H. Safaralizadeh<sup>2</sup>

1\*- Corresponding author, MSc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran  
E-mail: m\_mobki@yahoo.com

2- Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

Received: August 2011

Revised: August 2012

Accepted: August 2012

### Abstract

Many plants have compounds with insecticidal properties. In recent years, certain compounds of plants with insecticidal properties have been considered as alternatives to chemical pesticides for pest control. In this study, the respiratory toxicity of tangerine essential oil was evaluated on the mortality rate of the adults of *Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae). The experiment was carried out at  $27 \pm 1^{\circ}\text{C}$  and  $60 \pm 5\%$  relative humidity in darkness. All experiments were based on CRD. LC<sub>50</sub> and LC<sub>95</sub> values for adults were 88.93 and 205.54 microliter per liter of air, respectively indicating the toxicity of tangerine essential oils on the studied pest. The insecticidal effect of essential oils of tangerine and acetone and synergistic effect of diethyl maleate were also assessed against cowpea beetle. LC<sub>50</sub> values for the insects exposed to essential oil alone and along with synergist were 88.93, and 54.54 microliter per liter of air, respectively based on probit analysis. To determine the synergistic effect of acetone on tangerine lethality, LC<sub>25</sub> values of both of them were calculated, combined and evaluated on insect host. Results showed that acetone and diethyl maleate had synergistic effects on tangerine essential oil.

**Key words:** *Callosobruchus maculatus* F. (Col.: Bruchidae), diethyl maleate, synergistic effects, tangerine essential oil.