

تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرшибو (*Dracocephalum moldavica* L.)

فضل الله صفائی خانی^۱، حسین حیدری شریف آباد^۱، سید عطاء... سیادت^۲، ابراهیم شریفی عاشورآبادی^۱، سید منصور سید نژاد^۲ و بهلول عباس زاده^۳

- ۱- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، پست الکترونیک: Fsafi37@yahoo.com
۲- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین
۳- کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک جمعیتهای مختلف گیاه دارویی بادرшибو (*Dracocephalum moldavica* L.) در یک آزمایش کرتاهای خرد شده در قالب بلوک‌هایی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی سالهای ۱۳۸۳-۸۴ مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی شامل سه جمعیت گیاه بادرшибو جمع‌آوری شده از استانهای تهران، اصفهان و فارس بودند. فاکتورهای فرعی را سه سطح تنش رطوبتی ۱۰۰٪، ۶۰٪ و ۴۰٪ ظرفیت زراعی تشکیل دادند. بر اساس نتایج حاصل عامل جمعیت بر ویژگیهای مرفولوژیک و عملکرد کمی گیاه مؤثر نبودند. اما تأثیر تنش خشکی بر طول، عرض و سطح برگ، ارتفاع و قطر ساق، تعداد ساقه‌های فرعی، طول بزرگترین میانگره، وزن هزار دانه و عملکرد ریشه، سرشاخه گلدار، برگ، ساقه و بیولوژیک معنی دار بود. همچنین تیمار بدون تنش رطوبتی (۵۱) در سال اول و دوم به ترتیب با میانگین تولید ۴۱۲۶ و ۴۰۳۳ کیلوگرم سرشاخه گلدار در هکتار و همچنین با تولید ۴۹۲۹ و ۴۹۲۱ کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در هکتار نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت. مقایسه میانگین اثرات متقابل جمعیتهای مختلف گیاه و سطوح مختلف تنش خشکی نشان داد که بین تیمارهای بدون تنش و تنش ملایم رطوبتی به لحاظ تولید سرشاخه گلدار اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمارهای بدون تنش هر سه جمعیت بود که نسبت به سایر تیمارها اختلاف داشتند. در این بررسی مشخص گردید که اگر هدف، برداشت گیاه در مرحله گلدهی باشد، می‌توان از تنش ملایم استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: *Dracocephalum moldavica* L.، تنش خشکی، عملکرد بیولوژیک، صفات مرفولوژیک.

نیمه خشک تشکیل می‌دهد که به طور متوسط مقدار

بارندگی در آنها از ۱۵۰ میلیمتر در سال کمتر است (حیدری شریف آباد، ۱۳۸۳). خشکی مهمترین عامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان (Boyer, 1992) به

مقدمه

ایران با متوسط نزولات آسمانی حدود ۲۵۲ میلیمتر در سال، در زمرة مناطق خشک جهان محسوب می‌شود. حدود ۶۵ درصد مساحت کشور ما را مناطق خشک و

برای اندازه‌گیری مقاومت به خشکی روش‌های متعددی وجود دارد که رایج‌ترین روش تعیین عملکرد محصول و یا رشد در شرایط تنش در مقایسه با شاهد می‌باشد. روش‌های دیگری نیز گزارش شده‌اند که عمدتاً جوانه‌زنی و رویش بذر (اندرزیان، ۱۳۷۹)، زنده‌مانی گیاهان جوان یا غربال آنها بر اساس مورفولوژی و فیزیولوژی (خورگامی، ۱۳۷۶)، نسبت وزن ریشه به بخش هوایی (Levitt, 1980)، زمان رسیدن به نقطه پژمردگی (پاک نژاد، ۱۳۸۴)، یا میزان تنفس و فتوستز (Levitt, 1980) را در شرایط کم آبی اجرا نمایند.

صفات فنولوژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثرات متنابی بر روی عملکرد گیاهان دارند. آگاهی از فنولوژی گیاهان زراعی در راستای اهداف اصلاحی و اعمال مدیریتهای مناسب، اهمیت ویژه‌ای دارد (Bhagwat and Bhatia, 1993). بعلاوه به منظور ایجاد مدل برای پیش‌بینی عملکرد، شناخت واکنش‌های فنولوژیک از مهمترین عوامل سازگاری گیاهان نسبت به محیط‌های مختلف زیستی بشمار می‌رود. تأثیر خشکی بر فنولوژی نه تنها به ویژگیهای تنش (شدت و طول مدت) بستگی دارد، بلکه با زمان وقوع آن نیز در ارتباط است (Bohnert and Jensen, 1996). تنش آب می‌تواند به طور مستقیم از طریق اثر فرآیندهای مختلف بیوشیمیایی فتوستز و به طور غیر مستقیم، از طریق کاهش جذب CO₂ ناشی از بسته شدن روزنه‌ها، بر فتوستز اثر کند (Baker and Musgrave, 1964). به طور کلی، تنفس برعکس فتوستز به کاهش پتانسیل آب واکنش نشان می‌دهد. در ابتدا سرعت تنفس افزایش می‌یابد، ولی با تشدييد كمبود آب، رو به کاهش می‌گذارد (Evenari, 1962).

ویژه در مناطق گرم و خشک می‌باشد که ۴۰ تا ۶۰ درصد اراضی زیرکشت جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Bray, 1997; Nabors, 1990). تنش ناشی از کمبود آب هنگامی ایجاد می‌شود که رطوبت موجود در اطراف ریشه به نقطه پژمردگی دائم (P.W.P) یا کمتر از آن کاهش یابد، در نتیجه گیاه قادر به جذب آب کافی نبوده و در سلولها فرآیند آب کشیدگی (Dehydration) ایجاد می‌گردد. از دست دادن آب گیاه تا مرحله معینی قابل برگشت (Elastic) می‌باشد ولی با تلفات آب بعد از این نقطه صدمات واردہ به گیاه غیر قابل برگشت (plastic) خواهد بود (کوچکی و نصیری، ۱۳۷۱). زمان وقوع و مدت زمان دوام تنش، فراوانی وقوع خشکی، خصوصیات ذاتی خاک، تغییرات و نوسانهای بارندگی همگی بر مقاومت به خشکی گیاه اثر دارند و این نشانگر واکنش متفاوت ژنتیکیهای مقاوم به خشکی از سالی به سال دیگر است (سرمنیا، ۱۳۷۲). گیاهان عالی ممکن است به دو روش کلی در دوره کم آبی دوام آورده و به زندگی ادامه دهن. در روش اول، گیاه از کمبود آب در بافت‌های گیاهی خود جلوگیری می‌کند. این گیاهان به رغم فقدان بارندگی و وجود هوای خشک و گرم می‌توانند آب سلولهای گیاهی را تأمین کرده و آنها را حجیم و شاداب نگهدارند. این کار با جذب از طریق ریشه، کاهش از دست دادن آب از اندامهای گیاهی و تغییر در خصوصیات سلولها مانند تنظیم فشار اسمزی سلول انجام پذیر است. بنابراین سلولها و بافت‌های گیاهی با کم آبی مواجه نمی‌شوند. در روش دوم سلولهای گیاه با کمبود آب مواجه می‌شوند ولی چون پروتوبلاسم آنها می‌تواند خشکی را تحمل نماید گیاه در مقابل خشکی دوام آورده و به زندگی ادامه می‌دهد (سرمنیا، ۱۳۷۲).

دریا قرار گرفته است. متوسط بارندگی منطقه حدود ۲۳۵ میلیمتر، حداقل درجه حرارت آن -۲۰ درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت آن ۳۸ درجه سانتیگراد است. جهت باد غالب منطقه از شرق و جنوب شرقی می باشد. خصوصیات خاک مورد آزمایش در جدول (۱) مشخص گردیده است

مواد و روشها

این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی البرز وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام گرفت. ایستگاه تحقیقات البرز در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کرج در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه شرقی، در ارتفاع ۱۳۲۰ متری از سطح

جدول ۱- نتایج آزمایش خاک مربوط به مزرعه آزمایشی بخش تحقیقات گیاهان دارویی (ایستگاه تحقیقات البرز از عمق‌های ۰-۱۵ و ۱۵-۳۰ سانتیمتر)

کلاس بافت	% Sand	% Silt	% Clay	K mg/kg	P mg/kg	Na م محلول mg/kg	C %	N %	آهک %	EC ds/m	PH ۱:۲/۵	عمق محل
L	۴۵	۳۰	۲۵	۱۹۷/۶	۱۰/۲	۳۸/۷	۰/۵۷	۰/۰۴	۳/۱	۰/۲۲	۸/۵	۰-۱۵
Sa.c.L	۵۳	۲۶	۲۱	۱۷۸/۶	۸/۷	۳۲/۲	۰/۶۸	۰/۰۴	۳/۶	۰/۱۹	۸/۴	۱۵-۳۰

وجین و غیره در طی دوره رویش به طور یکسان بعمل آمد. مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی و طی سه مرحله در طول دوره رشد صورت گرفت. نحوه آبیاری به صورت نشستی بود.

در شرایط مزرعه وقتی گیاهچه‌ها به حدود ۸ تا ۱۲ برگی رسیدند و از لحاظ استقرار در زمین کاملاً ثابت شدند، اقدام به اعمال تیمارهای تنش گردید. ابتدا کلیه کرتها به طور یکسان و یکنواخت آبیاری گردید. بعد اقدام به برداشت نمونه خاک از عمق توسعه ریشه (۳۰-۰ سانتیمتر) به فاصله ۲۴ ساعت از هم در طول دوره رشد گیاه گردید. نمونه‌های برداشت شده بالافاصله توزین گردیده و جهت تعیین درصد رطوبت، به آون منتقل گردید. پس از مشخص شدن درصد رطوبت خاک در ظرفیت زراعی مزرعه که ۱۹/۹ درصد بود، میزان رطوبت موجود در خاک به هنگام اعمال تیمارهای سطوح مختلف

طرح مورد استفاده در مزرعه اسپلیت پلات با استفاده از طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و با ۴ تکرار بود. ابعاد هر کرت ۵×۲ متر مربع، فاصله پشت‌ها از همدیگر ۵۰ سانتیمتر و فاصله بوته در روی خط ۴۰ سانتیمتر و در روی هر خط ۱۲/۵ بوته قرار داشت. طرز آرایش بوته‌ها در داخل کرت به حالت ضربدری یا لوزی شکل بود. فاصله بین بلوکها از همدیگر ۳ متر و فاصله کرتها از همدیگر ۲/۵ متر بود. پس از آماده کردن زمین در فصل بهار اقدام به کشت بذرها در زمین اصلی گردید. زمان کاشت بذر برای هر دو سال در ۲۳ خرداد بود. ابتدا بذرها توسط سمباده خراشده و بعد در هر چاله ۳-۵ بذر در عمق ۱-۰/۵ سانتیمتری کاشته شد. در هفته سوم پس از کاشت، اقدام به واکاری و تنک گردید. از زمان کاشت تا مرحله ۱۲-۸ برگی گیاهان به طور مرتب و هفت‌های ۲ بار آبیاری گردیدند. برای کلیه کرتها رسیدگی لازم از قبیل

درصد اختلاف معنی دار داشت. تأثیر سطوح مختلف تنفس خشکی در سال دوم بر طول و عرض برگ، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد ساقه های فرعی، طول بزرگترین میانگره، عملکردهای سرشاخه گلدار، دانه، برگ و ساقه در سطح پنج درصد و بر سطح برگ و عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشت. بررسی اثر متقابل جمعیتهای مختلف گیاه و سطوح مختلف تنفس خشکی در سال اول نشان داد که اثر متقابل تیمارها بر طول، عرض و سطح برگ، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد ساقه های فرعی، بزرگترین میانگره، عملکردهای ریشه، سرشاخه گلدار، دانه، برگ، ساقه و شاخص برداشت در سطح پنج درصد و بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشت. بررسی اثر متقابل جمعیتهای مختلف گیاه و سطوح مختلف تنفس خشکی در سال دوم نشان داد که اثر متقابل تیمارها بر طول و عرض برگ، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد ساقه های فرعی، طول بزرگترین میانگره، عرض ریشه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح پنج درصد و بر سطح برگ و عملکردهای سرشاخه گلدار، دانه، برگ و ساقه در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشت. مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف گیاه بر صفات مورد بررسی در سال اول (جدول ۴) نشان داد که جمعیت شیراز با میانگین ۲۰۷۷ گرم وزن هزار دانه نسبت به دیگر جمعیتها از افزایش وزن برخوردار بود. همچنین این جمعیت با میانگین شاخص برداشت ۱۹/۱۱ درصد نسبت به سایر جمعیتها کاهش معنی دار داشت. در بقیه صفات اختلاف معنی دار بین جمعیتها مشاهده نشد. مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف بذر بر صفات مورد بررسی در سال دوم (جدول ۵) نشان داد که جمعیت شیراز با میانگین ۱۲۴۱ سانتیمتر مربع سطح برگ، ۱۹۱/۷ گرم بر

تنفس مشخص گردید. به منظور کنترل رطوبت خاک، هر روز نمونه هایی از عمق توسعه ریشه از سطح خاک تا عمق ۳۰ سانتیمتر برداشت گردید. پس از گذاشتن نمونه ها در آون و در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد، میزان رطوبت موجود در خاک مشخص گردید و در صورت نیاز به آبیاری اقدام لازم صورت گرفت. در مرحله گلدهی کامل، عملکرد سرشاخه گلدار، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ، طول بزرگترین میانگره، قطر ساقه از محل گره سوم و تعداد ساقه های فرعی تعیین شدند. در انتهای دوره رشد نیز عملکرد بیولوژیک در هکتار، عملکرد اندام هوایی، عملکرد بذر، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، طول ریشه، عرض ریشه، وزن ریشه، قطر ریشه و وزن هزار دانه اندازه گیری و مشخص گردید.

نتایج

طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش مزرعه ای سال اول (جدول ۲)، جمعیتهای مختلف بر ارتفاع، عملکرد ریشه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اثر معنی دار در سطح پنج درصد داشت و بر سایر صفات تأثیر نداشت. تجزیه واریانس سال دوم (جدول ۳) نشان داد که جمعیتهای مختلف بر سطح برگ، ارتفاع، عرض ریشه، عملکردهای ریشه، سرشاخه گلدار، برگ، ساقه، بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح پنج درصد و بر عملکرد دانه در سطح یک درصد اثر معنی دار داشت و بر سایر صفات تأثیر نداشت. تأثیر سطوح مختلف تنفس خشکی در سال اول بر طول و سطح برگ، قطر ساقه، تعداد ساقه های فرعی، عملکردهای ریشه، سرشاخه گلدار، بیولوژیک و وزن هزار دانه در سطح پنج درصد و بر ارتفاع، عملکردهای دانه، برگ و ساقه در سطح یک

با تولید $۲۰۶/۳$ گرم بر متر مربع ریشه، نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان دادند. مقایسه میانگین اثر متقابل جمعیتهای گیاه و سطوح مختلف تنفس خشکی بر صفات مورد بررسی در سال اول (جدول ۸) نشان داد که تیمار بدون تنفس جمعیت اصفهان با $۵/۵$ سانتیمتر طول برگ با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشت. به لحاظ سطح برگ، ارتفاع، عرض برگ، قطر ساقه، تعداد ساقه های فرعی، طول بزرگترین میانگره، عملکردهای ریشه، سرشاخه گلدار، دانه و برگ میانگین تولید تیمارهای تنفس شدید هر سه جمعیت از سایر تیمارها کمتر بود. تیمار بدون تنفس رطوبتی جمعیت شیراز از وزن هزار دانه بیشتری برخوردار بود. همچنین از لحاظ تولید قطر ریشه، عرض ریشه و طول ریشه بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. مقایسه میانگین اثر متقابل جمعیتهای گیاه و سطوح مختلف تنفس خشکی بر صفات مورد بررسی در سال دوم (جدول ۹) نشان داد که تیمارهای بدون تنفس و تنفس ملایم هر سه جمعیت به لحاظ طول برگ و تعداد ساقه های جانبی، نسبت به بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. تیمارهای بدون تنفس هر سه جمعیت به لحاظ سطح برگ، ارتفاع، قطر ساقه و طول بزرگترین میانگره نسبت به بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به ترتیب با میانگین ۵۲۲۰ و ۱۰۶۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار بدون تنفس جمعیت اصفهان بود. بیشترین عملکرد ساقه را تیمار بدون تنفس جمعیت کرج و هر سه سطوح تنفس جمعیت شیراز داشتند.

متر مربع ریشه خشک، $۸۹۳/۳$ کیلوگرم بر هکتار دانه و $۲۱/۱۲$ درصد شاخص برداشت نسبت به بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشت. همچنین جمعیت اصفهان با میانگین ۳۹۷۸ کیلوگرم سرشاخه گلدار و ۴۶۲ کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در هکتار نسبت به سایر جمعیتها افزایش معنی دار داشت. در بقیه صفات اختلاف معنی دار بین جمعیتها مشاهده نگردید. مقایسه میانگین اثر تنفس خشکی بر صفات مورد بررسی در سال اول (جدول ۶) نشان داد که تیمار بدون تنفس (S_1) با تولید $۳/۹۵۸$ سانتیمتر عرض برگ، $۳۰۸/۸$ گرم بر متر مربع عملکرد ریشه و با تولید $۹۶۸/۳$ کیلوگرم دانه، ۱۰۶۶ کیلوگرم برگ، ۲۴۴۹ کیلوگرم ساقه و ۴۹۲۹ کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در هکتار نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی دار داشت. در این بررسی مشخص شد که بیشترین قطر ساقه مربوط به تیمار تنفس شدید رطوبتی (S_3) با میانگین $۱/۲۸۲$ سانتیمتر بود که با دیگر تیمارها اختلاف معنی دار داشت. مقایسه میانگین اثر تنفس خشکی بر صفات مورد بررسی در سال دوم (جدول ۷) نشان داد که تیمار بدون تنفس (S_1) با تولید $۵/۳۳۳$ سانتیمتر طول برگ، ۱۴۲۳ سانتیمتر مربع سطح برگ، $۵۶/۱۷$ سانتیمتر ارتفاع، $۰/۹۶۳۳$ سانتیمتر قطر ساقه، $۴/۰۱۷$ سانتیمتر طول میانگره، ۴۰۳۳ کیلوگرم سرشاخه گلدار در هکتار، $۸۸۷/۵$ کیلوگرم دانه در هکتار، $۷۶۸/۵$ کیلوگرم برگ در هکتار و ۴۹۲۱ کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در هکتار نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. همچنین تیمار تنفس ملایم رطوبتی (S_2) با تولید $۳۳/۸۵$ سانتیمتر عرض ریشه و $۱/۸۸۵$ گرم وزن هزار دانه و تیمار تنفس شدید رطوبتی

جدول ۲- تجزیه واریانس تأثیر جمعیتهای مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بادرشبو تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۳

میانگین مریعات																	منابع تغییرات
برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک شاخص (kg/ha)	عملکرد ساقه (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g)	سرشاخه گلدار (kg/ha)	عرض ریشه طول ریشه (g/m ²)	قطر ریشه (cm)	ارتفاع ساقه (mm)	تعداد ساقه فرعی (mm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع ساقه (mm)	سطح برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	برگ طول (cm)	درجه آزادی
۲۶/۲۷۹	۸۹۰۱۳۲/۱۷۶	۷۶۲۶۴/۹۶۳	۱۳۴۹۵۲/۴۷۷	۱۳۴۹۹۰/۴۷۷	۰/۰۱۴	۵۸۱۳۸۶/۸۱۵	۴۴۶۰/۵۱۹	۸۱/۰۷۷	۴۰/۶۴۸۸	۰/۰۸۲	۰/۴۸۷	۲۷/۲۸۷	۱/۰۸۸	۳۲۸/۶۷۶	۹۳۲/۷۰۴	۲/۷۸۱	۱/۶۶۴ ۳
۳۲/۳۶۷*	۴۱۹۲/۷۵۰ ns	۷۱۸۹/۷۵۰ ns	۱۲۶۸۰/۵۲۸ ns	۵۸۱۱۳۰/۰۳۷ ns	۰/۰۶۱*	۵۴۱۰۸/۳۳۳ ns	۱۹۹۴۸/۱۱۱*	۴/۸۶۱ ns	۱۵/۰۳۰ ns	۰/۰۲۳ ns	۰/۰۵۴ ns	۱/۴۴۴ ns	۰/۰۲۷ ns	۸۸/۷۹۴*	۲۷۰/۸۳۳ ns	۰/۳۰۱ ns	۰/۴۲۳ ns ۲ (a)
۷/۸۰۵	۳۱۸۸/۴۵۴	۵۷۰۸/۱۵۷	۳۲۸۸/۶۳۹	۴۰۰۰/۱۸۶۱	۰/۰۰۴	۱۱۲۷۷/۸۱۵	۵۱۷۴/۷۴۱	۱۰/۲۹۰	۱۹/۹۳۴	۰/۰۱۷	۰/۰۷۲	۲/۸۱۵	۰/۰۲۷	۶۷/۲۶۱	۸۳۵۶/۴۸۱	۰/۰۳۶	۰/۱۲۹ ۶ (Ea)
۵/۷۷۷ ns	۱۱۵۴۷۲۰/۵۸۳*	۴۰۲۴۰۸۰/۷۵۰**	۴۲۰۷۵۳/۵۲۸**	۳۲۱۴۳۳/۰۸۳**	۰/۰۲۴*	۸۷۸/۳۲۷*	۶۳۷۵/۰۲۸*	۳/۳۷۸ ns	۱/۷۷۸ ns	۰/۰۱۹ ns	۰/۶۵۲*	۲۱۷/۰۲۸*	۰/۱۹۵*	۶۷۲/۶۹۲**	۱۴۲۸۹۵۸/۳۳۳*	۲/۳۰**	۴/۰۱۶* ۲ (b)
۵/۸۲۸*	۱۴۹۰۶/۰۸۳**	۸۳۰۷/۵۰۰*	۱۹۰۳/۹۴۴*	۲۵۸۱/۱۶۷۷*	۰/۰۰۵*	۶۰۴۰۵/۳۳۳*	۴۵۵۳/۷۷۸*	۳/۵۰۵ ns	۸/۲۴۸ ns	۰/۰۴۸ ns	۰/۶۶*	۸/۷۷۸*	۰/۰۳۵*	۶۳/۹۸۶*	۵۴۱۶/۶۷۸*	۰/۰۳۸*	۰/۲۳۷* ۴ (ab)
۲۶/۲۷۹	۸۹۰۱۳۲/۱۷۶	۷۶۲۶۴/۹۶۳	۱۳۴۹۵۲/۴۷۷	۱۳۴۹۹۰/۴۷۷	۰/۰۱۴	۳۵۰۹۲۲/۹۲۶	۱۸۰۱۴/۴۷۲	۱۹/۹۰۱	۴۷/۵۱۳	۰/۱۴۳	۰/۲۱۳	۱۸/۹۷۲	۰/۰۴۵	۴۱/۷۴۱	۵۷۶۳/۸۸۹	۰/۲۱۱	۰/۴۴۷ ۱۸ (b)
۲۲/۳۶۷*	۴۱۹۲/۷۵۰ ns	۷۱۸۹/۷۵۰ ns	۱۲۶۸۰/۵۲۸ ns	۵۸۱۱۳۰/۰۳۷ ns	۰/۰۶۱*	۱۷/۷۵	۳۷/۸۰	۱۸/۵۸	۱۶/۳۶	۲۲/۶۱	۱۳/۶۰	۲۲/۷۶	۱۸/۳۷	۱۲/۷۲	۴/۸۱	۱۳/۰۹	۱۴/۵۴ (% Cv)

جدول ۳- تجزیه واریانس تأثیر جمعیتهای مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بادرشبو تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۴

میانگین مریعات																	منابع تغییرات
برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک شاخص (kg/ha)	عملکرد ساقه (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g)	سرشاخه گلدار (kg/ha)	عرض ریشه طول ریشه (g/m ²)	قطر ریشه (cm)	ارتفاع ساقه فرعی (mm)	میانگین برگین	تعداد ساقه فرعی (mm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع ساقه (mm)	سطح برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	درجه آزادی (طول cm)
۸/۸۲۴	۲۲۳۵۱/۰۵۲	۸۵۲۵۰/۰۲۸	۲۹۵۰۲/۰۲۶	۱۱۵۷۱/۰۶۵	۰/۰۷۸	۱۰۹۵۰۵/۰۶۵	۶۳۰/۲۰۸۳	۰/۰۴۷	۴۰/۷۸۰	۰/۰۶۲	۰/۰۵۳	۶۵/۶۵۷	۰/۰۰۴	۲۳/۸۸۰	۶۸۰۴/۹۶۳	۳/۱۱	۲/۷۷۰ ۳ (a)
۱۶۲/۵۷۴*	۱۶۶۳۵۰/۴/۸۶۱*	۱۲۰۷۵۷۷/۵۴۹*	۱۴۱۵۱۳/۳۴*	۱۹۷۳۴/۰۲۸**	۰/۰۷۰ns	۱۱۷۸۱۷۹/۸۶۱*	۴۲۱۸/۷۵۰*	۸/۸۴۸ ns	۸۰/۳۳۴*	۰/۰۳۰ns	۰/۰۱۹ ns	۱۱۰/۲۸ns	۰/۱۲۱ ns	۱۶۳/۱۱۱*	۱۴۳۴۵۷/۴۴۴*	۰/۳۵۶ ns	۰/۵۷۷ ns ۲ (b)
۱۴/۱۸۴	۱۲۵۷۰/۶۰۲	۱۳۰۵۹۴/۸۲۶	۱۲۶۳۸۹/۴۱۴	۲۰۹۵۱/۷۲۰	۰/۰۱۱	۴۰۲۰۴۸/۱۲۰	۱۷/۲۳۱	۱۰/۱۸۵	۳۵/۲۵۶	۰/۰۰۳	۰/۰۳۶	۵/۱۰۲	۰/۰۳۶	۵۷/۴۰۷	۱۹۹۲۸/۸۵۲	۰/۱۷۷	۰/۱۱۴ ۶ (ab)
۱/۷۶۷ ns	۴۹۰۴۶۵۰/۷۶۴*	۲۰۵۱۰/۷۵۷*	۱۸۵۰۲۰/۰۵۲۸*	۲۰۹۸۲۱/۰۵۲۸*	۰/۰۳۲ ns	۳۷۷۵۱۱۳/۶۹۴*	۱۰۴۶۸/۷۵۰ ns	۹/۹۹۷ ns	۲۷۵/۱۲۵ ns	۰/۰۳۱ ns	۰/۰۵۹*	۲۱۳/۳۶۱*	۰/۰۳۱*	۷۵۱/۰۲۸*	۷۷۵۱۷۰/۸۶۱**	۲/۳۴۱*	۲/۴۷۸*
۳/۵۶۸*	۲۵۷۵۷۷/۷۷۷*	۸۵۱۶۳/۴۴۴**	۵۱۷۱۵/۶۹۴**	۵۹۲۵/۶۹۴**	۰/۲۲۷ ns	۲۱۲۳۷/۶۱۱*	۱۷۰۳۱/۲۵۰ ns	۱۴/۲۴۷ ns	۳۳/۹۸۶*	۰/۰۰۹ ns	۰/۰۴۹*	۱۳/۱۱۱*	۰/۰۰۸*	۱۲۰/۴۸۷*	۱۳۳۶۷۷۳/۶۱۱**	۰/۸۹۹*	۱/۷۶۲* ۴ (a)
۴/۴۳۴	۱۹۳۷۷/۸۲۴	۱۴۹۵۵۶/۵۳۹	۲۶۶۷۸/۸۲۹	۶۷۲۳۲/۳۸۰	۰/۰۷۶	۲۲۱۸۲۰/۹۳۵	۱۳۸۳/۱۰۲	۹/۲۲۸	۱۲/۰۲۱	۰/۰۲۳	۰/۰۷۲	۲۰/۸۹۸	۰/۰۱۸	۳۵/۴۸۱	۱۵۲۲۳/۵۸۳	۰/۲۸۷	۰/۲۳۵ ۱۸ (b)
۱۱/۷۹	۱۳/۲۸	۲۵/۲۰	۲۶	۱۱/۶۱	۱۴/۶۲	۱۳/۶۵	۲۱/۵۱	۱۴/۱۶	۱۱/۲۲	۲۱/۴۵	۷/۰۸	۲۸/۵۲	۱۳/۸۵	۱۲/۱۶	۱۰/۹۵	۱۵/۸۴	۰/۹۸ (% Cv)

* و **: به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار و وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ و ۱ درصد می باشد. ns

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف گیاه بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بادرشبو بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۳

شناخت	عملکرد برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه گلدار (kg/ha)	سرشاخه عملکرد ریشه (g/m ²)	طول ریشه (cm)	عرض ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع برگ (cm)	طول برگ سطح برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	تیمار			
۲۲/۰۱a	۴۰۳۰a	۱۹۳۹a	۸۵۵/۸a	۸۳۴/۴a	۱/۹۰۲b	۳۴۰۲a	۳۲۸a	۲۳/۵۴a	۴۱/۲۲a	۱/۱۴۳a	۳/۴۵۸a	۱۸/۷۵a	۱/۱۶۶a	۵۳/۹۲a	۱۰۹۲a	۳/۶۶۷a	۴/۷a	جمعیت ۱ (تهران)
۲۲/۲۰a	۴۰۶۲a	۱۹۵۹a	۸۶۴/۶a	۹۱۲/۳a	۱/۹۰۷b	۳۴۰۲a	۴۰۲a	۲۳/۷۵a	۴۳/۴۲a	۱/۱۲۹a	۳/۴۰۰a	۱۹/۴۲a	۱/۱۹۰a	۴۹/۱۷a	۱۵۸۳a	۳/۵۱۷a	۴/۷۱۷a	جمعیت ۲ (اصفهان)
۱۹/۱۷b	۴۰۳۱a	۱۹۸۷a	۹۱۶/۰a	۷۷۳/۵a	۲/۰۲۷a	۳۲۸۳a	۳۳۴a	۲۴/۷۳a	۴۱/۷۹a	۱/۲۱۰a	۳/۰۳۲a	۱۹/۲۵a	۱/۱۹۹a	۴۹/۲۵a	۱۵۶۳a	۳/۳۵۰a	۴/۳۸۳a	جمعیت ۳ (شیراز)

حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی‌دار در بین میانگین تیمارهاست.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف گیاه بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بادرشبو بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۴

شناخت	عملکرد برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه گلدار (kg/ha)	سرشاخه عملکرد ریشه (g/m ²)	طول ریشه (cm)	عرض ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع برگ (cm)	طول برگ سطح برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	تیمار			
۱۸/۵۸b	۳۸۶۷c	۱۳۰۲b	۷۰۸/۸a	۷۱۸/۸b	۱/۸۵۳a	۳۱۴۸c	۱۷۲/۹ab	۲۰/۶۷a	۲۸/۵۶b	۰/۸۵۳۲a	۳/۸۵۳a	۱۷/۰۰a	۰/۷۷۶۷a	۵۲/۴۲a	۱۰۲۲c	۳/۵۲۵a	۵/۰۰a	جمعیت ۱ (تهران)
۱۳/۸۷c	۴۶۱۲a	۱۴۰۷b	۶۷۱/۴a	۶۴۳/۳c	۱/۹۷۵a	۳۹۶۸a	۱۵۴/۲b	۲۲/۳۷a	۳۳/۰۹a	۰/۸۶۰۰a	۲/۰۹۷a	۱۵/۰۸a	۰/۹۰۳۳a	۴۵/۰۸b	۱۱۳۰b	۳/۴۳۲a	۴/۹۷۵a	جمعیت ۲ (اصفهان)
۲۱/۱۲a	۴۲۴۸b	۱۸۹۶a	۵۰۴/۸a	۸۹۳/۳a	۱/۸۷۷a	۳۳۵۵B	۱۹۱/۷a	۲۱/۳۳a	۳۳a	۰/۸۳۱۷a	۳/۸۱۷a	۱۷/۰۰a	۰/۷۰۵۰a	۴۹/۴۲ab	۱۲۴۱a	۳/۱۹۲a	۴/۶۰۸a	جمعیت ۳ (شیراز)

حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی‌دار در بین میانگین تیمارهاست.

جدول ۶- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر بrixی ویژگیهای گیاه دارویی با درشبیو بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۳

شاخص برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	عملکرد گلدار (g)	سرشاخه ریشه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g/m ²)	عرض ریشه (cm)	طول ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	بزرگترین میانگره ساقه (cm)	قطر فرعی (cm)	ارتفاع ساقه (cm)	طول برگ سطح برگ (cm ²)	طول برگ (cm)	عرض برگ (cm)	ارتفاع برگ (cm)	طیمار
۲۰/۴۹a	۴۹۲۹a	۲۴۴۹a	۱۰۶۶a	۹۷۸/۳a	۱/۹۹۳a	۴۱۲۶a	۳۰۸/۸a	۲۳/۴۰a	۴۱/۷۵a	۱/۱۸a	۳/۸۴a	۲۲/۶۷a	۱/۱۴۷b	۵۵/۷۵a	۱۸۸۳a	۳/۹۵۸a	۵/۱۱۷a	%۱۰۰ FC
۲۱/۱۷a	۴۲۰۷b	۲۱۱۴b	۸۷۸/۳b	۸۹۶/۲b	۱/۹۳۷a	۳۴۷۹a	۴۳۹b	۲۴/۲۵a	۴۲/۱۷a	۱/۱۱a	۳/۶۵a	۲۰/۳۳a	۱/۰۲۷b	۵۴/۴۲a	۱۶۵.b	۳/۴۹۲b	۴/۷۰۸a	%۷۰ FC
۲۱/۸۷a	۲۹۸۷c	۱۳۲۲c	۶۹۱/۸c	۶۵۵/۸b	۱/۹۰۶a	۲۴۷۷c	۳۱۷/۳b	۲۴/۳۸a	۴۲/۵۲a	۱/۱۷a	۲/۷۸b	۱۴/۴۲b	۱/۲۸۲a	۴۲/۱۷c	۱۲۰۴c	۳/۰۸۳c	۳/۹۷۵b	%۴۰ FC

حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در بین میانگین طیمارهاست.

جدول ۷- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر بrixی ویژگیهای گیاه دارویی با درشبیو بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۴

شاخص برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	عملکرد گلدار (g)	سرشاخه ریشه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g/m ²)	عرض ریشه (cm)	طول ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	بزرگترین میانگره ساقه (cm)	قطر فرعی (cm)	ارتفاع ساقه (cm)	طول برگ سطح برگ (cm ²)	طول برگ (cm)	عرض برگ (cm)	ارتفاع برگ (cm)	طیمار
۱۸/۰۵a	۴۹۲۱a	۱۷۵۶a	۷۷۸/۵a	۸۸۷/۵a	۱/۹۳۸a	۴۰۳۳a	۱۵۰/b	۲۲/۳۲a	۲۷/۰۵b	۰/۸۷۸۳a	۴/۰۱۷a	۲۰/۰۸a	۰/۹۶۳۳a	۵۷/۱۷a	۱۴۲۳a	۳/۸۲۵a	۵/۳۲۳a	%۱۰۰ FC
۱۸/۱۰a	۴۱۵۰b	۱۳۴۰b	۵۸۴/۱b	۷۴۴/۶b	۱/۸۸۵a	۳۴۱b	۱۶۲/b	۲۰/۵۰a	۳۳/۸۵a	۰/۷۹۰۰a	۳/۷۶۳b	۱۶/۲۳a	۰/۴۳۳b	۵۰/۲۵b	۱۰۰.۸b	۳/۳۸۳ab	۴/۸۲۵b	%۷۰ FC
۱۷/۴۲a	۳۶۵۱c	۱۵۰.۸ab	۵۳۲/۳b	۶۲۲/۳c	۱/۸۳۲a	۳۰۲۸c	۲۰۶۷a	۲۱/۵۶a	۳۴/۷۵a	۰/۸۷۷a	۳/۵۷۹b	۱۱/۶۷b	۰/۷۷۸ab	۴۰/۵۰c	۳/۹۶۲b	۴/۴۲۵b	%۴۰ FC	

حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در بین میانگین طیمارهاست.

جدول ۸- مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف تنش خشکی بر بrix و سطوح مختلف گیاه دارویی با درشبوب بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۳

شاخص برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد ساقه (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g)	سرشاخه گلدار (kg/ha)	عملکرد ریشه (g/m ²)	طول ریشه (cm)	عرض ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	بزرگترین میانگره (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	طول برگ (cm)	سطح برگ تیمار	
۱۸/۱۱c	۴۸۴۳a	۲۴۰۳abc	۱۰۴۲a	۸۷۷abcd	۱/۹۲۰bc	۴۲۲۸a	۲۸۲/۳b	۲۵/۵۰a	۳۹/۷۵a	۱/۲a	۳/۷۷۵a	۲۳/۲۵a	۱/۲۷۵ab	۶۱/۲۵a	۱۹۱۳a	۴/۱۷۵a	۴/۹۵۰ab	%۱۰۰FC _x تهران
۲۱/۴.ab	۴۲۱b	۲۱۴۷bcd	۸۳۱ab	۹۰۲/۳abc	۱/۹۱۰bc	۳۷۷۲abc	۵۲۱/۳b	۲۴/۵۸a	۴۲/۰a	۱/۰۳۵a	۳/۸۲۵a	۱۸abc	۱/۰۰۵ab	۶۰/۰۵ab	۱۶۳۸b	۳/۶۵ab	۵/۰۲۵ab	%۷۰FC _x تهران
۲۳/۸۷a	۳۰۳۲c	۱۲۶۶e	۶۹۴/۸b	۷۷۴bcd	۱/۸۷۵c	۲۰۵۷bcd	۳۷۷/۵ab	۲۴/۱۳a	۴۱/۹۲a	۱/۱۹۲a	۲/۷۷۵b	۱۶bc	۱/۲۱۷ab	۴۰/۰۲۵e	۱۲۲۵c	۳/۱۷۵bc	۴/۱۲۵bc	%۷۴FC _x تهران
۲۱/۹۳ab	۴۹۷۰a	۲۴۵۱ab	۱۰۵۳a	۱۰۹۰a	۱/۹۸۰abc	۳۹۰۵a	۲۸۶/۳a	۲۳/۰a	۴۴/۷۵a	۱/۱۳۰a	۴a	۲۲/۷۵a	۱/۰۹۲ab	۵۳/۷۵abc	۱۸۷۵a	۳/۷۵۰ab	۵/۰۵۰a	%۱۰۰FC _x اصفهان
۲۳/۳۶a	۴۲۲۵b	۲۰۷۷d	۸۷۴/۵ab	۹۹۹ab	۱/۸۷۵c	۳۵۱۹ab	۳۷۷ab	۲۲/۱۳a	۴۱/۰a	۱/۰۲۳a	۳/۵۷۵a	۲۱/۵ab	۱/۱۱۵ab	۵۰.acde	۱۷۰.b	۳/۵۰abc	۴/۷۵۰abc	%۶۰FC _x اصفهان
۲۱/۶۶ab	۲۹۹۲c	۱۳۵۰e	۶۶۷۳b	۶۴۸۷cd	۱/۸۷۵c	۲۳۸۱d	۳۰۲/۸ab	۲۵a	۴۴/۰a	۱/۱۲۵a	۲/۶۷۵a	۱۴c	۱/۳۶۲a	۴۳/۷۵cde	۱۱۷۵c	۳/۲۰bc	۳/۹۷۵bc	%۷۴Fc _x اصفهان
۱۸/۸۷c	۴۹۷۴a	۲۴۹۰a	۱۱۰۴a	۹۳۸۷ab	۲/۰۹a	۴۲۰a	۳۷۷ab	۲۲/۷۵a	۴۲/۰a	۱/۲۳۷a	۳/۷۵۰a	۲۲ab	۱/۰۷۷ab	۱۸۶۳a	۳/۷۵۰ab	۴/۹۰۰abc	%۱۰۰FC _x شیراز	
۱۸/۸۷c	۴۱۸.b	۲۱۲۴Cd	۹۲۹/۳ab	۷۸۷/۳bcd	۲/۰۲ab	۳۵۴۷ab	۴۱۹ab	۲۲/۵a	۴۱/۷۵a	۱/۲۸۷a	۳/۷۵۷a	۲۱/۰ab	۰/۰۶b	۵۳abcd	۱۶۱۳b	۳/۳۲۲bc	۴/۴۲۰abc	%۷۰FC _x شیراز
۲۰/۰۳b	۲۹۳۰c	۱۳۴۴e	۷۱۴/۵b	۵۹۵d	۱/۹۷۷abc	۲۴۵۸cd	۳۴۷/۳ab	۲۴a	۴/۷۳a	۱/۱۰a	۲/۶۵b	۱۴/۰۲c	۱/۲۶۵ab	۴/۲/۰dc	۱۲۱۳c	۲/۸۷۵c	۳/۸۲۵c	%۷۴FC _x شیراز

حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در بین میانگین تیمارهاست.

جدول ۹- مقایسه میانگین اثر جمعیتهای مختلف تنش خشکی بر بrix و سطوح مختلف گیاه دارویی با درشبوب بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تحت شرایط مزرعه، سال ۱۳۸۴

شاخص برداشت (%)	عملکرد بیولوژیک (kg/ha)	عملکرد ساقه (kg/ha)	عملکرد برگ (kg/ha)	عملکرد دانه (kg/ha)	وزن هزاردانه (g)	سرشاخه گلدار (kg/ha)	عملکرد ریشه (g/m ²)	طول ریشه (cm)	عرض ریشه (cm)	قطر ریشه (cm)	بزرگترین میانگره (cm)	تعداد ساقه فرعی (cm)	قطر ساقه (cm)	ارتفاع برگ (cm ²)	عرض برگ (cm)	طول برگ (cm)	سطح برگ تیمار	
۱۸,۴۵ab	۴۴۴۸b	۱۵۸۳abc	۹۰۰/۰a	۲۵abc	۲/۰۳۰a	۳۶۲۲c	۱۱۲/۰c	۱۸/۵ab	۲۵/۲۵b	۰/۹۰۰a	۴/۱۵۰ab	۲۰/۰ab	/۸۹۵ab	۷۲/۰a	۱۶۴۸a	۴/۲۲۵a	۵/۰۲۵ab	%۱۰۰FC _x تهران
۱۸,۹۹ab	۳۷۷۵d	۱۰۲۷c	۴۸۷/۷bc	۷۱۷/۳cd	۱/۹۱ab	۳۰۵d	۱۲۵/۰c	۲۲/۸۹b	۲۸/۹۴b	۰/۷۸۵a	۳/۵۷۵cd	۱۷/۰abcd	+/۶۰b	۵/۰abcd	۸۹۱/۸c	۳/۵۰ab	۴/۸۵۲bcd	%۷۰FC _x تهران
۱۸,۷۰abc	۳۷۷۹e	۱۲۹۰bc	۷۸۹/۰b	۶۱۵de	۱/۱۲ab	۲۷۶۴e	۲۸۱/۲a	۲۰/۳۶ab	۳۱/۰b	۰/۸۷۵a	۳/۷۱۳bc	۱۲/۰bcd	+/۷۷۵b	۴۴/۴۵de	۵۲۷d	۲/۸۵b	۴/۵۵cde	%۷۴FC _x تهران
۱۵,۲۴bcd	۵۰۹۰a	۱۵۱۷bc	۶۷۲/۶bc	۷۷۷۳bc	۲/۰۱۰a	۴۳۱۹a	۱۲۵/۰c	۲۲/۶۹ab	۲۹/۱۴a	۰/۸۵۰a	۴/۲۷۵a	۱۷/۷۵abc	۱/۲۳۵a	۴۷/۷۵cd	۱۷۴۶a	۳/۰۵b	۴/۶۰cd	%۱۰۰FC _x اصفهان
۱۳,۵۶cd	۴۵۳۹b	۱۱۸۱bc	۴۹۴/۴bc	۶۱۷۳de	۱/۹۶۵ab	۳۹۲۲b	۱۳۷/۰c	۲۰/۴۴ab	۳۵/۱۳b	۰/۷۸۵a	۳/۹۱۲abc	۱۵/۰abcd	+/۶۰۰b	۴/۵/۰cd	۸۷۷۰c	۳/۲۷۵b	۴/۳۰de	%۷۰FC _x اصفهان
۱۲,۷۹d	۴۲۰۱c	۱۵۲۲bc	۳۸۷/۴c	۵۳۷/۰e	۱/۹۴۵ab	۳۷۶۴c	۲۰۰/b	۲۴/۰a	۳۵b	۰/۹۴۵a	۳/۲۶۲d	۱۲/۰cd	+/۸۷۵ab	۴۲/۰de	۷۶۷/۸c	۳/۲۵b	۴/۹۲۵bcd	%۷۴Fc _x اصفهان
۲۰,۳۶a	۵۲۲۰a	۲۱۶۹a	۷۷۲۷ab	۱۰۶۱a	۲/۰۱a	۴۱۰۹a	۱۶۲/۵bc	۲۱/۳۸ab	۲۳/۷۵b	۰/۸۸۵a	۳/۷۶۵cd	۲۲/a	+/۷۶۰b	۵/۸/۵ab	۱۷۴۶a	۴/۲۰a	۵/۰۷۵a	%۱۰۰FC _x شیراز
۲۱,۷۵a	۴۱۵۰c	۱۸۱۳ab	۶۱۷۳bc	۹۰۱/۳b	۱/۹۶۰ab	۳۲۴۹d	۲۱۲/۰b	۲۲/۵۶ab	۳۷/۰b	۰/۸۰۰a	۳/۸۲۸bc	۱۷۵/۰abcd	+/۷۰۰b	۵/۴/۷۵abc	۱۲۲۷b	۳/۳۷۵ab	۵/۳۲۵abc	%۷۰FC _x شیراز
۲۱,۷۵a	۳۷۷۴e	۱۷۰۷ab	۷۷۵/۰b	۷۱۷/۰cd	۱/۵۱b	۲۶۵۶	۲۰۰/b	۲۰۰/۶ab	۳۷/۷۵b	۰/۸۱۰a	۳/۷۶۳bc	۹/۰۰d	+/۶۸۵b	۳۵/۰/۰e	۷۵۰/۳c	۲/۷۲۵b	۳/۸۰e	%۷۴FC _x شیراز

حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در بین میانگین تیمارهاست.

بحث

عملکرد دارند. آگاهی از فنولوژی گیاهان در راستای اهداف اصلاحی و اعمال مدیریتهای مناسب، اهمیت ویژه‌ای دارد (Bhagwat & Bhatia, 1993; Bohnert & Jensen, 1996). بعلاوه به منظور ایجاد مدل برای پیش‌بینی عملکرد، شناخت واکنشهای فنولوژیک مهمترین سازگاری گیاهان نسبت به محیط‌های مختلف زیستی بشمار می‌رود. تنش آب می‌تواند به طور مستقیم، از طریق اثر فرآیندهای مختلف بیوشیمیایی فتوستتر، و به طور غیر مستقیم، از طریق کاهش جذب CO_2 ناشی از Baker & Musgrave, 1964) نتایج بدنده با نتایج ولدآبادی و همکاران (۱۳۷۹) مطابقت دارد. نتایج آزمایشهای نامبردگان نشان داد که در تنش متوسط، شاخص سطح برگ کاهش یافت. در سورگوم ۴/۴ است و در تنش شدید در ذرت به ۲/۷ و در سورگوم به ۳/۸ می‌رسد. این نتایج نشان می‌دهند که کاهش سطح برگ ناشی از تنش خشکی در ذرت ۴۰ و در سورگوم ۲۸ درصد می‌باشد. از بررسی طول و عرض برگ گیاه بادرشبو مشخص گردید که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف از بابت طول و عرض برگ وجود نداشت، ولی به لحاظ سطح برگ اختلاف معنی‌دار وجود داشت و به نظر می‌رسد که در این گیاه نیز اختلاف بوجود آمده به خاطر تعداد برگ باشد. بررسی وضعیت گلدهی در این گیاه نشان داد که اعمال تنش شدید رطوبتی باعث کاهش گلدهی گردیده و عملکرد سرشاخه گلدار در تیمارهای تنش شدید رطوبتی نسبت به تیمارهای بدون تنش به شدت کاهش یافت.

بررسی صفات مرفولوژیکی طی دو سال در شرایط مزرعه نشان داد که اثر جمعیتهای مختلف گیاه تقریباً بر صفات مرفولوژیک مؤثر نبوده و اختلافات بوجود آمده ناشی از تأثیر تنش رطوبتی بر گیاه بوده است. بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک حکایت از تأثیر منفی کمبود رطوبت بر اندام هوایی گیاه دارد. بررسی اختلافات بوجود آمده بین سطوح مختلف تنش خشکی با شاهد نشان دهنده قدرت سازگاری و مقابله گیاه با شرایط خشکی است. به طوری که در آزمایش (fc=۶۰٪) دیده شد در شرایط تنش ملایم رطوبتی (fc=۷۰٪) صفاتی چون طول برگ، ارتفاع گیاه، تعداد ساقه‌های جانبی، قطر ریشه، عرض ریشه، عملکرد ریشه، عملکرد سرشاخه گلدار، وزن هزار دانه و شاخص برداشت با تیمارهای بدون تنش اختلاف معنی‌دار نداشتند. بررسی اثرات متقابل جمعیتهای مختلف و سطوح مختلف تنش خشکی مسئله را تا حدودی پیچیده‌تر کرده و نشان می‌دهد که ژنتیپ می‌تواند در برخی از صفات ظاهری گیاه مؤثر باشد. به طوری که از بررسیهای بدست آمده ملاحظه گردید، جمعیتهای تهران و شیراز به لحاظ طول برگ، سطح برگ، ارتفاع و عرض ریشه در بیشتر آزمایشهای در شرایط بدون تنش ملایم نسبت به سایر تیمارهای مربوطه‌ی جمعیت اصفهان برتری داشتند. اما بررسی صفاتی چون وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد برگ، عملکرد ساقه و عملکرد بیولوژیک نشان داد که در این گیاه اثر فاکتور اصلی (جمعیت یا خصوصیات ژنتیکی گیاه) در سرنوشت گیاه چندان نمی‌تواند مؤثر باشد. به هر حال صفات فنولوژیکی به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثرات متناوبی بر روی

- ولدآبادی، ع.، مظاہری، د.، نورمحمدی، ق. و هاشمی دزفولی، س.ا.ب.، ۱۳۷۹. بررسی اثر تنفس خشکی بر خواص کمی و کیفی و شاخص‌های رشد ذرت، سورگم و ارزن. مجله علوم زراعی ایران، ۲(۱): ۴۷-۳۶.

- Baker, D.N. and Musgrave, R.B., 1964. The effects of low-level moisture stresses on the rate of apparent photosynthesis in corn. *Crop Science*, 4: 249-253.
- Bhagwat, S.G. and Bhatia, C.R. 1993. Selection for flag leaf stomata frequency in bread wheat. *Plant Breeding*, 110: 129-136.
- Bohnert, H.J. and Jensen, R.G., 1996. Strategies for engineering water stress tolerance in plants. *Trends Biotechnology*, 14: 89-97.
- Boyer, J.S., 1992. Plant Productivity and environments Science. *Plant Physiology*, 218: 443-447.
- Bray, A.E. 1997. Plant Responses to water deficit. *Trends in Plant Science*, 2: 45-54.
- Evenari, M., 1962. Plant physiology and arid zone research, *Arid Zone Research*, 18: 175-196.
- Levitt, J., 1980. Response of plants to environmental stress, Volume 21, Academic Press, New York, USA, 489 p.
- Nabors, M.W., 1990. Environmental stress resistance procedure and applications: 167-185. In: Philip J.D., (Ed.). plant cell line selection, VCH, Weinheim, 379 p.

منابع مورد استفاده

- اندرزیان، ب.، ۱۳۷۹. بررسی و مقایسه عملکرد گندم و جو تحت شرایط آبیاری محدود در شرایط آب و هوایی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- پاکنژاد، ف.، ۱۳۸۴. بررسی اثر تنفس خشکی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم. پایان نامه دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- حیدری شریف آباد، ح.، ۱۳۸۳. راههای مقابله با خشکی و خشکسالی. چاپ اول، انتشارات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ۲۸۹ صفحه.
- خور گامی، ع.، ۱۳۷۶. بررسی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و زراعی لوبیای چشم بلبلی در شرایط خشک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
- سرمنیا، غ.، ۱۳۷۲. اهمیت تنشهای محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران، ۱۵-۱۸ شهریور: ۱۵۷-۱۶۹.
- کوچکی، ع. و نصیری محلاتی، م.، ۱۳۷۱. اکولوژی گیاهان زراعی. جلد اول، چاپ گوتینگ. ۳۸۹ صفحه.

The effect of drought on yield and morphologic characteristics of *Deracocephalum moldavica* L.

F. Safikhani¹, H. Heydarye sharifabadi¹, A. Syadat², A. Sharifi ashorabadi¹, M. Syednedjad² and B. Abbaszadeh¹

1- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, E-mail: Fsafi37@yahoo.com

2- Agronomy Department of Chamran University, Ahvaz, Iran

Abstract

In order to investigate the effect of drought stress on yield and morphologic characteristics of *Deracocephalum moldavica* L. under field condition, this research was conducted in 2004-2005 at Alborz station. Experiment was carried out in a split plot with randomized complete block design with four replications. Main factors consisted of three plant populations of *Deracocephalum moldavica* L. which were collected from Tehran, Esfahan and Fars provinces. Subplots consisted of three level of drought stress (100%, 60% and 40% Fc). The results showed the effect of different plant population on morphological characteristics and yield were not significant. Effect of drought stress on length, cross and leaf surface, high plant, stem diameter, lateral shoot, length of highest internodes, weight of 1000 grain and flower shoot, leaf, stem and biological yield were significant. Mean of treatments showed that control (without drought stress treatments) at first and second years were 4126 and 4033 kg/ha of flower shoot and 4929 and 4921 kg/ha biological yield had significant differences with other drought levels. Mean of interaction effects of main and sub plots not showed significant difference for shoot flower production. Highest biological yield was related to controls of three plant population which were different to other treatments. It could be included from this investigation that mild stress could be applied in complete flower stage harvest.

Key words: *Deracocephalum moldavica* L., biological yield, drought, morphological characteristics.