

## تغییرات زیستوده جلبکهای قرمز در مناطق کشنده استان بوشهر

محسن گراوند کریمی<sup>(۱)</sup>؛ علی داداللهی سهراپ<sup>(۲)</sup>؛ حسین ریاحی<sup>(۳)</sup> و طاهره فاضلی دهکردی<sup>(۴)</sup>

mgk.garavand@yahoo.com

۱، ۲ و ۴- دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

۲- دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۹۰

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۰

### چکیده

این مطالعه طی چهار فصل از پاییز ۱۳۸۷ تا تابستان ۱۳۸۸ در سواحل استان بوشهر انجام گرفت. نمونه برداری از شش ایستگاه در هنگام جزر کامل و با روش ترانسکت خطی از ساحل به سمت دریا بصورت پرتاپ تصادفی کوادرات (به ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتیمترمربع) در محدوده ترانسکت فرضی انجام شد. میزان کل زیستوده بدست آمده ۲۵۹۸/۹۱ گرم در مترمربع برای ۱۵ گونه جلبک قرمز بوده است. ایستگاه نیروگاه با مقدار زیستوده ۱۱۱۴/۳۲ گرم بر مترمربع (درصد ۴۳) دارای بیشترین زیستوده جلبکهای قرمز بوده است. همچنین فصل تابستان با داشتن ۱۰۷۶/۳۶ گرم زیستوده در مترمربع (درصد ۴۱) بیشترین زیستوده جلبکهای قرمز را داشته است. در حالی که بیشترین مقدار زیستوده جلبکهای قرمز در منطقه پایین کشنده ثبت گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که جلبکهای قرمز انتشار وسیعی در مناطق میان بین کشنده و پایین کشنده دارند. گونه *Geracilaria canaliculata* بیشترین زیستوده را بخود اختصاص داد.

**لغات کلیدی:** شکوفایی جلبکی، جلبکهای ماکروسکوپی، تراکم، بوشهر

### مقدمه

جلبکهای ماکروسکوپی صخره‌های بین جزر و مدی است. اگر چه تغییرات عمق چندانی در این محل وجود ندارد و اختلاف عمق از چند متر تجاوز نمی‌کند، اما در واقع شرایط توپوگرافی ساحل (چاله‌های آبی روی سنگ یا در معرض موج بودن سنگ، حرکت شدید آب در آبراهه‌ها، شیارها و غیره) بر رویش و نوع جلبکهای موثر است (Laevastu, 1981). مواد ذخیره‌ای درون سلولی جلبکهای قرمز واحدهایی از گلوكز می‌باشند. در دیواره سلولی آنها مواد موکوبی ساکاریدی وجود دارد. در موقعی تا اعمق ۲۶۹ متری دریا نیز دیده شده‌اند (ریاحی، ۱۳۸۷).

بیشترین تعداد جلبکهای دریایی را جلبکهای قرمز (Phodophyta) تشکیل می‌دهند (۴۰۰۰ گونه) که فقط ۲۰۰ گونه از آنها در آبهای شیرین یافت می‌شوند (کیانمهر، ۱۳۸۴). جلبکهای دریایی در نواحی صخره‌ای و سنگی دیده می‌شوند که دلیل آن را باید در لزوم وجود تکیه گاه ثابت برای رشد جستجو کرد به همین دلیل این جلبکها در سواحل شنی رشد نمی‌کنند. اما می‌توان قسمتهایی از آنها را که توسط آب، بویژه بعد از طوفان به این نواحی آورده می‌شوند، مشاهده کرد. زیستگاه اصلی

\*نویسنده مسئول

انجام گرفت (امینی، ۱۳۷۱؛ علیان، ۱۳۸۱) قابل توجه است که در هنگام جزر کامل از منطقه‌ای که بطور کامل از آب خارج نمی‌شود تحت عنوان منطقه پایین کشنده نیز نمونه‌برداری شد. با پرتاب تصادفی کوادرات در مناطق مذکور جمع‌آوری نمونه‌ها صورت گرفت. در مطالعات Andrew Dawes (۱۹۸۱) و (۱۹۸۸) نیز از روش ترانسکت خطی جهت نمونه‌برداری جلبکها، محاسبه پراکنش و فراوانی و تنوع زیستی استفاده گردیده است. بطوریکه از منطقه بالای جزر و مدي تا پایین جزر و مدي خطی فرضی در نظر گرفته شده و عملیات پرتاب کوادرات و نمونه‌برداری روی این خط از ساحل به سمت دریا انجام می‌گیرد.

نمونه‌برداری با استفاده از کوادرات  $50 \times 50$  سانتی‌مترمربع و (مساحت  $25 \times 25$  مترمربع) و پرتاب تصادفی کوادرات‌ها در طول ترانسکت عمود بر ساحل و با استفاده از پروتکل پایش ذخایر جلبکهای دریایی انجام گرفت (Chopin, 2001). به منظور حصول اطمنان از آنالیزهای آماری در هر منطقه کشنده حداقل سه تکرار (پرتاب سه کوادرات) انجام شد و جلبکهای داخل کوادرات با تمام زوائد با دست یا توسط کاردک جمع‌آوری و در کیسه‌های پلاستیکی با برچسب مشخصات ایستگاه و تاریخ نمونه‌برداری ذخیره و توسط یخدان به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سپس نمونه‌ها در سریعترين زمان ممکن، به اقامتگاه منتقل و پس از جداسازی جلبکها و شستشوی آنها با آب شيرين جهت زدودن نمک، گل و لای و موجودات چسپیده به آن، تا حد امكان از يكديگر جدا شده و در دسته‌های مشخص قرار گرفتند.

**جدول ۱: موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مورد مطالعه**

ردیف	ایستگاه	موقعیت جغرافیایی
۱	گناوه	E $50^{\circ}, N 29^{\circ}, 39'$
۲	دانشگاه	E $50^{\circ}, N 28^{\circ}, 54'$
۳	نیروگاه	E $50^{\circ}, N 28^{\circ}, 50'$
۴	الی	E $51^{\circ}, N 27^{\circ}, 49'$
۵	طاهری	E $52^{\circ}, N 27^{\circ}, 40'$
۶	هاله	E $52^{\circ}, N 27^{\circ}, 38'$


در بخش‌های مختلف دنیا بیش از صد گونه از جلبکها عمدتاً جلبکهای قهقهه‌ای و قرمز استفاده غذایی دارند. جلبکهای قرمز از جنبه‌های اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارند. دو گروه از جلبکهای قرمز با اهمیت هستند گروه اول شامل آگاروفیت (Agarophytes) بوده که از آنها ماده بسیار ارزشمند آگار استخراج می‌شود و گروه دیگر کاراگینوفیتها (Caraginophytes) هستند که ماده‌ای بنام کاراگینان در آنها وجود دارد هر دوی این مواد کاربردهای زیاد و ارزش صادراتی بسیار بالایی برای برخی کشورها دارند (کیانمهر، ۱۳۸۴). وجود سواحل صخره‌ای و شرایط زیست محیطی مناسب شرایط را برای رویش جلبکهای ماکروسکوپی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان فراهم ساخته است. در این میان جلبکهای قرمز به علت سازگاری‌های فیزیولوژیکی و جذب طیف‌های کوتاه اشعه‌ی خورشید پراکنش زیادی در مناطق بین جزر و مدي و زیر جزر و مدي دارند.

سههای پور و همکاران (۱۳۷۸) در سواحل استان هرمزگان ۱۴۲ گونه جلبک ماکروسکوپی شناسایی کردند که ۷۳ گونه از آنها جلبک قهقهه‌ای بودند. امینی (۱۳۷۹) در سواحل خلیج نایبیند تعداد ۲۸ گونه جلبک قرمز شناسایی نمود. همچنین سههای پور (۱۳۸۴) تحقیقات ارزشمندی در زمینه شناسایی جلبکهای سواحل خلیج فارس داشتند و ۴۲ گونه جلبک قرمز شناسایی کردند. مده مطالعاتی که در ایران روی جلبکهای ماکروسکوپی انجام گرفته شامل شناسایی آنها بوده است و درخصوص پراکنش، مقدار تراکم و زیستوده گونه‌های جلبکی بخصوص گونه‌های مهم و اقتصادی مطالعات کمی انجام شده است لذا این تحقیق برای تعیین مقدار الگوی پراکنش و مقدار زیستوده جلبکهای قرمز در سواحل مستعد استان بوشهر انجام گرفته است.

## مواد و روش کار

عملیات نمونه‌برداری از سواحل صخره‌ای و سنگی استان بوشهر طی یکسال و بصورت فصلی از پاییز ۱۳۸۷ تا تابستان ۱۳۸۸ از شش ایستگاه گناوه (۱)، دانشگاه (۲)، نیروگاه (۳)، الی (۴)، طاهری (۵) و هاله (۶) در هنگام حداکثر جزر انجام گردید (جدول ۱ و شکل ۱). ایستگاه‌های مذکور با توجه به قابلیت دسترسی، شبی، نوع و جنس ستر و پوشش جلبکی از نظر تنوع گونه‌ای و فراوانی تعیین شدند.

در هر ایستگاه سه ترانسکت از سمت ساحل به دریا در نظر گرفته شد، در طول هر ترانسکت از چهار منطقه بالای میان کشنده، میان کشنده، پایین میان کشنده و پایین کشنده نمونه‌برداری



شکل ۱: موقعیت ایستگاه‌های نمونه‌برداری


## نتایج

مقدار کل زیستوده جلبکهای قرمز ثبت شده در همه ایستگاهها و فصل‌ها  $2598/91$  گرم در مترمربع بود. ایستگاه نیروگاه با مقدار  $1114/32$  گرم در مترمربع و اختصاص  $43/4$  درصد زیستوده بیشترین مقدار و ایستگاه طاهری با مقدار  $31/6$  گرم در مترمربع و  $1$  درصد مقدار کل زیستوده کمترین مقدار زیستوده در بین شش ایستگاه نمونه‌برداری را دارا بودند (نمودار ۱ و جدول ۱). در مقایسه بین فصل‌ها نیز فصل تابستان با ثبت مقدار  $1076/36$  گرم در مترمربع و  $41$  درصد مقدار کل زیستوده جلبکهای قرمز دارای بیشترین و فصل پاییز با ثبت  $155/54$  گرم در متر مربع و  $6$  درصد مقدار کل زیستوده جلبکهای قرمز بدست آمده دارای کمترین مقدار بوده است (نمودار ۲ و جدول ۲).


بیشترین زیستوده جلبکهای قرمز مربوط به منطقه پایین کشنیدی به مقدار  $1244/21$  گرم در مترمربع می‌باشد (جدول ۳).

براساس این تحقیق بیشترین زیستوده جلبکهای قرمز به مقدار *Gracilaria canaliculata*  $638$  گرم در مترمربع مربوط به گونه *Gracilaria canaliculata* می‌باشد (جدول ۴).

پس از خارج شدن آب اضافی جلبکها، وزن تر آنها را توسط ترازوی دیجیتال با دقت  $0.01$  گرم اندازه‌گیری نموده، مقداری نیز جهت نگهداری و شناسایی در فرماлиن  $4$  تا  $5$  درصد قرار داده شد. برای محاسبه وزن خشک گونه‌ها، آنها را به مدت  $24$  ساعت در دمای  $70$  درجه در آون قرار داده و سپس وزن خشک هر گونه بوسیله ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری گردید; Brouwer; Dadolahi et al, 2005 1995 در آزمایشگاه جهت شناسایی هر یک از گونه‌ها خصوصیات ریخت‌شناسی آنها (رنگ، اندازه، بنهنک‌ها و ...) ثبت شده، شناسایی گونه‌ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر فلورها جلبکی مانند Trono و همکاران Tylor, ۱۹۷۹ (۲۰۰۸)، Basson, ۱۹۷۹ (۱۹۹۷) Rabii صورت پذیرفت. پس از شناسایی گونه‌ها تعداد هر گونه در کوادرات‌ها به عنوان فراوانی ثبت گردید تا در تحلیل‌های آماری و محاسبه شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرند. جهت تحلیل‌های اکولوژیکی از شاخص غنای گونه‌ای مارگالف، شاخص تنوع زیستی شانون وینر و شاخص ترازی زیستی استفاده گردید. از نرم‌افزار SPSS جهت تحلیل‌های آماری استفاده و از نرم‌افزار Primer 5 جهت رسم کلاسترها و میزان شباهت مناطق استفاده می‌شود.



نمودار ۱: نسبت زیستوده جلبکهای قرمز نمونه برداری شده در هر ایستگاه (درصد زیستوده در سال)



نمودار ۲: نسبت زیستوده جلبکهای قرمز نمونه برداری شده در هر فصل (درصد زیستوده در سال)

جدول ۲: زیتده جلبکهای قرمز (برحسب گرم وزن خشک بر مترمربع) در هر استگاه

ردیف	گونه	حاله	طاهری	الی	نیروگاه	دانشگاه	گناوه	جمع
۱	<i>Sarconema filiformis</i>	۲/۴	۱۸/۳	---	۴/۵	۲۹/۸	۱/۶	۵۷/۶
۲	<i>Gelidiella acerosa</i>	۳/۵	۰/۸	۱/۱	۹/۵۲	۴/۴	۷/۲	۲۵/۵۲
۳	<i>Hypnia cesticornis</i>	۲۳/۷	۱/۲	۳/۴	۷۰/۲	۱۵۸/۳	۸۷/۹	۳۴۴/۷
۴	<i>Hypnia cornuta</i>	۲/۵	۸/۱	۴۲/۸	۴۹/۷	---	۲/۴	۱۰۵/۵
۵	<i>Champia globulifera</i>	---	۲/۴	۱۰/۵	---	---	---	۱۲/۹
۶	<i>Champia parvula</i>	۹/۶	۰/۸	۳۲/۰	۲۱/۶	۴۱/۵	۲۸/۵	۱۳۴/۵
۷	<i>Laurencia snyderia</i>	۱/۷	---	۱/۴۴	۱۴۴/۷	۷/۶	۵۹/۴	۲۱۴/۷۴
۸	<i>Laurencia obtuse</i>	---	---	---	۲۶/۱	---	۲۵۷	۲۸۳/۱
۹	<i>Laurencia sp.</i>	---	---	---	۶/۲	---	۲/۲	۸/۴
۱۰	<i>Acanthophora spspecifera</i>	---	---	۷/۲	۲۹۱	۲۰/۰۲	۱۴/۰۳	۳۳۷/۲۵
۱۱	<i>Dcanthophora simplex</i>	---	---	۲/۵	۱۶/۸	۵/۰	---	۲۴/۸
۱۲	<i>Gracilaria canaliculata</i>	---	---	۵/۲	۳۹۲/۷	۲۴۰/۱	---	۶۳۸
۱۳	<i>Gracilaria folifera</i>	---	---	---	۱۵/۶	۹۵/۳	---	۱۱۰/۹
۱۴	<i>Gracilaria sp.</i>	---	---	---	۲۴/۴	۹۹	---	۱۲۳/۴
۱۵	<i>Jania robens</i>	---	---	---	۴۱/۳	۲/۳	۱۳۵	۱۷۸/۶
جمع		۴۳/۳	۳۱/۶	۱۰۶/۶۴	۱۱۱۴/۳۲	۷۰۸/۸۲	۵۹۴/۲۳	۲۵۹۸/۹۱

جدول ۳: زیتده جلبکهای قرمز (برحسب گرم وزن خشک بر مترمربع) در مناطق کشنده

ردیف	گونه	بالای میان کشنده	وسط میان کشنده	پایین میان کشنده	پایین کشنده	جمع
۱	<i>Sarconema filiformis</i>	---	۱۸/۹۰	۱۵/۸۰	۲۱/۹	۵۶/۶۰
۲	<i>Gelidiella acerosa</i>	۳/۵۰	۰/۸۰	۳/۸۰	۱۷/۴۲	۲۵/۵۲
۳	<i>Hypnia cesticornis</i>	۱/۴۰	۲۹۰/۵۰	۲۲/۶۰	۲۹/۲۰	۳۴۴/۷۰
۴	<i>Hypnia cornuta</i>	۲/۵۰	۳۹/۲۰	۵۵/۴۰	۸/۴۰	۱۰۵/۵۰
۵	<i>Champia globulifera</i>	---	۲/۴۰	۱۰/۵۰	---	۱۲/۹۰
۶	<i>Champia parvula</i>	۲۵/۲۰	۳۴/۶۰	۶۷/۸۰	۶/۹۰	۱۳۴/۵۰
۷	<i>Laurencia snyderia</i>	۳/۷۳	۲۴/۳۴	۱۰۳/۷۷	۸۲/۹۰	۲۱۴/۷۴
۸	<i>Laurencia obtuse</i>	---	۲۲۴/۵۰	۵۸/۶۰	---	۲۸۳/۱۰
۹	<i>Laurencia sp.</i>	---	---	۲/۲۰	۶/۲۰	۸/۴۰
۱۰	<i>Acanthophora spspecifera</i>	---	۱۳۶	۵۱/۲۰	۱۵۰/۰۵	۳۳۷/۲۵
۱۱	<i>Dcanthophora simplex</i>	---	---	۸	۱۶/۸۰	۲۴/۸۰
۱۲	<i>Gracilaria canaliculata</i>	---	---	۳۳/۲۰	۶۰۴/۸۰	۶۳۸
۱۳	<i>Gracilaria folifera</i>	---	---	---	۱۱۰/۹۰	۱۱۰/۹۰
۱۴	<i>Gracilaria sp.</i>	---	---	---	۱۲۳/۴۰	۱۲۳/۴۰
۱۵	<i>Jania robens</i>	۳۳/۷۶	۱/۳۰	۷۸/۲۰	۶۵/۳۴	۱۷۸/۶۰
جمع		۷۰/۰۹	۷۷۲/۵۴	۵۱۲/۰۷	۱۲۴۴/۲۱	۲۷۰۳/۱۰

جدول ۴: زیستوده جلبکهای قرمز (بر حسب گرم وزن خشک بر مترمربع) در هر فصل

ردیف	گونه	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	جمع
۱	<i>Sarconema filiformis</i>	۲۹	۲۰/۹	---	۷/۷	۵۶/۶
۲	<i>Gelidiella acerosa</i>	۱۳/۳	۱/۹	---	۱۰/۳۲	۲۵/۵۲
۳	<i>Hypnia cesticornis</i>	۴۸/۲	۲۴۵/۲۶	۲/۴۴	۴۸/۸	۳۴۴/۷
۴	<i>Hypnia cornuta</i>	---	۸/۸	۵۵/۴	۴۱/۳	۱۰۵/۵
۵	<i>Champia globulifera</i>	---	۱۲/۹	---	---	۱۲/۹
۶	<i>Champia parvula</i>	۴۱	۳۹/۶	۱۷/۹	۳۶	۱۳۴/۵
۷	<i>Laurencia snyderia</i>	۶۹/۳۴	۴۸/۶	۳۷/۴	۵۹/۴	۲۱۴/۷۴
۸	<i>Laurencia obtuse</i>	۲۷۱	---	---	۱۲/۱	۲۸۳/۱
۹	<i>Laurencia sp.</i>	۸/۴	---	---	---	۸/۴
۱۰	<i>Acanthophora spspecifera</i>	۱۵۸	۱۲۶/۴	۱۳/۴	۳۹/۴۵	۳۳۷/۲۵
۱۱	<i>Dcanthophora simplex</i>	---	۲۳/۹	۰/۹	---	۲۴/۸
۱۲	<i>Gracilaria canaliculata</i>	۲۲۰/۸۰	۲۸۴/۹	۲۵/۹	۱۰۶/۴	۶۳۸
۱۳	<i>Gracilaria folifera</i>	---	۱۱۰/۹	---	---	۱۱۰/۹
۱۴	<i>Gracilaria sp.</i>	---	۱۲۳/۴	---	---	۱۲۳/۴
۱۵	<i>Jania robens</i>	۹۵/۱۰	۲۸/۹	۲/۲	۵۲/۴	۱۷۸/۶
جمع		۹۵۴/۱۴	۱۰۷۶/۳۶	۱۵۵/۵۴	۴۱۲/۸۷	۲۵۹۸/۹۱

شاخص‌های زیستی جلبکهای قرمز در طول چهار فصل نمونه‌برداری حاکی از آن است که بیشترین مقدار شاخص مارگالف (۱/۶۶۴) مربوط به فصل تابستان می‌باشد و بیشترین مقدار شاخص‌های شانون (۱/۱۷۸) و ترازی زیستی (۰/۹۳۳) مربوط به فصل زمستان می‌باشد (جدول ۷).

در نمودار ۴ مشاهده می‌شود که از نظر ثبت مقدار زیستوده جلبکهای قرمز بین فصل‌های بهار و زمستان به میزان ۷۸ درصد شباهت وجود دارد. این در حالی است که فصل تابستان نیز در سطح ۶۲ درصد دارای شباهت فراوان با دو فصل بهار و زمستان می‌باشد.

جدول ۵ بررسی شاخص‌های زیستی در ایستگاه‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار شاخص مارگالف مربوط به ایستگاه نیروگاه (۱/۸۰۸) و بیشترین مقدار شاخص‌های شانون (۲/۳۰۴) در ایستگاه نیروگاه و بیشترین مقدار شاخص ترازی زیستی (۰/۸۶۵) مربوط به ایستگاه هاله می‌باشد.

جدول ۶ بررسی شاخص‌های زیستی در مناطق کشنده را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار شاخص مارگالف مربوط به منطقه پایین میان کشنده (۱/۶۹۹)، بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به منطقه پایین کشنده (۲/۲۸۴) و بیشترین مقدار شاخص ترازی زیستی نیز مربوط به منطقه پایین میان کشنده (۰/۸۶۰) می‌باشد.

جدول ۵: شاخص‌های زیستی جلبکهای قرمز در هر ایستگاه


شاخص‌ها	گناوه	دانشگاه	نیروگاه	الی	طاهری	حاله
مارگالف	۱/۲۸۶	۱/۳۵۷	۱/۸۰۸	۱/۳۶۸	۰/۸۷۱	۰/۹۸۰
شانون	۱/۸۵۰	۱/۷۳۱	۲/۳۰۴	۱/۷۰۱	۱/۳۸۴	۱/۴۱۰
ترازی زیستی	۰/۷۶۵	۰/۷۱۳	۰/۷۹۷	۰/۶۶۶	۰/۶۳۵	۰/۸۶۵

جدول ۶: شاخصهای زیستی جلبکهای قرمز در هر منطقه کشندی


شاخص‌ها	بالای میان کشندی	وسط میان کشندی	پایین میان کشندی	پایین کشندی
مارگالف	۰/۹۶۸	۱/۲۱۰	۱/۶۹۹	۱/۶۰۳
شانون	۱/۴۱۰	۱/۸۰۰	۲/۲۸۴	۱/۹۱۴
ترازی زیستی	۰/۷۷۹	۰/۷۶۳	۰/۸۶۰	۰/۵۷۱

جدول ۷: شاخصهای زیستی جلبکهای قرمز در هر فصل

شاخص‌ها	پاییز	زمستان	بهار	تابستان
مارگالف	۱/۰۶۹	۱/۳۱۲	۱/۱۹۹	۱/۶۶۴
شانون	۱/۷۲۲	۲/۱۷۸	۲/۰۹۳	۲/۱۱۵
ترازی زیستی	۰/۸۴۵	۰/۹۳۳	۰/۸۳۱	۰/۶۵۵



نمودار ۳: مقایسه شباهت ایستگاههای نمونه برداری از نظر مقدار زیتده جلبکهای قرمز



نمودار ۴: مقایسه شباهت فصوی مختلط نمونه برداری از نظر مقدار زیستوده جلبکهای قرمز

## بحث

جلبکهای قرمز دارای سازگاری‌هایی در محیط هستند، به طوری که دارای اندامهای گوشته‌تر هستند و مشکلی از لحاظ تغییرات شوری، از دست دادن آب، کمبود مواد غذایی و غیره ندارند و چون کمتر تحت تأثیر عوامل فیزیکی جزر و مد هستند دارای اندام محکم و سخت نیستند بلکه پایه‌های آنها ضعیف و حساس‌تر است. این جلبکها تطبیق بیشتری با آب دریا دارند. منطقه رویش و زیستگاه اصلی جلبکهای قرمز، منطقه پایین میان کشنندی و منطقه پایین کشنندی می‌باشد (علویان و همکاران، ۱۳۸۱). در نتیجه، مدت زمان کمتری در طول شباهنروز خارج از آب قرار می‌گیرند و کمتر تحت تأثیر عوامل جوی از قبیل خشکی، تغییرات دما و وزش باد قرار می‌گیرند و چون مدت زمان بسیار کوتاهی خارج از آب هستند، مواد غذایی آب در اختیار آنها قرار دارد همچنین شرایط زیست محیطی آنها دارای پایداری بیشتری است و کمتر با عوامل فیزیکی مانند جزر و مد مواجه هستند. علاوه بر عوامل مذکور عوامل بیولوژیکی در تنوع جلبکهای قرمز مؤثر هستند، بدلیل آنکه جلبکهای قرمز

براساس این تحقیق جلبکهای قرمز بیشترین پراکنش را در منطقه پایین کشنندی داشتند. Clerck و همکاران (۱۹۹۴) در سواحل خلیج فارس کشور عربستان بیشترین پراکنش جلبکهای قرمز را در منطقه پایین کشنندی ثبت نمود. در مطالعه حاضر دو منطقه پایین میان کشنندی و میان، بین کشنندی نیز تراکم قابل توجهی دیده می‌شود. که این امر شاید به دلیل موقعیت توپوگرافی سواحل ایستگاه‌هایی مانند دانشگاه و نیروگاه بوده است، زیرا دارای حوضچه‌ها و همچنین عمق بیشتری بودند و شرایط مناسب برای رشد برخی از گونه‌های جلبک قرمز مانند Champia parvula و Hypnia cicornis را داشتند. دلیل اصلی زیست جلبکهای قرمز در مناطق عمیق‌تر این است که رنگدانه‌های نور با طول موج کوتاه (نور سبز و آبی) که در اعماق بیشتر نفوذ می‌کنند را جذب می‌کنند (Kapur, 2000). علویان و همکاران (۱۳۸۱) در مطالعات خود روی جلبکهای قرمز در سواحل جزیره کیش بیشترین تراکم این جلبکها را در منطقه میان بین کشنندی و سپس پایین کشنندی ذکر کردند.

بیشتر جلکها را در ایستگاه نیروگاه فراهم کرده است. بعد از ایستگاه نیروگاه بهترین منطقه برای رشد و پراکنش این جلکها، ایستگاه دانشگاه می‌باشد، زیرا از نظر وسعت و ویژگیهای توبوگرافی خیلی بهم شبیه هستند، همچنین با بررسی مناطق کشنیدی، منطقه پایین میان کشنیدی دارای بالاترین مقدار شاخص‌های تنوع و غنای گونه‌ای جلکهای قرمز است اما از نظر یکنواختی زیستی منطقه پایین کشنیدی بیشترین مقدار را دارد، این امر نشان می‌دهد که در منطقه زیرکشنیدی شرایط مناسب برای رشد جلکهای قرمز فراهم شده است و توزیع فراوانی گونه‌ای نسبت به مناطق بالاتر بهتر است، زیرا در مناطق بالاتر رقابت شدیدتری بین آنها و جلکهای قهوه‌ای و بعضی از گونه‌های جلکی سبز وجود دارد.

براساس مطالعه حاضر جلکهای قرمز در فصل تابستان، در منطقه پایین کشنیدی و در ایستگاه نیروگاه بیشترین زیستوده را داشتند. جلکهای قرمز دارای توزیع متناسب زیستوده در میان گونه‌های مختلف هستند و گونه‌ها، اختلاف زیادی از نظر زیستوده با هم ندارند. همچنین مشاهده می‌شود که فصل تابستان شرایط رشد اکثر گونه‌های شناسایی شده را داشته است و همان طوری که قبلاً ذکر شد اکثر جلکهای قرمز بهترین شرایط زیستی خود را در مناطق عمیق تر دارند. در نتیجه افزایش زیستوده آنها، در منطقه پایین کشنیدی دور از انتظار نیست.

## منابع

- سهرابی‌پور، ج. و سرتاوی، ا. ۱۳۸۱. گزارش نهایی طرح فلور جلکی استان بوشهر. مرکز تحقیقات جهاد استان بوشهر، صفحه ۱۶۳.
- ریاحی ح. ۱۳۸۷. جلک‌شناسی. انتشارات دانشگاه الزهرا، تهران. صفحه ۳۸۴.
- علویان، ز؛ فرمحمدی، س؛ سواری، ا. و زهزاد، ب. ۱۳۸۱. بررسی فراوانی و پراکنش جلکهای ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی‌های زیست محیطی. مجله علمی شیلات ایران. شماره ۳، پاییز ۱۳۸۱، صفحات ۶۳ تا ۸۰.
- کیانمهر، ۵. ۱۳۸۴. بیولوژی جلکها. چاپ اول، دانشگاه فردوسی مشهد. صفحه ۳۳۱.

کمتر از آب خارج می‌شوند بنابراین کمتر در معرض خورده شدن توسط موجوداتی مانند پرندگان، لاکپشت‌ها، خارپستان و غیره هستند. بطور کلی این جلکها تنש‌های کمتری نسبت به سایر جلکها تحمل می‌کنند. در نتیجه فرصت رشد و گسترش بیشتری در سواحل پیدا می‌کنند (Laevastu, 1981; Clerck et al., 1994).

براساس مطالعه حاضر جلکهای قرمز در فصول پاییز و زمستان میزان تراکم کمتری داشتند اما با افزایش دمای آب در فصل‌های بهار و تابستان تراکم جلکهای آنها به حداقل خود رسیده است این امر موید آن است که در فصول گرمتر سال که تابش بیشتر آفتاب وجود دارد رشد و تراکم جلکهای قرمز محسوس است. تغییرات فصلی می‌تواند تغییرات دمای هوای آب، تغییرات شرایط جوی و تغییرات زمان جزر و مد را به همراه داشته باشد. همچنین حضور سایر موجودات همزیست یا وابسته به جلکها، شدت امواج، شبیب بستر و غیره به نو به خود تأثیراتی در رشد، تراکم، تنوع و پراکنش جلکهای قرمز دارند (Kapur, 2000).

بررسی شاخص‌های اکولوژیکی در تحقیق حاضر نشان می‌دهد که جلکهای قرمز از نظر تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای در ایستگاه نیروگاه بهترین شرایط را دارند. از ویژگی‌های این ایستگاه، شبیب کم، وسعت زیاد پهنه جزر و مدي آن، وجود انواع آلوگی‌ها و فاضلاب شهری است و با توجه به صخره‌ای بودن بستر، شرایط مناسب برای رشد جلکهای ماکروسکوپی را داراست. به علت شبیب کم و گستره وسیع کشنیدی این ایستگاه و همچنین آرام و کم تلاطم بودن آب در آن شرایط جذب نور بهتر فراهم می‌شود. خروج فاضلاب شهری در این منطقه و فراهم شدن مواد مغذی برای رشد جلکها مانند فسفر و نیتروژن که برای رشد و نمو گیاهان ضروری است (Deboer, 1978) باعث افزایش تراکم جلکهای قهوه‌ای در این ایستگاه شده است. همچنین وسعت زیاد این ایستگاه نیز فضای بیشتری برای رشد و نمو جلکها ایجاد می‌کند. با توجه به این که جلکها نسبت به بقیه موجودات کفزی در برابر مواد نفتی مقاوم‌تر هستند، آلانده‌ها با از بین بردن دشمنان بیولوژیکی جلکها از قبیل نرمتنان، خارپستان و لاکپشت‌ها شرایط رشد بیشتر آنها را فراهم می‌نمایند، همچنین با خالی شدن بستر و کم شدن رقابت برای یافتن مکان رشد، استرس کمتری به جلکها وارد می‌شود (Newey et al., 1995).

- Abbott I.A. and Hollenberg G., 1976.** Marine algae of California. Stanford University Press, 827P.
- Andrew N.L., 1988.** Sampling and the description of spatial pattern in marine ecology. Oceanography Marine Annual Review, 25:39-90.
- Basson P.W., 1992.** Checklist of marine algae of the Persian Gulf. Journal of University of Kuwait, 19:217-232.
- Basson P.W., Mohamed S.A. and Arora, D.K., 1989.** A survey of the benthic algae of Bahrain. Botanica Marina, 32:27-40.
- Brouwer P.E.M., 1995.** Biomass cover and zonation pattern of sublittoral macro algae at sing island. Botanica Marin, 38:259-270.
- Chapin T., 2001.** Marin biodiversity monitoring. Protocol for monitoring seaweeds. A report by the marine biodiversity monitoring committee to the ecological monitoring and assessment network of environment Canada. 25P.
- Clerck O. and Coppejans E., 1994.** Marin algae of the jobail marine wildlife sanctuary. Saudi Arabia. A marine wildlife sunctuary for the Persian Gulf. Riyadh and Senckenberg Research Institute, Frankfurt, Germany.
- Dadollahi A.S., Savari A., Omar H., Ismail A., Misiri K. and Ismail R., 2005.** The variation of physiological charactristics in seaweed as a result of heavy metal toxicity: Dose-response relation in *Sargassum ilicifolium* treated with cadmium, copper, nickel, lead, vanadium and zinc. Indian Journal of Hydrobiology, 8(2):167-173.
- Dawes C.J., 1981.** Marine botany. John Wiely and Sons, New York, USA. 628P.
- Deboer J.A., 1978.** Nutritional studies on two red algae; growth rate as a function of nitrogen source ad concentration. Journal Phycology, 14:261-266.
- Kapur D., 2000.** Summary of international production and demand for seaweed colloids in technical papers. Regional Workshop on the Culture and Utilization of Seaweeds. Vol. 2.
- Lavaestu T., 1981.** Summary of international production and demand for seaweed colloids in technical papers, Regional workshop on the Culture and Utilization of Seaweeds. Vol. II. Regional Seafarming Development and Demonstration Project. RAS/90/2002. FAO/UNDP seafarming project August 1981 Cebu City. pp.143-144.
- Lavaestu T. and Hayes M.L., 1981.** Fisheries oceanography and ecology. FAO/UNDP seafarming project, August 1981. Cebu City. pp.129-143.
- Newey S. and R. Seed, 1995.** The effect of the barer oil spill on rocky intertidal community in south Shetland, Scotland. Botanica Marina, 14:112-138.
- Sohrabipoor J. and Rabii R., 1997.** New records of algae for Persian Gulf and flora of Iran. Iranian Journal of Botanica, 7(1):96-115.
- Tseng C.K., 1989.** Common seaweed of China. Institute of Oceanology Academic Sinia. Quinydao China Science Press, Beijing, 316P.

**Taylor W.R., 1979.** Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts. Annual Arbor, The University of Michigan Press, Scientific Series, Michigan, USA. Vol. XXI, pp.44-286.

**Trono G., Ohno M. and Crichtlry A., 2008.** Eucheuma and Kappaphycus: Taxomony and cultivation. *In: seaweed cultivation and marine ranching. Micronesica*, 5:25-119.

## Biomass variation in red algae along the tidal areas of Bushehr province

**Gravand Karimi M.<sup>\*(1)</sup>; Dadolahi Sohrab A.<sup>(2)</sup>; Riahi H.<sup>(3)</sup> and Fazeli Dehkordi T.<sup>(4)</sup>**

Mgk.garavand@yahoo.com

1, 2 & 4- Faculty of Marine Science and Oceanography, Khoramshahr University of Marine Sciences and Technology, P.O.Box: 669 Khoramshahr, Iran

3- Faculty of Science, Shahid Behshti University, G.C., Tehran, Iran

Received: May 2011      Accepted: January 2012

**Keywords:** Algal bloom, Algae, Density, Bushehr province, Iran

### Abstract

This study was carried out during October 2008 to July 2009 in Bushehr coastal areas at 6 stations to examine biomass variations in red algae. Algal samples were collected by hand from intertidal zone, during low tide. Quadrates 50 ×50cm each were marked randomly in the study area, and all algal samples were collected within the quadrate area. Total biomass was found to be 2598.91g. m<sup>-2</sup> belonging to 15 Rhodophyta species. The maximum biomass was 1114.32g. m<sup>-2</sup> (43%) observed at the Niroughah station. Summer showed maximum biomass 1076.36g. m<sup>-2</sup> (41%) compared to other seasons. Results of this study showed Rhodophyta species are dispersed more in mid littoral and sub-tidal areas. Also, the maximum biomass was observed in the sub-tidal zone. The highest biomass of the species belonged to *Gracilaria canaliculata*.

---

\*Corresponding author