

## برآورد اثر ترکیب‌پذیری در کلزا (*Brassica napus L.*) به روش تلاقی لاین × تستر

### Estimation of Combining Ability in Rapeseed (*Brassica napus L.*) Using Line × Tester Cross Method

حسن غلامی<sup>۱</sup>، محمد مقدم<sup>۲</sup> و ولی‌الله رامه<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

۲- استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

۳- استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری

تاریخ دریافت: ۱۳۸۵/۷/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۸/۳

#### چکیده

غلامی، ح.، مقدم، م.، و رامه، و. ۱۳۸۷. برآورد اثر ترکیب‌پذیری در کلزا (*Brassica napus L.*) به روش تلاقی لاین × تستر. نهال و بذر: ۲۴: ۳۹۹-۴۱۱.

به منظور بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و همچنین قابلیت توارث در هشت رقم کلزا، ارقام به صورت تلاقی لاین در تستر تلاقی داده شدند. پانزده هیبرید حاصل به همراه هشت والد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۱-۸۲ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا، نکا مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین مربوطات ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای آکثر صفات از نظر آماری معنی‌دار بود، که به ترتیب نشان‌دهنده تقاضت ارقام از نظر ترکیب‌پذیری عمومی و تلاقی‌ها از نظر اثر ترکیب‌پذیری خصوصی بود. درجه غالبیت بیش از یک و قابلیت توارث عمومی پایین برای صفات، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه نشان‌دهنده اثر فوق غالب است و اهمیت بیشتر اثر غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی این صفات بود، بنابراین تولید هیبرید در جهت بهره‌مندی بیشتر از اثر غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی است. برای صفات تعداد روز تا رسیدن، وزن هزار دانه و درصد روغن اثر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی خصوصیات مورد مطالعه بیشتر بود، بنابراین روش‌های اصلاحی در جهت گزینش این صفات مفید خواهد بود. در بین ارقام، کوانتمو و لیگای و در بین تسترهای فوستو دارای ترکیب‌پذیری عمومی بهتری برای عملکرد و برخی صفات دیگر بودند، بنابراین بهره‌مندی از ارقام مزبور در پروژه‌های اصلاحی می‌تواند در دستیابی به تلاقی‌های با عملکرد بالا موثر باشد. تلاقی‌های فوستو × لیگای بیشترین عملکرد دانه را داشتند و دارای حداقل یک والد با ترکیب‌پذیری عمومی بالا برای این صفت بودند، بنابراین انتخاب بر مبنای قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی می‌تواند در دستیابی تلاقی‌های با ترکیب‌پذیری مناسب برای عملکرد دانه سودمند باشند. تلاقی ذکر شده ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت برای صفات تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه نیز داشت.

واژه‌های کلیدی: کلزا، اثر ژن، ترکیب‌پذیری، لاین × تستر.

#### مقدمه

(Singh and Yavada, 1980) بر روی جمعیت‌های کلزا حاکی از وجود اثر افزایشی برای صفت تعداد روز تا رسیدن دانه بود.

براندل و مکوتی (Brandle and McVetty, 1989) با استفاده از تلاقی‌های نه لاین کلزا در کارولینای شمالی، پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه از جمله قابلیت ترکیب عمومی لاین‌ها و قابلیت ترکیب خصوصی تلاقی‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق قابلیت ترکیب عمومی و قابلیت ترکیب خصوصی عملکرد دانه معنی‌دار بود که نمایانگر اهمیت توأم اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل آن بوده است. در مطالعه‌ای که توسط کومار و همکاران (Kumar *et al.*, 1995) روی عملکرد و اجزای آن در کلزا انجام شد، مشخص گردید که اثر غالیت ناقص ژن‌ها برای صفات تعداد روز تا رسیدن، وزن هزار دانه، و فوق غالیت برای ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه اهمیت بیشتری دارد. از آن جایی که در مطالعات مختلف مواد آزمایشی و شرایط محیطی آزمایش متفاوت هستند، نتایج حاصل از یک مطالعه به دیگر موارد قابل تعمیم نیست در نتیجه مطالعه ویژگی‌های ژنتیکی لاین‌های حاصل از هر برنامه اصلاحی امری اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش به منظور بررسی برآورد ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی، برآورد قابلیت توارث صفات مختلف در هشت رقم کلزا و مشخص نمودن برترین هیبریدها از نظر

اصلاح ژنتیکی کلزا از نظر صفات زودرسی، پاکوتاهی، شاخص برداشت و عملکرد بیشتر در واحد سطح و بهبود کیفیت روغن و کنجاله از جمله اهداف مهم بهنژادی این گیاه روغنی برای تولید ارقام مناسب در اغلب کشورهای جهان بوده است. برای دستیابی به ژنوتیپ‌های برتر از طریق گزینش در نسل‌های در حال تفکیک و همچنین تولید هیبریدهای برتر، بررسی وراثت‌پذیری، میزان هتروزیس و ترکیب‌پذیری ارقام حائز اهمیت است. برای این منظور از طرح‌های ژنتیکی مختلف از جمله طرح تلاقی لاین × تست استفاده می‌شود.

توکرال و سینگ (Thukral and Singh, 1987) نحوه توارث صفات تعداد روز تا رسیدن و عملکرد دانه در بوته را در یک طرح تلاقی دی‌آلل در کلزا مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی معنی‌دار بودن مقادیر واریانس ژنوتیپ‌ها و همچنین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی آن‌ها حاکی از نقش اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی صفات یاد شده بود. ویرندر و همکاران (Virender *et al.*, 1995) با استفاده از طرح تلاقی نیمه دی‌آلل در کلزا گزارش کردند که ارتفاع بوته تحت کنترل اثر افزایشی ژن‌ها است. پال و همکاران (Pal *et al.*, 1981) بر اساس تجزیه دی‌آلل اثر غیرافزایشی ژن را بر صفت تعداد روز تا رسیدن دانه گزارش کردند. نتایج بررسی‌های سینگ و یاوادا

به ترتیب حدود ۶۰۰ میلی متر و ۱۸ درجه سانتی گراد است. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف دربوته و تعداد دانه در غلاف با انتخاب تصادفی ده بوته از هر کرت اندازه گیری و به همراه صفات تعداد روز تا رسیدن، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن مورد مطالعه قرار گرفتند. عملکرد دانه بر حسب کیلو گرم در هکتار محاسبه و برای اندازه گیری روغن از دستگاه NMR استفاده شد. تجزیه داده ها بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. به منظور محاسبه پارامترهای ژنتیکی والدها و تلاقی ها از طرح ژنتیکی تجزیه لاین در تست مبتنی (Kempthorne, 1975) استفاده شد.

عملکرد دانه و سایر صفات مهم زراعی انجام شد.

## مواد و روش ها

در این بررسی پنج والد مادری و سه والد پدری به عنوان تست از میان ۲۵ ژنوتیپ کلزا دریافتی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه و نهال بذر کرج انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. والدهای مادری شامل شیرالی، آپشن ۵۰۰، فوزیا، کواتوم و لیگای و والدهای پدری شامل ساری گل، کریستینا و فوستو بودند. پس از تلاقی والدها، جمعاً ۲۳ ژنوتیپ شامل ۱۵ تلاقی و هشت والد به عنوان مواد ژنتیکی آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش طی دو سال زراعی انجام شد. در سال اول (۱۳۸۰-۸۱) پس از کاشت والدین در نیمه دوم مهرماه، در اوایل اسفند ماه همزمان با گلدهی کلزا عملیات دورگ گیری انجام شد. در سال دوم (۱۳۸۱-۸۲) به منظور ارزیابی ۲۳ هیبریدها و والدها از نظر صفات مختلف، ژنوتیپ موجود در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در آذر ماه سال ۱۳۸۱ کاشته شدند. این آزمایش در ایستگاه زراعی بایع کلا با طول جغرافیایی  $53^{\circ}13'$  درجه و عرض جغرافیایی  $36^{\circ}42'$  درجه و ارتفاع ۴ متر از سطح دریا در سال زراعی انجام شد. بر اساس آمار آب و هوایی و منحنی آمبروترمیک، این منطقه دارای تابستان گرم و مرطوب و زمستان نسبتاً سرد است. متوسط بارندگی و دمای منطقه

## نتایج و بحث

بر اساس جدول ۱ تفاوت معنی دار موجود بین هیبریدها، تجزیه لاین در تست را موجه ساخت. اختلاف معنی دار والدین در مقابل هیبریدها میان وجود هتروزیس معنی دار برای کلیه صفات به غیر از صفات درصد روغن و تعداد دانه در خورجین بود. به جز صفت وزن هزار دانه، بین والدین تفاوت معنی دار از نظر سایر صفات وجود داشت. اختلاف معنی دار برای ارقام در سطح ۱٪ دلیل بر وجود تفاوت معنی دار بین ترکیب پذیری عمومی آنها بود و نشان داد که واریانس ژنتیکی سهم بیشتری از واریانس کل را به خود اختصاص داده است. معنی دار نشدن منبع لاین در تست برای کلیه

جدول ۱- تجزیه واریانس لاین × تستر برای صفات مختلف در ژنوتیپ‌های کلزا

Table 1. Line×tester analysis for different traits in rapeseed genotypes

S.O.V.	منبع تغییرات	درجه آزادی df.	ارتفاع بوته Plant height	تعداد روز تا رسیدن Days to maturity	تعداد خورجین در بوته Pod per plant	تعداد دانه در خورجین Seed per pod	وزن هزار دانه 1000 Seed weight	درصد روغن Oil percent	عملکرد دانه ده بوته Seed yield of ten plants
Parents	والدین	7	196.91 **	15.37 **	1278.80 **	27.73 **	0.124	12.47 **	169.42 **
Parent v.s Crosses	کراس vs والد	1	1959.27 **	36.67 **	378804.20 **	0.92	0.332 *	0.00	2238.90 **
Crosses	کراس‌ها	14	330.88 **	33.38 **	7577.09 *	12.16 **	0.594 **	8.26 **	130.01 **
Lines	لاین‌ها	4	310.67 **	104.26 **	5657.06	35.41 **	1.755 **	20.21 **	253.40 **
Testers	تسترها	2	917.85 **	8.09	16428.30 *	7.61	0.108	4.22	88.36
Tester × Line	لاین × تستر	8	194.25 **	4.26	6324.30	1.68	0.135	3.30	78.73 *
Error	خطا	44	50.14	3.52	3793.63	3.20	0.080	2.30	31.05

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

\*\* و \*: به ترتیب معنی دار در سطوح آماری ۱ درصد و ۵ درصد.

کردند. برآورد درجه غالیت کمتر از یک و بالا بودن و راثت پذیری عمومی برای صفات تعداد روز تا رسیدن، وزن هزار دانه و درصد روغن نشان دهنده اهمیت بیشتر اثر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی این صفات است، بنابراین روش‌های اصلاحی مبتنی بر گرینش برای بهبود این صفات از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود. نتایج مطالعات ویرندر و همکاران (Virender *et al.*, 1995) حاکی از آن است که برای صفات وزن هزار دانه، زمان تا رسیدن و درصد روغن اثر افزایشی ژن‌ها از اهمیت بیشتری بر خوردار است. سینگ و یاوادا (Singh and Yavada, 1980)، توکرال و سینگ (Thukral and Singh, 1987) نیز گزارش مشابهی ارائه کردند.

وراثت پذیری عمومی از ۰/۶۲ برای صفت تعداد خورجین در بوته تا ۰/۸۹ برای صفت ارتفاع بوته متغیر بود (جدول ۴) لذا برای صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدن و وزن هزار دانه که از قابلیت توارث عمومی بالاتری برخوردار هستند تاثیر محیط بر روی آن‌ها کمتر بوده و کارایی انتخاب برای اصلاح آنها بیشتر خواهد بود.

در بین تسترهای، فوستو و در بین ارقام، فوزیا با ترکیب پذیری عمومی منفی و معنی‌دار به ترتیب با مقادیر ۶/۹۶ و ۹/۷۶ در جهت کاهش ارتفاع به عنوان ژنوتیپ‌های مطلوب محسوب می‌شوند. در ضمن میانگین این صفت در بین ارقام از ۱۳۷/۱۳ تا ۱۵۹/۴۲ سانتی‌متر و در بین

صفات به جز ارتفاع بوته و عملکرد نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار از نظر ترکیب پذیری خصوصی در بین ترکیبات بود. در جدول ۲ قابلیت ترکیب عمومی صفات برای کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد و برای تست‌ها فقط در مورد صفات ارتفاع بوته و تعداد خورجین در بوته تفاوت معنی‌دار بود. برای صفات عملکرد دانه، درصد روغن، تعداد روز تا رسیدن و تعداد دانه در خورجین اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. تلاقی درجات مختلفی از ترکیب پذیری خصوصی را داشتند (جدول ۳).

برآورده درجه غالیت بیشتر از یک (جدول ۴) برای صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه نشان دهنده اهمیت بیشتر اثر فوق غالیت ژن‌ها را در کنترل این صفات بود، بنابراین تولید هیبرید برای بهره‌مندی بیشتر از اثر فوق غالیت ژن‌ها توجیه‌پذیر است. بانگا و همکاران (Banga *et al.*, 1996) در مورد عملکرد دانه و تعداد خورجین در بوته گزارش‌های مشابهی ارائه دادند در حالی که سینگ و همکاران (Singh *et al.*, 1995)، سینگ و یاوادا (Singh and Yavada, 1980)، لفارت بوسون و دات (Lefart-Buson and Datte, 1982) و براندل (Brandle and McVetty, 1989) اهمیت هر دو نوع اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها را در مورد عملکرد دانه در کلزا گزارش

جدول ۲- مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین ها و تسترهای کلزا از نظر صفات اندازه گیری شده

Table 2. General combining ability estimates of rapeseed lines and testers for studied traits

Traits	صفات	Testers			تسترهای			Lines			لاین ها		S.E			
		Sarigol	Kristina	Foseto	شیرالی Shiralee	۵۰۰ اپشن Option 500	Fusia	کوانتم Quantum	لیگای Legae	(gca) line	(gi-gi) line	(gca) tester	(gi-gi) tester			
Plant height	ارتفاع بوته	-1.51	8.47**	-6.96**	4.47	2.82	-9.76**	3.67	-1.20	2.36	3.34	1.83	2.59			
Pod per plant	تعداد خورجین در بوته	-37.23*	11.14	26.09	-40.20*	-7.10	19.95	9.79	18.46	20.53	29.04	15.9	22.49			
Seed per pod	تعداد دانه در خورجین	-0.17	0.78	-0.66	-3.24**	0.84	-0.19	2.05**	0.54	0.60	0.84	0.46	0.66			
1000-Seed weight	وزن هزار دانه	0.02	-0.09	0.08	0.30**	0.14	0.19**	-0.79**	0.18**	0.09	0.13	0.07	0.10			
Day to maturity	زمان تاریخ دندان	0.84	-0.49	-0.36	-2.16**	-2.04**	-1.82**	5.74**	0.18	0.63	0.88	0.48	0.69			
Oil percent	درصد روغن	0.12	-0.58	0.46	0.37	2.12**	-1.77**	-1.05**	0.33	0.51	0.72	0.39	0.55			
Seed yield of ten plants	عملکرد ده بوته	-2.55	0.26	2.29	-0.81	-2.41**	-2.66	2.02	7.67**	1.86	2.63	1.44	2.04			

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

\*\* و \*: به ترتیب معنی دار در سطوح آماری ۱ درصد و ۵ درصد.

### جدول ۳ - ترکیب‌پذیری خصوصی تلاقی‌های کلزا برای صفات اندازه‌گیری شده

Table 3. Specific combining ability estimates of rapeseed crosses for studied traits

Line × tester	لاین × تستر	ارتفاع بوته	تعداد روز تا رسیدن	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	درصد روغن	عملکرد دانه ده بوته
		Plant height	Days to maturity	Pod per plant	Seed per pod	1000 Seed weight	Oil percent	Seed yield of ten plants
Shiralee×Sarigol	ساری گل × شیرالی	-5.38	1.16	-14.90	0.67	1.16	0.21	1.72
Shiralee×Kristina	کریستینا × شیرالی	-6.13	-0.84	5.00	-0.61	-0.84	-0.60	3.87
Shiralee×Foseto	فوستو × شیرالی	11.49**	-0.31	9.89	-0.07	-0.31	0.39	-5.60
Option500×Sarigol	ساری گل × آپشن ۵۰۰	-2.80	-0.96	-29.23	-0.79	-0.96	1.35	1.84
Option500×Kristina	کریستینا × آپشن ۵۰۰	0.32	0.38	42.77	-0.07	0.38	-0.45	-0.64
Option500×Foseto	فوستو × آپشن ۵۰۰	2.48	0.58	-13.54	0.85	0.58	-0.0	-1.20
Fusia×Sarigol	ساری گل × فوزیا	-6.22	1.49	-7.91	0.13	1.49	-1.60	-3.31
Fusia × Kristina	کریستینا × فوزیا	7.83*	-1.18	0.79	0.71	-1.18	0.23	2.87
Fusia × Foseto	فوستو × فوزیا	-1.61	-0.31	7.11	-0.84	-0.31	1.37	0.44
Quantom×Sarigol	ساری گل × کوانتم	8.11*	-1.51	-8.62	0.50	-1.51	0.14	5.50
Quantom × Kristina	کریستینا × کوانتم	0.66	1.16	-49.99	0.01	1.16	0.56	-5.08
Quantom × Foseto	فوستو × کوانتم	-8.78*	0.36	58.60	-0.51	0.36	-0.70	-0.42
Legae×Sarigol	ساری گل × لیگای	6.28	-0.18	60.65	-0.51	-0.18	-0.10	-5.75
Legae × Kristina	کریستینا × لیگای	-2.70	0.49	1.42	-0.06	0.49	0.26	-1.02
Legae × Foseto	فوستو × لیگای	-3.58	-0.31	-62.07	0.57	-0.31	-0.16	6.77*
S.E (sca)		4.09	1.08	35.56	1.03	1.08	0.88	3.22
S.E ( $S_{ij} - S_{kl}$ )		5.87	1.53	50.29	1.46	1.53	1.24	4.55

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

\*\* و \*: به ترتیب معنی دار در سطوح آماری ۱ درصد و ۵ درصد.

## جدول ۴- اجزای واریانس ژنتیکی صفات برای صفات مختلف در کلزا

Table 4. Genetic variance components for different traits

Traits	صفات	$h^2_B$	وراثت‌پذیری عمومی	درجه غالبیت d/a
Plant height	ارتفاع بوته	0.89		1.01
Day to maturity	تعداد روز تا رسیدن	0.8		0.24
Pod per plant	تعداد خورجین در بوته	0.62		1.18
Seed per pod	تعداد دانه در خورجین	0.74		-
1000- Seed weight	وزن زار دانه	0.86		0.53
Oil persent	درصد روغن	0.72		0.64
Seed yield of ten plants	میانگین عملکرد ده بوته	0.79		1.17

کریستینا × فوزیا بود. در ضمن میانگین این صفت در بین تلاقی‌ها از ۲۱۷/۳۳ تا ۲۲۷/۳۳ متغیر بود (جدول ۵). بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری عمومی بین مواد آزمایشی برای این صفت تعداد خورجین در بوته مربوط به لاین فوزیا با میزان ۹۵/۹۶ و تستر فوستو با مقدار ۰/۰۹ وبا میانگین به ترتیب ۰/۰۶ و ۰/۰۲ بود. اگر چه ترکیب‌پذیری خصوصی ترکیبات لاین × تستر معنی‌دار نبود، اما تلاقی‌ها درجات مختلفی از ترکیب‌پذیری خصوصی را نشان دادند. از جمله می‌توان به ترکیب‌پذیری مثبت تلاقی‌های ساری گل × لیگای و فوستو × کوانتووم با مقادیر ۶۰/۶۵ و ۶۰/۶۰ و ۵۸/۶۰ و میانگین به ترتیب ۳۳/۴۹ و ۹۳/۵۴ اشاره کرد. چنانچه افزایش تعداد دانه در خورجین در نتاج مد نظر باشد بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری عمومی در جهت مثبت در ارقام مربوط به کوانتووم با میزان ۰/۰۵ و برای تسترهای، کریستینا با مقدار ۰/۰۷۸ به دست آمد (جدول ۴ و ۵).

تسترها مورد بررسی از ۱۴۲/۴ تا ۱۵۶/۵ سانتی‌متر متغیر بود (جدول ۵). ترکیب‌پذیری خصوصی از ۸/۷۸ تا ۱۱/۴۹ نوسان داشت که کمترین مقدار مربوط به تلاقی فوستو × کوانتووم بود. همچنین میانگین برای تلاقی‌ها از ۱۴۱/۰۷ تا ۱۷۲/۲۰ متغیر بود (جدول ۵). در خصوص صفت تعداد روز تا رسیدن با توجه به این که زودرسی یکی از اهداف مهم اصلاحی کلزا محسوب می‌شود، ارقام و تسترهای ساری گل و آپشن ۵۰۰ به ترتیب با میانگین‌های ۴۷/۲۱ و ۰/۰۹۲ روز در اولویت هستند در ضمن ارقام شیرالی و آپشن ۵۰۰ با ترکیب‌پذیری عمومی منفی و معنی‌دار برای این صفت در زمرة ژنوتیپ‌های برتر محسوب می‌شوند. اگر چه ترکیب‌پذیری خصوصی تلاقی‌ها معنی‌دار نشد، ولی درجات مختلفی از ترکیب‌پذیری خصوصی در بین آن‌ها وجود داشت. بیشترین مقادیر ترکیب‌پذیری خصوصی در جهت منفی مربوط به تلاقی‌های ساری گل × کوانتووم و

جهت مثبت مربوط به لاین آپشن ۵۰۰ با مقدار ۲/۱۲ و تستر فوستو با میزان ۴۵۸/۰ و با میانگین به ترتیب ۴۳/۳۹ و ۴۱/۳۴ درصد به دست آمد (جدول ۵). همچنین درجات مختلفی از ترکیب‌پذیری خصوصی در بین هیبریدها مشاهده شد. تلاقی ساری گل × آپشن ۵۰۰ و فوستو × فوزیا به ترتیب با ۱/۳۵ و ۱/۳۷ قابلیت ترکیب خصوصی و میانگین به ترتیب ۴۵/۸۸ و ۴۲/۳۴ درصد از بیشترین ارزش برخوردار بودند (جدول ۶). ترکیب‌پذیر خصوصی تلاقی‌ها معنی‌دار نبود اما تلاقی‌ها درجات مختلفی از ترکیب‌پذیری خصوصی را نشان دادند، از جمله می‌توان به ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت تلاقی‌های فوستو × لیگای، ساری گل × کوانتم و کریستینا × شیرالی با مقادیر ۶/۷۷ و ۵/۵ و ۳/۸۷ و با میانگین به ترتیب ۴۴/۰۹، ۵۵/۶۴ و ۴۲/۲۳ اشاره کرد.

عملکرد دارای وراثت پیچیده بوده و عوامل محیطی زیادی، بر آن تاثیر می‌گذارد. بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری عمومی بین مواد آزمایشی مربوط به رقم لیگای با میزان ۷/۶۷ و تستر فوستو با مقدار ۲/۲۹ و با میانگین به ترتیب ۳۸/۲۳ و ۲۱/۵۸ گرم بود. از آن جایی که یکی از اهداف اصلاحی عملکرد بالا است، انتخاب والدین لیگای و فوستو به عنوان والد انتقال‌دهنده عملکرد بالا می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی مفید باشد. مقادیر ترکیب‌پذیری خصوصی در جدول ۳ نشان می‌دهد که بیشترین مقدار مربوط

کوانتم و کریستینا با میانگین به ترتیب ۲۸/۰۹ و ۲۵/۴۴ در بین مواد مورد آزمایش با بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی مناسب‌ترین گزینه هستند. بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری خصوصی به تلاقی فوستو × آپشن ۵۰۰ با مقدار ۰/۸۵ و تلاقی کریستینا × فوزیا با مقدار ۰/۷۱ و با میانگین‌های به ترتیب ۰/۸۵ و ۰/۷۱ اختصاص داشت. لاین شیرالی و تستر فوستو با میانگین به ترتیب ۰/۳ و ۰/۰۸ دارای مقادیر بالایی از ترکیب‌پذیری عمومی برای وزن هزار دانه بودند که نشانگر برخورداری این ارقام از نظر ژن‌های افزایشی است. مقادیر ترکیب‌پذیری خصوصی در جدول ۳ نشان می‌دهد که بیشترین مقدار مربوط به تلاقی‌های ساری گل × فوزیا و کریستینا × کوانتم با مقادیر به ترتیب ۱/۴۹ و ۱/۱۶ اختصاص داشت، در ضمن میانگین این صفت در بین ارقام از ۳/۶۴ تا ۴/۰۵ و در بین تسترهای مورد بررسی از ۳/۵ تا ۳/۸ متغیر بود. از آن جایی که این صفت به عنوان یکی از اجزای اصلی عملکرد دانه است بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی در مورد افزایش این صفت تاثیر بهسزایی بر افزایش عملکرد خواهد داشت. هیبریدها و والدهای فوق که از ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی مثبت و بالای برای این صفت برخودار بودند در زمرة برترین هیبریدها و والدها محسوب می‌شوند. چنانچه افزایش درصد روغن در نتاج مدنظر باشد، بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری عمومی این صفت در

جدول ۵- میانگین صفات مختلف در لاین ها و تسترهای کلزا

Table 5. Means of different traits of rapeseed lines and testers

Traits	صفات	Testers				Lines				Lainها				S.E			
		Sarigol	Kristina	Foseto	Shiralee	Option 500	Fusia	Quantum	Legae	Mean of lines	LSD Line	Mean of testers	LSD Tester	میانگین لاین ها	میانگین تسترهای		
		ساری گل	کریستینا	فوستو	شیرالی	۵۰۰ اپشن	فوژیا	کوانتم	لیگای	میانگین لاین ها	میانگین تسترهای	میانگین لاین ها	میانگین تسترهای	میانگین لاین ها	میانگین تسترهای		
Plant height	ارتفاع بوته	142.40	143.80	156.50	152.53	137.13	152.74	159.42	141.13	148.59	11.66	147.57	11.66	147.57	11.66		
Pod per plant	تعداد خورجین در بوته	211.47	316.27	274.02	253.87	241.73	278.60	383.8	391.33	309.87	101.43	267.25	101.43	267.25	101.43		
Seed per pod	تعداد دانه در خورجین	20.67	25.44	19.12	20.00	23.76	24.15	28.09	21.72	23.54	2.95	21.74	2.95	21.74	2.95		
1000-Seed weight	وزن هزار دانه	3.50	3.56	3.83	4.05	3.97	3.65	3.58	3.64	3.78	1.44	3.63	1.44	3.63	1.44		
Days to maturity	زمان تاریخیدن	221.33	216.33	220.00	215.67	219.00	220.67	219.33	222.00	219.33	3.09	219.22	3.09	219.22	3.09		
% Oil	درصد روغن	42.71	43.41	41.34	44.30	43.39	37.82	43.46	41.97	42.19	2.50	42.49	2.50	42.49	2.50		
Seed yield of ten plants	عملکرد ده بوته	20.70	23.38	21.58	24.33	22.72	25.13	39.58	38.23	30.00	9.18	21.89	9.18	21.89	9.18		

### جدول ۶ - میانگین صفات مختلف در تلاقی‌های کلزا

Table 6. Means of different traits of rapeseed crosses

Line × tester	لاین × تستر	ارتفاع بوته	تعداد روز تا رسیدن	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	درصد روغن	عملکرد دانه ده بوته
		Plant height	Days to maturity	Pod per plant	Seed per pod	1000 Seed weight	Oil percent	Seed yield of ten plants
Shiralee×Sarigol	ساری گل × شیرالی	156.97	220.67	357.13	20.37	4.01	42.99	37.28
Shiralee×Kristina	کریستینا × شیرالی	166.22	217.33	425.40	20.05	4.16	41.47	42.23
Shiralee×Foseto	فوستو × شیرالی	168.40	218.00	445.23	19.18	4.26	43.50	34.80
Option500×Sarigol	ساری گل × آپشن ۵۰۰	157.90	218.67	375.00	23.00	4.30	45.88	31.80
Option500×Kristina	کریستینا × آپشن ۵۰۰	171.0	218.67	495.37	24.66	3.96	43.37	32.12
Option500×Foseto	فوستو × آپشن ۵۰۰	157.30	219.00	454.00	24.19	3.78	43.69	33.60
Fusia×Sarigol	ساری گل × فوزیا	141.90	221.33	424.27	22.88	4.03	39.04	30.39
Fusia × Kristina	کریستینا × فوزیا	165.93	217.33	481.33	24.41	3.78	40.16	39.37
Fusia × Foseto	فوستو × فوزیا	141.07	218.33	502.60	21.47	4.37	42.34	38.98
Quantom×Sarigol	ساری گل × کوانتم	169.67	226.00	413.40	25.49	3.03	41.49	44.09
Quantom × Kristina	کریستینا × کوانتم	172.20	227.33	420.40	25.95	3.15	41.21	36.32
Quantom × Foseto	فوستو × کوانتم	147.33	226.67	543.93	24.04	3.07	41.00	43.01
Legae×Sarigol	ساری گل × لیگای	162.67	221.67	491.33	22.97	4.07	42.65	38.30
Legae × Kristina	کریستینا × لیگای	163.97	221.00	480.47	24.04	3.84	42.3	45.82
Legae × Foseto	فوستو × لیگای	147.67	220.33	431.93	23.60	4.25	42.91	55.64
Meam	میانگین	159.40	220.82	450.97	23.11	3.87	42.28	38.92
LSD		11.66	3.1	101.43	2.95	1.44	2.5	9.18

قابلیت ترکیب خصوصی منفی برای ارتفاع بوته بود. تلاقی فوستو × فوزیا قابلیت ترکیب خصوصی مثبت برای عملکرد دانه، درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد خورجین در بوته، و قابلیت ترکیب خصوصی منفی برای ارتفاع بوته داشت در نتیجه این سه هیرید دارای ویژگی های مطلوب هستند و از ارقام مستخرج به شرط ایجاد سیستم نر عقیمی مناسب می توان در تولید هیرید کلزا بهره برداری کرد.

**سپاسگزاری**  
بدینوسیله از همکاران محترم بخشن تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که مواد ژنتیکی این آزمایش را فراهم کردند، از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و همکاران ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا که برای انجام این آزمایش همکاری کردند صمیمانه سپاسگزاری می شود.

به تلاقي های فوستو × لیگای که با برخورداری از بالاترین ترکیب پذیری خصوصی ۶/۷۷ و میانگین ۵۵/۶۴ گرم به عنوان برترین هیریدها محسوب می شود. یعنی دو والد لیگای و فوستو هم ترکیب شونده عمومی خوب و هم ترکیب شونده خصوصی خوبی هستند.

به طور کلی ارقام کوانتم و لیگای به دلیل برخورداری از ترکیب پذیری عمومی مثبت برای عملکرد دانه، درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته همچنین با ترکیب پذیری عمومی منفی برای ارتفاع بوته (پاکوتاهی) و صفت تعداد روز تا رسیدن قابل توصیه برای استفاده در برنامه های به نژادی هستند.

هیرید فوستو × لیگای از قابلیت ترکیب خصوصی مثبت برای عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین و ترکیب خصوصی منفی برای تعداد روز تا رسیدن و ارتفاع بوته داشت. تلاقی کریستینا × شیرالی دارای قابلیت ترکیب خصوصی مثبت برای صفات وزن هزار دانه، تعداد خورجین در بوته و

## References

- Banga, S. S. 1996.** Genetics and breeding. pp. 50-76. In : Chopra ,V.L., and Prakash , S. (eds.) Oilseed and Vegetable Brassica. Oxford and IBH Publishing Co . Pvt. Ltd. New Delhi , Calcutta.
- Brandle, J. E., and McVetty, P. B. E. 1989.** Heterosis and combining ability in hybrids derived from oilseedrape cultivars and inbreed line. Crop Science 29: 1191-1194.
- Kempthorne, O. 1957.** An Introduction to Genetic Statistics. John Wiley and Sons, Inc. New York, USA.

- Kumar, A. D., Sigh, D. S., Kamboj, M. C., and Chandra, N. 1995.** Genetics of yield and its components in Indian mustard (*Brassica juncea* L.)Crop Research Hisar 7: 243-246.
- Lefort-Buson, M., and Dattee, Y. 1982.** Genetic study of some agronomic characters in winter oilseed rape (*Brassica napus* L.). II. Gentic parameters. Agriculture 2:323.332.
- Pal, R., Singh, H., Jatasra, D. S., and Rishi, P. 1981.** Genetics of yield and yield components in Indian rapeseed. Indian Journal of Agricultural Science 51: 550–553.
- Singh, D., Malik, V., and Singh, H. 1995.** Gene action of seed yield and other desirable Characters in rapeseed (*Brassica napus* L.) Annals of Biology Ludhiana 11: 94-97.
- Singh, H., and Yavada, C. K. 1980.** Gene action and combining ability for seed yield, flowering and maturity in rapeseed. Indian Journal of Agricultural Science 50: 655-659.
- Thukral, S. K., and Singh, H. 1987.** Genetic analysis of seed yield, flowering and maturity in rapeseed. Indian Journal of Agricultural Science 57:298-302.
- Virender, M., Singh, H., Singh, D., Malik, V., and Singh, H. 1995.** Gene action of seed yield and other desirable characters in rapeseed (*Brassica napus* L.). Annals of Biology Ludhiana 11:1– 2.

