

## تنوع فنتوتیپی اکو-تیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران

### Phenotypic Diversity in Barley Ecotypes of Arid- zone of Iran

شکیبا شاهمرادی<sup>۱</sup>، سکینه شفاءالدین<sup>۱</sup> و احمد یوسفی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> و <sup>۲</sup>- به ترتیب مریبی و کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۴/۲

#### چکیده

شاهمرادی، ش.، شفاءالدین، س.، و یوسفی، ا. ۱۳۹۰. تنوع فنتوتیپی اکو-تیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران. مجله بهنژادی نهال و بذر ۴۹۵-۲۷-۱.

در تحقیق حاضر بخشی از کلکسیون جو اهلی (*Hordeum vulgare*) شامل ۲۷۸ مورفو-تیپ بومی مناطق گرم و خشک از کلکسیون موجود در بانک ژن گیاهی ملی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ارزیابی شد. پارامترهای آمار توصیفی صفات کمی مورفو-تیپ‌ها نشان دهنده این بود که دامنه تنوع در صفات مختلف متفاوت است. در برخی از صفات کیفی تنوع اندکی ملاحظه شد اما اکثر صفات مورد بررسی از تنوع نسبتاً بالایی برخوردار بودند. با توجه به پارامتر ضریب تغییرات در میان صفات کمی، بیشترین تنوع در صفات عملکرد، تعداد سنبلچه در سنبله و ارتفاع بوته دیده شد. عادت رشدی، رنگ دانه و نوع لاما دارای بیشترین تنوع در صفات کیفی بودند. همبستگی مثبت و معنی داری میان صفات تعداد سنبلچه در سنبله و وزن صد دانه و عملکرد دانه وجود داشت این امر ارتباط نزدیک این صفات را در شرایط متفاوت محیطی نشان می‌دهد. گروه‌بندی مورفو-تیپ‌ها با استفاده از صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و آگرونومیکی و محل جمع آوری بر اساس استان، منجر به ایجاد چهار گروه اکو-تیپی مختلف شد.

واژه‌های کلیدی: جو، ژرم‌پلاسم، صفات مورفولوژیکی و آگرونومیکی، همبستگی.

#### مقدمه

باشند، افزایش می‌یابد (Rajabi *et al.*, 2002).

کاهش چشمگیر تنوع ژنتیکی در بسیاری از گونه‌های زراعی توجه جهانی را به منشاء اولیه ژن‌های جدید که غالب در توده‌های بومی نهفته است و می‌تواند ژن‌های ارزشمندی برای صفات مقاومت به بیماری‌ها، محتوای پروتئین بالا، مقاومت به خشکی و سایر صفات مطلوب اقتصادی باشد، جلب کرده است (Houssman *et al.*, 2004; Al Khanjari *et al.*, 2008).

ایران یکی از مراکز تنوع جو در خاورمیانه است که به دلیل تنوع ژنتیکی وسیع و بومی بودن جو در این منطقه دارای اهمیت خاصی برای بهنژادگران است (Koocheki, 1998). بسیاری از ارقام زراعی جو مورد کشت و کار در ایران هنوز از اکوتیپ‌های بومی هستند. استفاده از اکوتیپ‌های بومی در برنامه‌های دورگ‌گیری از اهمیت خاصی برخودار است. در کلکسیون جو بانک ژن گیاهی ملی ایران، بالغ بر هشت هزار اکوتیپ از انواع مختلف جو وحشی و اهلی وجود دارد. ارزیابی دقیق و شناسایی همه جانبه صفات زراعی و مورفولوژیکی و دسته‌بندی کلکسیون از نظر درجه خویشاوندی و تهیه بانک اطلاعاتی استفاده از این کلکسیون را در امر برنامه‌های بهزراعی و بهنژادی در آینده، آسان‌تر می‌کند (Behnia, 1994).

شفاءالدین (Shafaoddin, 2002) تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ۴۲۴ اکوتیپ متعلق به

تنوع ژنتیکی پایه و اساس اصلاح گیاهان زراعی محسوب می‌شود چراکه گزینش گیاهان با خصوصیات مطلوب یا انتقال صفات به گیاهان زراعی را مقدور می‌سازد. همچنین مقاومت گیاهان در برابر آفات، بیماری‌ها و تنش‌های محیطی بستگی زیادی به تنوع ژنتیکی دارد (Roudbarkalary *et al.*, 2001). این تنوع می‌تواند به صورت خویشاوندان نزدیک گیاهان زراعی، همانند بسیاری از گونه‌های گندم (دوروم، گندم معمولی و غیره) و یا ارقام زراعی در مناطق مختلف باشد. جو دارای آفات و بیماری‌های متعددی است که باعث کاهش در کیفیت و کمیت عملکرد آن می‌شوند (Brush, 1995). برای کنترل این بیماری‌ها و آفات در گذشته از حشره‌کش و قارچ‌کش‌ها استفاده می‌شد، اما امروزه بهنژادگران سعی در معرفی منابع ژنتیکی مقاوم دارند (Pickering and Johnston, 2005).

اهلی کردن جو، همانند بسیاری از گیاهان دیگر، باعث کاهش قابل ملاحظه تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های وحشی آن شده است (Ellis *et al.*, 1999). به منظور استفاده از سرمایه عظیم تنوع ژنتیکی در برنامه‌های بهنژادی، اطلاع از ماهیت و میزان تنوع در ژرمپلاسم از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا والدینی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند، هیبریدهایی با هتروزیس بیشتر تولید می‌کنند و احتمال این که نتاج تفرق یافته برتر از والدین

ارزیابی صفات زراعی نشان داد که تنوع زیادی در بین اکو تیپ های مورد بررسی وجود دارد و بررسی ارتباط بین متغیرها نشان داد که عملکرد عمدها تحت تاثیر صفات دوره رشد رویشی، یکنواخت بودن اندازه بذر و تعداد دانه در سنبله است. همبستگی مثبت و معنی داری نیز بین صفات یکنواختی دانه و وزن هزار دانه وجود داشت. همچنین تنوع ژنتیکی نمونه های کلکسیون عظیم ژرم پلاسم جو در ایکاردا به دفعات مورد ارزیابی محققین قرار گرفته است (Ceccarelli *et al.*, 1999; Jilal *et al.*, 2008

اهداف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی صفات فنولوژیکی، آگرونومیکی و مورفولوژیکی بخشی از ژرم پلاسم جو موجود در بانک ژن، تعیین میزان تنوع موجود در صفات مورد ارزیابی و همچنین همبستگی میان صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی بود.

### مواد و روش ها

در این تحقیق اکو تیپ های جو بومی مناطق گرم و خشک موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس اطلاعات موجود مبنی بر محل جمع آوری، شامل ۱۲۶۳ اکو تیپ که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته بودند، انتخاب و در پاییز سال زراعی ۱۳۸۵-۸۶ در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کاشته شدند. کاشت اکو تیپ ها در قالب طرح آگمنت به همراه سه رقم جو شاهد به نام های

استان های شمال کشور را در آزمایشی مشاهده ای بررسی کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد دانه با صفات طول بوته، زمان گلدهی، تعداد سنبله در سنبله، طول سنبله، ظهور اولین سنبله و عملکرد بیولوژیکی همبستگی مثبت و معنی دار داشت.

نگasa (Negasa, 1985) ۴۸۵ توده جو را از ۹۱ منطقه از ۱۲ استان اتیوپی جمع آوری کرد و در مزرعه تحقیقاتی به ارزیابی صفاتی نظری تعداد ردیف، طول سنبله، نوع ریشک، تراکم سنبله، رنگ دانه و غیره پرداخت. او گزارش کرد که دامنه تنوع در صفات مختلف، متفاوت بود.

بکز (Backes, 2009) تنوع مورفولوژیکی قابل ملاحظه ای را در مزارع جو گزارش کرد و اظهار داشت که وجود هتروژنی در جمعیت های گیاهی باعث ایجاد پایداری و ثبات به خصوص در شرایط محدودیت منابع می شود. الخجری و همکاران (Al Khanjari *et al.*, 2008) نیز با بررسی توده های بومی گندم عمان گزارش کردند که داده های مورفولوژیکی حاصل از این تحقیق تنوع بسیار بالایی را نشان داد و ثابت کرد که صفات ساده مورفولوژیکی می تواند در بررسی تنوع موثر واقع شود.

بررسی تنوع ژنتیکی در ۱۴۰ ژرم پلاسم جو پاییزه موجود در بانک ژن اسلواکی توسط زاکووا و بن کووا (Zakova and Benkova, 2004) بر اساس

شاخص شانون (Shanon index: H') مطابق فرمول زیر استفاده شد : (Shannon and Weaver, 1949)

$$H' = - \sum_{i=1}^S P_i \ln(P_i) / \ln(S)$$

در این فرمول  $P_i$  نشانده‌نده فراوانی نسبی هر گروه فنتوپی در صفت مربوطه و S تعداد گروه‌های فنتوپی هر صفت است.

تجزیه همبستگی بین صفات کمی و کیفی به طور جداگانه و به ترتیب بر اساس روش پیرسون و اسپیرمن انجام تجزیه به مولفه‌های اصلی با استفاده از نرم‌افزار STATGRAPHICS 2.1 و گروه‌بندی اکوتیپ‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

### نتایج و بحث

در جدول ۱ نحوه یادداشت‌برداری از صفات مختلف گیاه جو مطابق دستورالعمل IPGRI نشان داده شده است.

اکوتیپ‌های جو اهلی کشت شده در مزرعه به نحو مطلوبی سبز شدنده و علاوه بر یادداشت‌برداری صفات فنولوژیکی، جداسازی مورفولوژیکی و آگرونومیکی، جداسازی مورفوتیپ‌ها نیز در این اکوتیپ‌ها انجام شد. از میان ۲۶۳ اکوتیپ مورد بررسی در این سال زراعی، پانزده اکوتیپ دارای مورفوتیپ‌های متفاوتی بودند که جداسازی در آن‌ها انجام شد و ۰/۸۶٪ (۲۳۹ مورفوتیپ) از نوع شش ردیفه و ۰/۱۳٪ (۳۹ مورفوتیپ) از نوع دو ردیفه بود (جدول ۲).

ماکویی، کارون × کویر (نصرت) و ریحان در هفت بلوک ۴۴ تایی انجام شد. هر اکوتیپ در یک خط یک متري روی پشته کاشته شد. صفات اندازه گیری شده بر اساس دستورالعمل (International Plant Genetic IPGRI Resource Institute) ارتفاع بوته، رنگ ساقه، تعداد روز تا ۵۰٪ گلده‌ی، تعداد ردیف در سنبله، تراکم سنبله، نوع ریشک، رنگ گلوم، نوع لما، رنگ ریشک، رنگ لما و غیره بودند که برخی در مزرعه یادداشت‌برداری شد (Anonymous, 1994) و برخی پس از برداشت تعداد هشت عدد سنبله به صورت تصادفی از هر کرت در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. امتیازدهی بر اساس دستورالعمل‌های موسسه ذخایر تواری گیاهی بین‌المللی انجام شد. از آنجائی که برخی از توده‌های موجود در بانک ژن شامل مورفوتیپ‌های مختلفی هستند، جداسازی مورفوتیپ‌ها نیز در این سال انجام شد. جداسازی مورفوتیپ‌ها بر اساس تفاوت در صفات مورفولوژیک و فنولوژیک از جمله ارتفاع بوته، طول ریشک، رنگ سنبله، تاریخ گلده‌ی، تعداد ردیف و غیره انجام شد. اطلاعات آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات، حداقل و حداکثر بود. به منظور ارزیابی میزان تنوع در صفات کمی، ضریب تغییرات فنتوپی (Coefficient of Variance) CV محاسبه شد. همچنین به منظور تعیین تنوع صفات کیفی، از

## جدول ۱- دستورالعمل IPGRI برای یادداشت برداری صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و زراعی در گیاه جو

Table 1. IPGRI descriptor for morphologic, phenologic and agronomic traits in barley

Traits	صفات	Descriptions
(GRH) Growth Habit	عادت رشدی	3. Prostrate; 5. Intermediate; 7. Erect
(PH) Plant Height (cm)	ارتفاع بوته	
(STP) Stem Pigmentation	رنگ ساقه	1. Green; 2. Purple (basal only); 3. Purple (half or more)
(AUP) Auricle Pigmentation	رنگ گوشوارک	1. Green; 2. Pale Purple; 3. Purple; 4. Dark Purple
(DS) Days to Spike emergence	تعداد روز تا ظهور سنبله	
(DF) Days to Flowering	روز تا گلدهی	
(DM) Days to Maturity	روز تاریخی	
(SPN) Spike density	تراکم سنبله	3. Lax; 5. Intermediate; 7. Dense
(SPL) Spike Length	طول سنبله	
(NSG) Number of Spikelet Groups (triplets) per spike	تعداد سنبلچه در سنبله	
(LOH) Lemma Own/Hood	ریشک لما	1. Awnless; 2. Awnleted; 3. Awned; 4. Sessile hoods; 5. Elevated hoods
(LB) Lemma awn Barbs	خارداری ریشک	3. Smooth (few barbs at tip); 5. Intermediate (small barbs on upper half); 7. Rough
(GLC) Glume Color	رنگ گلوم	1. White; 2. Yellow; 3. Brown; 4. Black
(LET) Lemma Type	نوع لما	1. No Lemma teeth; 2. Lemma teeth (barbs on lateral nerves); 3. Lemma hair
(AWC) Awn Color	رنگ ریشک	1. Amber white; 2. Yellow; 3. Brown; 4. Reddish; 5. Black; 6. Other
(LEC) Lemma Color	رنگ لما	1. Amber (=normal); 2. Tan/red; 3. Purple; 4. Black/grey; 5. Other
(GRC) Grain (Pericap) color	رنگ دانه	1. White; 2. Tan/red; 3. Purple; 4. Black; 5. Other
(KEC) Kernel Covering	پوشش دانه	1. Naked grain; 2. Semi-covered grain; 3. Covered grain
(KW) 100-Kernel Weight (g)	وزن صد دانه	
(Y) Grain yield (g/plot)	عملکرد دانه	

Source: Anonymous (1994)

وجود نداشت و داده‌ها بدون تغییر در تجزیه‌های آماری به کار رفتند.  
نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی داده‌ها برای صفات کمی و کیفی در ۲۷۸ مورفو تیپ مورد ارزیابی در جدول‌های ۴ و ۵ نشان داده شده است. با توجه به پارامتر ضریب تغییرات در میان صفات کمی، بیشترین تنوع در صفات عملکرد، تعداد سنبلچه در سنبله و ارتفاع بوته

تجزیه واریانس صفات مختلف در ارقام شاهد (ماکویی، کارون × کویر و ریحان) نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین بلوک‌های آزمایش وجود نداشت برای مثال تجزیه واریانس برای صفت عملکرد دانه در جدول ۳ نشان داده شده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که زمین آزمایش دارای یکنواختی کافی بوده و نیازی به تصحیح داده‌ها

**جدول ۲- اطلاعات مربوط به استان محل جمع آوری و نوع تیپ سنبله در اکو تیپ ها**  
**Table 2. Information of province of origin and type of spike in ecotypes**

شش ردیفه	دو ردیفه	تعداد اکو تیپ	استان محل جمع آوری	Province of origin
6-row	2-row			
108	15	123	بوشهر	Booshehr
12	2	14	اصفهان	Isfahan
9	4	13	فارس	Fars
8	-	8	هرمزگان	Hormozgan
18	3	21	کرمان	Kerman
34	5	39	خراسان	Khorasan
7	5	12	خوزستان	Khuzestan
3	-	3	لرستان	Lorestan
3	1	4	مرکزی	Markazi
17	2	19	سیستان و بلوچستان	Sistan and Baluchestan
20	2	22	یزد	Yazd

**جدول ۳- تجزیه واریانس صفت عملکرد دانه در ارقام شاهد**  
**Table 3. Variance analysis of grain yield in sample cultivar**

S.O.V.	df.	MS	F	Sig.
Block	6	39391.37	1.39	0.265
Treatment	2	52878.34	1.87	0.186
Error	20	28231.55		
Total	27			

a. R Squared = .339 (Adjusted R Squared = .107)

و بلندترین اکو تیپ ۱۰۳ سانتی متر ارتفاع داشت.  
 میانگین طول سنبله در این اکو تیپ ها ۶/۶ سانتی متر بود که حداقل آن ۴ و حداقل ۱۰/۳۰ سانتی متر بود.

به منظور تعیین میزان تنوع در صفات کیفی، شاخص شانون در این صفات محاسبه شد. هر چه مقدار این شاخص برای صفتی بیشتر باشد، نشان دهنده تنوع بیشتر آن صفت خواهد بود.

وجود داشت و نشان می دهد مورفو تیپ های مورد بررسی در این صفات کمی، ظاهر متفاوتی داشته اند. دامنه تغییرات عملکرد از ۳ تا ۹۱ گرم در کرت متغیر بود. کمترین و بیشترین تعداد سنبلچه در سنبله در مورفو تیپ های جو، به ترتیب ۹ و ۳۱ عدد بود که نشان دهنده دامنه تنوع بالایی در اکو تیپ ها است. ارتفاع بوته نیز بسیار متغیر بود. کوتاه ترین اکو تیپ ۶۰ سانتی متر

جدول ۴ - پارامترهای آمار توصیفی صفات کمی اندازه‌گیری شده در مورفوتیپ‌های جو  
 Table 4. Descriptive statistic parameters for quantitative traits in barley morphotypes

Parameter	پارامتر	میانگین	روز تا گلدهی Days to flowering	ارتفاع بُوته Plant hight (cm)	روز تا رسیدن Days to maturity	طول سنبله Spike length (cm)	تعداد سنبلچه در سنبله Number of spiklet groups per spike	عملکرد Grain yield (g/plot)	وزن دانه 100-Kernal weight (g)
Mean	میانگین	175.05	84.06	206.12	6.61	18.41	417.96	5.27	
Standard Error	انحراف معيار	3.02	9.37	4.59	1.07	3.86	156.44	0.56	
Variance	واريانس	9.16	87.92	21.14	1.16	14.96	24470.00	0.31	
Range	دامنه	12.00	43.00	31.00	6.30	22.00	907.00	3.99	
Minimum	حداقل	173.00	60.00	197.00	4.00	9.00	3.00	3.00	
Maximum	حداکثر	185.00	103.00	228.00	10.30	31.00	910.00	6.99	
C.V.	ضریب تغیرات	1.72	11.08	2.23	16.30	21.01	37.43	10.69	

جدول ۵ - پارامترهای آمار توصیفی صفات کیفی اندازه‌گیری شده در مورفوتیپ‌های جو  
Table 5. Descriptive statistic parameters for qualitative traits in barley morphotypes

Parameter	پارامتر	عادت رشدی	تراکم سنبله	رنگ ساقه	ریشک لما	خارداری ریشک	پوشش دانه	رنگ گوشوارک	تعداد ردیف	رنگ ریشک	نوع لما	رنگ لما	رنگ دانه	رنگ گلوم
		Growth habit	Spike density	Stem pigmentation	Lemma awn barbs	Lemma awn hood	Kernel covering	Auricle pigmentatio n	Row number	Awn color	Lemma type	Lemma color	Grain color	Glum color
Mode	مد	5	5	1	7	3	3	1	6	2	1	1	1	2
Standard Error	انحراف معيار	1.398	1.169	0.467	0	0	0.120	0.424	1.379	0.518	0.760	0.904	1.069	0.536
Variance	واریانس	1.955	1.367	0.218	0	0	0.014	0.179	1.901	0.268	0.577	0.817	1.143	0.278
Range	دامنه	4	4	2	0	0	2	3	4	2	2	3	3	3
Minimum	حداقل	3	3	1	7	3	1	1	2	2	1	1	1	1
Maximum	حداکثر	7	7	3	7	3	3	4	6	4	4	4	4	4
Shannon Index	شاخص شانون	0.9121	0.5667	0.4682	0	0	0.0405	0.2463	0.5763	0.5792	0.6422	0.4583	0.7626	0.418

فراوانی مربوط به تعداد ۱۵ سنبلاچه در سنبله بود (شکل ۱-a). بیشترین فراوانی مشاهده شده در صفت طول سنبله در اکوتویپ‌های جو، ۶ سانتی‌متر بود و این صفت در دامنه ۴ الی ۱۰/۳۰ سانتی‌متر متغیر بود. تعداد روز تا گلدهی در مورفوتویپ‌های مختلف جو از ۱۷۳ تا ۱۸۵ روز به طول انجامید و در نمودار فراوانی این دو صفت توزیع نرمالی مشاهده نشد (شکل ۱-b). تاریخ رسیدن زراعی در زودرس‌ترین اکوتویپ پس از ۱۹۷ روز و در دیررس‌ترین اکوتویپ پس از ۲۲۸ روز رخ داد. وزن صد دانه در مورفوتویپ‌های جو مورد ارزیابی در این آزمایش ۳ تا ۶/۹۹ گرم بود و توزیع نرمالی در این دامنه داشت. عملکرد دانه توزیع نرمالی را در دامنه گسترهای از ۳۹ تا ۹۱ گرم به نمایش گذاشت (شکل ۲-c).

جدول ۷ ضرایب همبستگی برای صفات کمی در ۲۷۸ مورفوتویپ جو را نشان می‌دهد. بالاترین ضرایب همبستگی در این جدول مربوط به صفات طول سنبله و تعداد سنبلاچه در سنبله بود که در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار شده است (۰/۵۲۶). صفات تعداد سنبلاچه در سنبله همبستگی مثبت و معنی‌دار با صفات وزن صد دانه و عملکرد دانه نشان داد که در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار بود. شفاءالدین (Shafaoddin, 2002) نیز گزارش کرد که عملکرد دانه در گیاه جو با صفات روز تا گلدهی، تعداد سنبلاچه در سنبله و طول سنبله همبستگی معنی‌داری نشان داد. این امر اهمیت

براین اساس، عادت رشدی (۰/۹۱۲۱)، رنگ دانه (۰/۷۶۲۶) و نوع لما (۰/۶۴۲۲) دارای بیشترین تنوع در صفات کیفی بودند. در این اکوتویپ‌ها صفات ریشک لما و خارداری ریشک تنوعی نشان ندادند و در همه مورفوتویپ‌ها، لما ریشک‌دار بود و ریشک زبر و بدون خار بود.

در جدول ۶ درصد فراوانی حالات مختلف مشاهده شده در برخی از صفات کیفی مورد ارزیابی در مورفوتویپ‌های جو نشان داده شده است. رنگ ریشک و رنگ گلوم در اکثر اکوتویپ‌ها زرد رنگ بود ولی در تعداد اندکی از اکوتویپ‌ها رنگ بنفش و سیاه مشاهده شد (۰/۱۲٪).

رنگ دانه در اکوتویپ‌ها از سفید (۱) تا سیاه (۴) متغیر بود و رنگ سفید بیشترین فراوانی را در میان این اکوتویپ‌ها داشت (۰/۸۴۳٪). رنگ گوشوارک نیز در مورفوتویپ‌های جو مورد بررسی در این سال، از سفید تا بنفش متغیر بود. رنگ بنفش فراوانی پایینی داشت (۰/۲۴٪) و در اغلب اکوتویپ‌ها گوشوارک سفید رنگ بود (۰/۹۱٪). در میان صفات کیفی، در صفات نوع ریشک و زبری ریشک تنوعی در میان اکوتویپ‌ها دیده نشد.


هیستوگرام فراوانی صفات کمی بطور جداگانه در شکل‌های ۱ و ۲ ارائه شده است. از نظر صفت تعداد سنبلاچه در سنبله، مورفوتویپ‌های جو دامنه وسیعی از تنوع را از تعداد ۹ تا ۳۱ سنبلاچه، داشتند که بیشترین

## جدول ۶- فراوانی برخی از صفات کیفی در مورفوتیپ‌های جو

Table 6. Frequency of some qualitative traits in barley morphotypes

Traits	صفات			Frequency	درصد فراوانی			
Growth habit	عادت رشدی	Er.	ایستاده	43	Int.	متوسط	43	خوابیده 14
Spike density	تراکم سنبله	Den.	فرشد	23.5	Int.	متوسط	64.6	باز 11.9
Stem pigmentation	رنگ ساقه	Yeii.	زرد	84.5	Red	قرمز	12.3	بنفش 3.2
Kernel covering	پوشش دانه	Nak.	لخت	0.6	Cov.	پوشیده	99.4	
Row number	تعداد ردیف	2row	دو ردیفه	13.7	6row	شش ردیفه	86.3	
Lemma type	نوع لما	NLT	بدون دندانه	75.7	LT	دندانه دار	7.6	LH کرکدار 16.7
Awn color	رنگ ریشک	Yell.	زرد	77.2	Brown	قهوه‌ای	19.2	سیاه 3.6
Grain color	رنگ دانه	Yell.	زرد	55.3	Purp.	بنفش	40	Black سیاه 4.7

For description of traits see Table 1.



شکل ۱- هیستوگرام فراوانی صفات کمی تعداد سنبلاچه در سنبله (a)، طول سنبله (b)، تعداد روز تا گلدهی (c) و تعداد روز تا رسیدن (d) در مورفوتیپ‌های جو


Fig. 1. Frequency histogram of quantitative traits: number of spiklets per spike(a), spike length(b), days to flowering(c) and days to maturity in barley morphotypes

زودرس است. این موضوع با توجه به دوره طولانی‌تر فتوستر و تولید بیشتر اسمیلات‌ها در مورفوتیپ‌های دیررس، قابل توجیه است این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مطابقت دارد (Zakova and Benkova, 2004).

لازم به ذکر است که معنی دار شدن ضرایب همبستگی دلالت صدرصد بر وجود همبستگی ندارد و

این صفت را در تعیین عملکرد جو نشان می‌دهد.

صفت فنولوژیکی روز تا رسیدن همبستگی مثبت معنی داری با صفات آگرونومیکی تعداد سنبلاچه در سنبله، وزن صد دانه و عملکرد دانه نشان داد که این امر حاکی از عملکرد بالاتر در مورفوتیپ‌های دیررس نسبت به مورفوتیپ‌های



شکل ۲- هیستوگرام فراوانی صفات کمی ارتفاع بوته (a)، وزن صد دانه (b) و عملکرد دانه در گرت (c) در مورفوتیپ‌های جو مورد ارزیابی

Fig. 2. Frequency histogram of qualitative traits: plant height (a), 100 seed weight (b) and grain yield (c) in barley morphotypes

همان طور که در جداول ۷ و ۸ مشاهده می‌شود ضرایب همبستگی کوچک هم در سطح ۱٪ معنی‌دار شده‌اند. به منظور بررسی ساختار تنوع ژنتیکی در میان اکوتیپ‌های مورد بررسی و ارزیابی دقیق تر داده‌ها، تجزیه به مولفه‌های اصلی برای ماتریس صفات کمی انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه

معنی‌دار شده‌اند. همان طور که در جدول ۷ و ۸ مشاهده می‌شود ضرایب همبستگی کوچک هم در سطح ۱٪ معنی‌دار شده‌اند که نمی‌توان آن را وجود رابطه دو صفت مربوطه تلقی کرد و ارزش بیولوژیکی ندارد. در واقع به دلیل تعداد نمونه زیاد، ضرایب همبستگی کوچک هم

### جدول ۷- ضرایب همبستگی صفات کمی در اکو تیپ های جو بومی مناطق گرم و خشک با استفاده از روش پیرسون

Table 7. Correlation coefficients of quantitative traits in barley ecotypes of arid and semi-arid regions based on Pearson method

Traits	صفات	ارتفاع بوته	روز تا گلدهی Days to flowering	ارتفاع بوته Plant height	روز تا رسیدن Days to maturity	طول سنبله Spike length	تعداد سنبچه در سنبله Number of spiklet groups per spike	عملکرد دانه Grain yield
Plant hight		0.073						
Days to maturity		0.172**	-0.252**					
Spike length		-0.053	0.187**	-0.009				
Number of spiklet groups per spike	تعداد سنبچه در سنبله	0.082	-0.133*	0.397**	0.526**			
Grain yield	عملکرد دانه (گرم در کرت)	0.136*	0.068	0.434**	0.071	0.288**		
100-Kernal weight	وزن صد دانه (گرم)	0.174**	0.098	0/279**	0.117	0.487**	0.331**	

\* و \*\*: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

### جدول ۸- ضرایب همبستگی صفات کیفی در اکوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک با استفاده از روش اسپیرمن

Table 8. Correlation coefficients of qualitative traits in barley ecotypes of arid and semi-arid regions based on Spearman method

Traits	صفات	GRH	SPN	STP	KEC	AUP	RN	AWC	LET	LEC	GRC	رنگ دانه
		تراکم سنبله	عادت رشدی	تراکم ساقه	رنگ ساقه	پوشش دانه	رنگ گوشوارک	تعداد ردیف	رنگ ریشک	نوع لما		رنگ لما
SPN	تراکم سنبله	0.032										
STP	رنگ ساقه	0.025	0.042									
KEC	پوشش دانه	0.033	-0.014	0.026								
AUP	رنگ گوشوارک	0.099	-0.100	0.134*	0.018							
RN	تعداد ردیف	-0.118	0.362**	0.087	-0.024	-0.111						
AWC	رنگ ریشک	-0.058	-0.006	0.243**	0.033	-0.102	0.114					
LET	نوع لما	-0.035	0.019	-0.067	0.034	-0.144*	0.091	0.014				
LEC	رنگ لما	-0.039	-0.058	0.262**	0.031	-0.086	0.098	0.676**	0.041			
GRC	رنگ دانه	-0.090	-0.058	0.280**	0.053	-0.054	0.097	0.580**	-0.139*	0.596**		
GLC	رنگ گلوم	-0.165**	-0.042	0.051	-0.004	0.024	0.053	0.239**	0.000	0.271**	0.223**	

\* و \*\*: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۷.۵ و ۱٪.

\* and \*\*: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

برای اختصارات به جدول ۱ مراجعه شود.

For abbreviations see Table 1.

نمودار بای‌پلات مولفه‌های اصلی اول و دوم براساس صفات کمی مورفو‌تیپ‌های جو (شکل ۳)، به وضوح مورفو‌تیپ‌های دو ردیفه و شش ردیفه را تمایز کرد. صفات مورفو‌لوژی سنبله شامل طول سنبله و تعداد سنبلاچه در سنبله، وجه تمایز این دو زیر‌گونه بود که در اکو‌تیپ‌های دو ردیفه دارای کمیت بالاتری بود و این امر عملکرد دانه کمی بالاتر را در اکو‌تیپ‌های اخیر توجیه کرد. سایر صفات در میان هر دو تیپ شرایط یکسانی را نشان دادند. در شکل ۳ ارتباط نزدیک صفات روز تا رسیدن، عملکرد دانه و وزن صد دانه قابل مشاهده است (Ceccarelli and Mekni, 1985, Lasa *et al.*, 2001).


با استفاده در داده‌های مربوط به ارزیابی مورفو‌تیپ‌ها از نظر صفات مورفو‌لوژیکی، فنولوژیکی و آگرونومیکی تجزیه خوش‌های انجام شد که نتایج آن در شکل ۴ آمده است. خط برش فرضی در فاصله ۵ واحد موجب دسته‌بندی مورفو‌تیپ‌ها در چهار گروه شد. بررسی میانگین صفات مورد ارزیابی در مورفو‌تیپ‌های جو موجود در هر گروه (جدول ۱۰) نشان داد که گروه‌ها از نظر صفات کیفی ریشک‌لما و خارداری ریشک تفاوتی نشان ندادند.

گروه اول در نمودار تجزیه خوش‌های شامل مورفو‌تیپ‌های بومی پنج استان سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، فارس و کرمان بود. اکو‌تیپ‌های موجود در این گروه دارای بیشترین

به مولفه‌ها در جدول ۹ نشان داده شده است. سه فاکتور که مقادیر ویژه بزرگ‌تر از ۱ داشتند. در تشکیل ماتریس ضرایب شرکت کردند که در مجموع ۶۷/۱۴۱ درصد از واریانس صفات را توجیه کردند. مولفه اول و دوم در مجموع ۵۱/۲۳ درصد از واریانس را توجیه می‌کرد (شکل ۳). مولفه اول ۳۱/۵۶٪ از تغییرات مشاهده شده را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین ضرایب آن‌ها مربوط به صفات آگرونومیک تعداد سنبلاچه در سنبله (۰/۵۴۳) و وزن صد دانه (۰/۴۲۰) بود (جدول ۹) این امر نشان‌دهنده اهمیت ویژه و در عین حال ارتباط نزدیک این دو صفت است و در نتایج بررسی اکو‌تیپ‌ها در سایر کشورها نیز گزارش شده است (Lasa *et al.*, 2001). حدود ۱۹/۶۷٪ از واریانس مشاهده شده توسط مولفه دوم ایجاد شده بود و صفات مورفو‌لوژیک طول سنبله و فنولوژیک تعداد روز تا رسیدن با مقادیر ویژه به ترتیب ۰/۵۴۹ و ۰/۴۵۶ در این مولفه نقش مهمی داشتند. بزرگ‌ترین ضرایب مربوط به مولفه سوم صفت ارتفاع بوته بود (۰/۸۳۸) و این مولفه ۱۳/۹۷٪ از واریانس را به خود اختصاص داده بود. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که مولفه اول شامل صفات آگرونومیک مورفو‌تیپ‌های جو بود و بیشترین واریانس را این صفات ایجاد کردند. مولفه‌های دوم و سوم صفات فنولوژیک و مورفو‌لوژیک بودند که اهمیت کمتری نسبت به صفات آگرونومیک داشتند.

جدول ۹- مقادیر ویژه، واریانس نسبی و ضرایب متغیرها برای سه مولفه اصلی در مورفوتیپ‌های جو  
Table 9. Principal component analysis of traits in barley morphotypes of arid and semi-arid regions

Traits	صفات	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Days to flowering	روز تا گلدهی	0.136685	0.341313	0.0628904
Plant hight	ارتفاع بوته	0.116926	0.240602	0.838488
Days to maturity	روز تا رسیدن	0.358804	0.456679	0.007851
Spike length	طول سنبله	0.327129	0.549559	0.146194
Number of spiklet groups per spike	تعداد سنبله‌چه در سنبله	0.542739	0.142028	0.056466
Grain yield	عملکرد	0.350227	0.303249	0.436798
100-Kernal weight	وزن صد دانه	0.420015	0.162453	0.0560536
Eigen values	مقادیر ویژه	2.52483	1.57371	1.11767
% of Total variance	واریانس نسبی	31.560	19.671	13.971



شکل ۳- نمودار بای‌پلات دو مولفه اصلی برای صفات کمی مورفوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک

Fig. 3. Biplot of the first two principal components for quantitative characters of barley morphotypes

بود (۱۷۶ روز). این گروه با بالاترین میانگین صفت روز تا رسیدن، دیررس‌ترین اکوتیپ‌ها را

میانگین طول دوره رویشی بودند و تعداد روز تا گلدهی در این گروه بیشتر از سایر گروه‌ها

**جدول ۱۰- میانگین صفات مورفو تیپ های جو در چهار گروه کلاستر**  
**Table 10. Traits mean in four cluster groups**


Traits	صفات	گروه			
		1	2	3	4
DF	روز تا گلدهی	176.09	175.0	175.24	173.25
GRH	عادت رشدی	5.66	6.0	5.36	5.79
SPN	تراکم سنبله	4.77	4.6	4.73	4.79
PH	ارتفاع بوته	79/86	84.5	84.72	86.06
STP	رنگ ساقه	1.05	1.0	1.19	1.38
LOH	خارداری ریشک	7.00	7.0	7.00	7.00
LB	ریشک لما	3.00	3.0	3.00	3.00
KEC	پوشش دانه	2.98	3.0	3.00	3.00
AUP	رنگ گوشوارک	1.12	1.0	1.15	1.25
DM	روز تا رسیدن	207.73	207.2	205.89	203.88
RON	تعداد ردیف	5.40	5.0	5.50	5.17
SPL	طول سنبله	6.44	7.4	6.50	7.01
NSG	تعداد سنبله در سنبله	19.63	21.2	17.83	20.38
AWC	رنگ ریشک	2.04	2.5	2.34	2.17
LET	نوع لما	1.51	1.5	1.41	1.21
LEC	رنگ لما	1.09	2.2	1.59	1.38
GRC	رنگ دانه	1.19	2.2	2.14	1.92
GLC	رنگ گلوم	2.03	2.5	2.1	1.92
Y	عملکرد	463.52	530.8	403.08	345.24
100KW	وزن صد دانه	5.55	5.8	5.22	5.31

برای اختصارات به جدول ۱ مراجعه شود.

For abbreviations see Table 1.

مورفو تیپ های استان مرکزی می شود اکو تیپ های جمع آوری شده از این استان دارای کمترین میانگین تراکم سنبله و بیشترین میانگین طول سنبله (۷/۴۳ سانتی متر) بودند. این مورفو تیپ ها دارای بیشترین میانگین تعداد سنبله در سنبله (۲۱ عدد) بودند و بیشترین میانگین وزن صد دانه (۵/۸۳) و عملکرد دانه

شامل می شد، در عین حال اکو تیپ های این گروه کمترین میانگین ارتفاع بوته را داشتند (۷۶/۸۶) که با توجه به همبستگی منفی و معنی دار این دو صفت (ارتفاع بوته و روز تا رسیدن) در جدول ۶ قابل توجیه است. میانگین طول سنبله در این گروه کمتر از سایر گروه ها بود (۶/۴۴ سانتی متر). گروه دوم شامل



شکل ۴ - تجزیه خوشای مورفوتیپ‌های جو بر اساس صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و آگرونومیکی  
Fig. 4. Cluster analysis of barley morphotypes based on morphologic, phenologic and agronomic traits

بررسی صفات آگرونومیک، مورفولوژیکی و فنولوژیکی در ۲۷۸ مورفوتیپ مورد بررسی از کلکسیون جو اهلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در این آزمایش، نشان‌دهنده این امر بود که دامنه تنوع در صفات مختلف، متفاوت است. در برخی از صفات کیفی تنوع اندکی ملاحظه شد اما اکثر صفات مورد بررسی از تنوع نسبتاً بالایی برخوردار بودند. این نتیجه با نتایج تحقیقات محققین قبلی که در این زمینه مطالعاتی انجام داده‌اند همانگی دارد (Negasa, 1985؛ Backes, 2009؛ Shafaoddin, 2002 Zakova and Benkova, 2004 پارامتر ضریب تغییرات در میان صفات کمی، بیشترین تنوع در صفات عملکرد، تعداد سنبلاچه در سنبله و ارتفاع بوته ملاحظه می‌شد و نشان می‌دهد مورفوتیپ‌های مورد بررسی در صفات کمی، تظاهر متفاوتی داشته‌اند و بر اساس شاخص شانون عادت رشدی، رنگ گلوم و رنگ ریشک دارای بیشترین تنوع در صفات

(۵۳۰/۸۱) در این مورفوتیپ‌ها مشاهده می‌شد. مورفوتیپ‌های جمع‌آوری شده از دو استان بوشهر و خراسان در گروه سوم قرار گرفتند. میانگین طول سنبله در این گروه نسبتاً پایین (۶/۵ سانتی‌متر) بود و با حدود ۱۷ سنبلاچه در سنبله کمترین میانگین این صفت را داشتند. اعضای این گروه با میانگین وزن صد دانه ۵/۲۲ گرم، کمترین میانگین وزن صد دانه را داشتند.

گروه چهارم شامل مورفوتیپ‌هایی بومی استان‌های هرمزگان و خوزستان بود. این مورفوتیپ‌ها دارای کمترین میانگین تعداد روز تا گلدهی در میان مورفوتیپ‌های مورد بررسی بودند، همچنین با کمترین تعداد روز تا رسیدن، زودرس‌ترین گروه محسوب شدند. در این مورفوتیپ‌ها تراکم سنبله بیشتر از سایر گروه‌ها بود. این گروه با عملکرد دانه ۳۴۵/۲۴ گرم در سطح، پایین‌ترین میانگین را در میان چهار گروه داشت.

قابل استفاده بودن آن در ارزیابی تنوع در میان نمونه ها است (Al Khanjari *et al.*, 2008). اخیراً از دست رفتن تنوع ژنتیکی در بسیاری از گیاهان زراعی توجه جهانی را به زیستگاه های طبیعی گیاهان که ژن های اولیه در آن به وجود آمده اند، جلب کرده است. با توجه به نتایج این بررسی به نظر می رسد توده های بومی جو ایران دارای ژن های ارزشمندی برای صفات مطلوب زراعی و احتمالاً مقاومت به تنش های زنده و غیرزنده باشند.

کیفی بودند. در اکو تیپ های بومی مناطق گرم و خشک صفت خارداری ریشک تنوعی نشان نداد و همه نمونه ها دارای ریشک خاردار بودند و به نظر می رسد این ویژگی عامل سازگاری بیشتر آن ها با اقلیم گرم و خشک باشد. صفات تعداد سنبلاچه در سنبله همبستگی مثبت و معنی دار با صفات وزن صد دانه و عملکرد دانه نشان داد که با نتایج تحقیقات قبلی مشابه داشت (Shafaoddin, 2002). و اهمیت این صفت را در تعیین عملکرد جو نشان داد (Jaradat *et al.*, 2004).

### سپاسگزاری

از همکاری و مساعدت مسئولین موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و همکاران بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی که به نحوی در انجام این تحقیق نگارندگان را یاری دادند، سپاسگزاری می شود.

ارزیابی بیست صفت، شامل هفت صفت کمی و سیزده صفت کیفی در نمونه های جو بومی مورد بررسی در این آزمایش، نشان دهنده وجود تنوع مورفولوژیکی گسترده در کلکسیون ژرم پلاسم جو بانک ژن گیاهی ملی ایران است و تنوع وسیع در صفات مورفولوژیکی نمونه ها نشان دهنده کاربردی بودن این صفات ساده و

### References

- Al Khanjari, S., Afilatenko, A., and Hammer, K. 2008.** Morphological spike diversity of Omani wheat. *Genetic Resources and Crop Evolution* 55 (8): 1185-1195.
- Anonymous, 1994.** Descriptor for barley (*Hordeum vulgare* L.). International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome, Italy.
- Backes, G., Orabi, J., and Woldoy, A. 2009.** High genetic diversity revealed in barley (*Hordeum vulgare*) collected from small scale farmers fields in Eritrea. *Genetic Resources and Crop Evolution* 56 (1): 85-97.
- Behnia, M. 1994.** Cool Season Cereals. Tehran University Publications Tehran, Iran (in Persian).

- Brush, S. B. 1995.** *In situ* conservation of landraces in center of crop diversity. *Crop Science* 35: 346-354.
- Ceccarelli, S., Grando, S., Shevtsov, V., Vivar, H., Yahyaoui, A., El- Bhoussini, M., and Baum, M. 1999.** The ICARDA strategy for global barley improvement. *Rachis* 18 (2): 3-13.
- Ceccarelli, S., and Mekni, M. S. 1985.** ICARDA, Aleppo (Syria) Barley breeding for areas receiving less than 250 mm annual rainfall. *Rachis* 4 (2): 3-9.
- Ellis, R. P., Forster, B. P., Robinson, D., Handley, L. L., Gordon, D. C., Russel, J. R., and Powell, W. 1999.** Wild barley: a source of genes for crop improvement in the 21<sup>st</sup> century? *Journal of Experimental Botany* 51: 9-17.
- Haussmann, B. I. G., Parzies, H. K., Presterl, T., Susic, Z., and Miedaner, T. 2004.** Plant genetic resources in crop improvement. *Plant Genetic Resources* 2 (1): 3-21.
- Jaradat, A. A., Shahidb, M., and Al Maskric, A. Y. 2004.** Genetic diversity in the Batini barley landrace from Oman I. Spike and seed quantitative and qualitative traits. *Crop Science* 44: 304-315.
- Jilal, A., Grando, S., Henry, R. J., Sladelee, L., Rice, N., Hill, H., Baum, M., and Ceccarelli, S. 2008.** Genetic diversity of ICARDA's world wide barley landrace collection. *Genetic Resources and Crop Evolution* 55: 1221-1230.
- Koocheki, A. 1998.** Production and Improvement of Crops for Dryland. Jahad-e-Daneshgahi Mashhad Publications, Mashhad, Iran (in Persian).
- Lasa, J. M., Igartua, E., Ciudad, F. J., Codesal, P., Gacia, E. V., Gacia, M. P., Medina, B., Romagosa, I., Molina-Cano, J. L., and Monoya, J. L. 2001.** Morphological and agronomical diversity patterns in the Spanish barley core collection. *Hereditas* 135: 217-225.
- Negassa, M. 1985.** Patterns of phenotypic diversity in an Ethiopian barley collection and the Arussi-Bale high land as a center of origin of barley. *Hereditas* 102: 139-150.
- Pickering, R., and Johnston, P. A. 2005.** Recent progress in barley improvement using wild species of *Hordeum*. *Cytogenetic Genome Research* 109: 344-349.
- Rajabi, A., Moghadam, M., Rahim Zadeh, F., Mesbah, M., and Rangi, D. 2002.** Evaluation of genetic diversity in sugar beet accessions for agronomic and qualitative traits. *Iranian Journal of Agricultural Science* 33 (3): 553-567. (in

Persian).

- Roudbarkalary, F., Farshdfar, E., and Ghareyazy, B. 2001.** Evaluation of genetic diversity in Iranian rice based on RAPD. *Iranian Journal of Agricultural Science* 32: 8-15.
- Shafaoddin, S. 2002.** Evaluation of genetic and geographic diversity in barley germplasm in North of Iran based on agronomical and morphological traits. *Iranian Journal of Agricultural Sciences* 33: 569-581. (in Persian).
- Shannon, C. E., and Weaver, W. 1949.** *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press, Urbana, IL, USA.
- Zakova, M., and Benkova, M. 2004.** Genetic diversity of genetic resources of winter barley maintained in the gene bank in Slovakia. *Genetics and Plant Breeding* 40 (4): 118-126.