

شناسایی و پراکنش فیتوپلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر

مرضیه مکارمی؛ جلیل سبک آرا و طاهره کفаш محمدجانی

marziyeh_makaremi@yahoo.com

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی صندوق پستی: ۶۶

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۴ تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۸۳

چکیده

این تحقیق طی دو سال نمونه برداری پلانکتونی از تیر ماه سال ۱۳۷۶ تا تیر ماه سال ۱۳۷۸ از استگاه مطالعاتی از مناطق مختلف تالاب انزلی (شیجان، سیاکیشیم، روگاه، آبکنار و هندبالله) انجام پذیرفت. در مجموع ۹ شاخه، ۱۳۴ جنس و ۲۷۸ گونه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. ازین گونه های شناسایی شده ۵۶ جنس و ۱۰۷ گونه مریبوط به شاخه *Bacillariophyta* (Diatoms)، *Chlorophyta*، *Xanthophyta*، *Chrysophyta*، *Euglenophyta*، *Pyrrophyta*، *Cyanophyta* و *Cryptophyta*، ۱۸ جنس و ۳۲ گونه مریبوط به شاخه *Rhodophyta* تعلق داشتند.

مطالعات نشان دادند که شاخه های سیانوفیتا و دیاتومه ها غالب ترین گونه های فیتوپلانکتونی و مناطق آبکنار (تالاب غرب) و هندبالله جنوبی، غنی ترین مناطق فیتوپلانکتونی از نظر تسوء و تراکم هستند. بیشترین فراوانی سیانوفیتا در فصل تابستان و در منطقه آبکنار بود که گونه های غالب این شاخه عبارتند از:

Microcystis aeruginosa و *Oscillatoria limosa*, *Anabaenopsis raciborskii* بیشتر فصول سال و در تمامی مناطق تالاب انزلی مشاهده شده اما در اوخر پاییز، زمستان و بهار تنوع بیشتری دارد. گونه های غالب این شاخه عبارت از *Nitzschia ulna*، *Cyclotella meneghiniana* و *Synedra ulna* بیشتر در مناطق شیجان و سیاکیشیم بوده همچنین گونه *Rhizosolenia calcar-avis* در نواحی ساحلی دریای خزر و نواحی مصبی و در فصل تابستان غالیبت دارد. از شاخه کلروفیتا گونه های مختلف از جنس *Scenedesmus* بیشتر در فصل بهار، از شاخه او گلنوفیتا، گونه های *Euglena acus* و *Terachelomonas armata* بیشتر در مناطق شیجان و سیاکیشیم در فصول بهار و تابستان، از شاخه پیرووفیتا گونه *Gymnodinium coronatum* در فصل تابستان و بیشتر در مناطق آبکنار و هندبالله، همچنین گونه *Exuviaella cordata* بیشتر در مصب و نواحی ساحلی دریای خزر و در فصل پاییز غالیبت داشتند.

لغات کلیدی: فیتوپلانکتون، تالاب انزلی، دریای خزر، ایران

مقدمه

مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خداپرست (۱۳۷۸) در پژوهه‌های توان باروری، هیدرولوژی و هیدروبیولوژی تالاب انزلی (طی سالهای ۷۵ - ۱۳۷۱) با همکاری بخش بیولوژی، ضمن استفاده از تجربیات گذشته، بررسیها را با ابعاد وسیع تر و جامع تری انجام داد که این مطالعات بصورت مستمر تاکنون نیز ادامه دارد. در اکثر این مطالعات شناسایی فیتوپلانکتونی در حد جنس بوده و بیشتر جمعیت آنها در مناطق مختلف تالاب انزلی بررسی شده است. لازم بذکر است که در سالهای گذشته پژوهه‌های دانشجویی زیادی نیز در راستای مطالعات پلانکتونی در تالاب انزلی انجام گرفته از جمله آنها، رمضانپور (۱۳۷۳)، به بررسی اکولوژیک فیتوپلانکتونهای تالاب انزلی و اثرات بالا آمدن آب دریا بر روی آنها پرداخته است. این مطالعات نشان داده‌اند اکثریت فیتوپلانکتونهای تالاب انزلی از باسیلاریوفیتا (دیاتومه‌ها) و سیانوفیتا تشکیل شده که نقش عمده‌ای در تولیدات اولیه در اکوسیستم تالاب انزلی داشته که متأثر از شرایط محیطی تالاب است. با توجه به نقش و اهمیت فیتوپلانکتونها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستمهای و نبودن منابع فارسی در این زمینه، ضرورت بررسی و شناسایی گونه و تهییه اطلس رنگی از گروههای فیتوپلانکتونی تالاب انزلی، منظور این پژوهش بوده است.


مواد و روش کار

با توجه به موقعیت تالاب انزلی ۲۷ ایستگاه مطالعاتی در مناطق مختلف تالاب شیجان، سیاکیشیم، آبکنار، هندخاله و روگاهها تعیین و نمونه‌برداری بطور ماهانه از تاریخ ۷۶/۴/۱۵ شروع و در تاریخ ۷۸/۴/۱۵ خاتمه یافت. اسمی و موقعیت ایستگاههای مطالعاتی در شکل ۱ آورده شده است.

تالاب انزلی دارای چهار حوضه متمایز به نامهای آبکنار، هندخاله، شیجان و سیاکیشیم می‌باشد. مقدار ذخیره آب و عمق آبکنار از سایر مناطق بیشتر، همچنین از نظر تنوع و تراکم پلانکتونی نیز بسیار غنی می‌باشد. از ویژگیهای مهم این تالاب قرار گرفتن بین دو اکوسیستم خشکی و دریا، همچنین آب شیرین و لب شور است. به این دلیل دارای شرایط ویژه‌ای است و جوامع متعدد گیاهی و جانوری را در خود جای داده که از نظر اکولوژیک با آن سازگاری یافته‌اند. در سالهای اخیر افزایش سطح آب دریای خزر سبب افزایش حجم و عمق تالاب شده و بیشتر اثرات مثبت فعل و انفعالات زیستی را از نظر استفاده از چرخه غذایی در این اکوسیستم فراهم آورده است.

تحقیقات پلانکتونی تالاب انزلی سابقه‌ای طولانی دارد. کیمبال و کیمبال (۱۳۵۳) از بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که زیاد شدن مواد مغذی بر روی غلظت یونی آب تالاب تأثیر داشته و باعث افزایش جمعیت گیاهان آبی شده که در نتیجه آن رشد فیتوپلانکتونها محدود می‌گردد. ولادیمیرسکایا و کوراشوا (۱۳۵۷) نیز حدود ۲ ماه تالاب انزلی را مورد بررسی قرار دادند که مطالعه پلانکتونی بخشی از کارهای آنها را تشکیل می‌داد، اما این بررسیها بسیار ابتدایی و نامنظم و در یک زمان محدود انجام گرفت که نمی‌توانست نشانگر تغییرات فصلی باشد. بمنظور تکمیل بررسیها و تطبیق آن با نتایج گذشته و مشاهده تغییرات بوجود آمده، مهندسین مشاور یکم (۱۳۶۷) در تابستان اقدام به نمونه‌برداری از مناطق مختلف تالاب نمودند که تداوم چندانی نداشته است. این بررسیها نشان داد که شاخه دیاتومه‌ها بیشترین گروه فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی بوده و این تراکم در مناطق مرکزی و غربی یکسان نیست.

Holcik & Olah, 1992 طی پژوهه مشترک فائو با مرکز تحقیقات شیلات گیلان مطالعاتی بر روی ۴ منطقه تالاب انزلی انجام دادند (طی سالهای ۷۰ - ۱۳۶۸)، که پردازش و جمعیت پلانکتونها در این مناطق و فصول



شکل ۱: تالاب آزیزی و ایستگاههای نمونهبرداری پلانکتونی در مناطق مختلف آن

باقیمانده نمونه‌ها با فرمالین ۴ درصد ثبتیت و مجدد مورد مشاهده و مطالعه قرار گرفتند.

American Public برای نمونهبرداری از منابع Boney, 1989 و Health Association, 1989 شناسایی از پژوهش‌های اوکسنر، ۱۹۷۵؛ پیروشکینا و ماکارووا، ۱۹۶۸؛ رحیمیان، ۱۳۵۷؛ دیارکیان مهر، ۱۳۷۱؛ زالبینا و همکاران، ۱۹۵۱؛ کورشیکف، ۱۹۵۳؛ کسیلف، ۱۹۵۰؛ کسیلف، ۱۹۵۳؛ کورسانف و همکاران، ۱۹۵۳؛ Bellinger, 1986 ; Fott, 1971 ; Heurck, 1962 Maosen, ; Edmondson , 1959 ; Frantisek , 1984 Presscot, 1962;Krammer & Bertalot, 1988;1983 ;Huber pastalozzi, 1962;Tiffany & Britton,1971 Minelli, ;Pankow *et al.*, 1971 ; Presscot, 1976 ۱۹۹۴ استفاده گردید.

نتایج

در تحقیق انجام شده جهت تهیه اطلس رنگی پلانکتونهای تالاب آزیزی در بخش فیتوپلانکتون، در مجموع ۹ شاخه و ۱۳۴ جنس و ۲۷۸ گونه فیتوپلانکتونی شناسایی

علاوه بر ایستگاههای تعیین شده در هر منطقه نیز یک نمونه کششی با تور پلانکتون جهت جمع‌آوری نمونه‌های کمیاب برداشته می‌شد. با توجه به عمق متوسط تالاب آزیزی، روش نمونهبرداری با تیوب (لوله) در نظر گرفته شد. طول لوله حدود ۲/۵ متر و قطر آن ۶ سانتیمتر که در هر ایستگاه آنرا بطور عمودی وارد آب کرده و انتهای آنرا با کف دست مسدود و محتویات آنرا بداخل سطلي تخلیه و بطور مستقيم و بدون عبور از سور رزپلانکتون، ۲ لیتر آب جهت بررسی فیتوپلانکتونی در ظرف نمونهبرداری ریخته و بطور زنده به آزمایشگاه منتقل و بعد از همگن‌سازی توسط دهانه گشاد پیپت جهت بررسی کیفی به محفظه‌های شمارش منتقل و بعد از مشاهده و شناسایی گونه‌ای با میکروسکوپ اینسورت، توسط پیپت پاستور از محفظه شمارش جداسازی و شستشو شده، در نهایت گونه شناسایی شده بر روی لام منتقل و از زوایای مختلف از آن توسط فتو میکروسکوپ عکسبرداری گردید. اطلاعات سیستماتیک و مورفو‌لوجیک گونه‌ها از روی کلیدهای شناسایی و مشاهدات و مشخصات ظاهری نمونه تهیه شدند. بعد از بررسی ۱۰ محفظه از هر ایستگاه،

مربوط به شاخه Pyrophyta. یک جنس و دو گونه مربوط به شاخه Cryptophyta. ۱۸ جنس و ۳۲ گونه مربوط به شاخه Cyanophyta و یک جنس و یک گونه نیز از شاخه Rhodophyta شناسایی گردید. فیتوپلانکتونهای تالاب انزلی و روگاهای آن و نواحی ساحلی دریای خزر در فهرست زیر رده‌بندی شده‌اند.

Kingdom plantae

1 - Phylum Chlorophyta شاخه جلبکهای سبز

Class Chlorophyceae

Order Volvocales

Family Chlamydomonadaceae

- Chlamydomonas* Ehrenberg, 1833
- Chlamydomonas* sp.
- Carteria* Diesing, 1866
- Carteria* sp.
- Tetraselmis (Platymonas)* G.S. West
- Tetraselmis* sp.

Family Phacotaceae

- Pteromonas aculeata* Lemmermann

Family Volvocaceae

- Gonium pectorale* Mueller, 1773
- Pandorina morum* (Mueller) Bory, 1824
- Pandorina morum* var. *Major* Jyengar
- Eudorina elegans* Ehrenberg, 1832
- Pleodorina californica* Shaw, 1894
- Volvox aureus* Ehrenberg, 1832
- Volvox globator* Linnaeus, 1758

Order Ulotrichales

Family Ulothriaceae

- Ulothrix* Kuetzing, 1833
- Ulothrix* sp.
- Radiofilum conjunctivum* Schmidle, 1894
- Binuclearia lauterbornii* (Schmidle, 1903) Proschkina - Lavrenko, 1966

Family Chaetophoraceae

- Stigeoclonium* Kuetzing, 1843
- Stigeoclonium* sp.
- Draparnaldia plumosa* (Vaucher) C.A. Agardh

Order Chlorococcales

Family Chlorococcaceae

- Desmatostratum indutum* (Geitler) Pascher

Family Micractiniaceae

- Golenkinia radiata* (Chod.) Wille, 1911
- Micractinium pusillum* Fresenius, 1858

Family Characiaceae

- Schroederia setigera* (Schroeder) Lemmermann, 1898

شدند که از این میان ۵۶ جنس و ۱۰۷ گونه مربوط به شاخه Chlorophyta. ۳۹ جنس و ۸۷ گونه مربوط به شاخه Bacillariophyta (Diatoms) ۲ جنس و ۲ گونه مربوط به شاخه Xanthophyta. ۴ جنس و ۴ گونه مربوط به شاخه Chrysophyta. ۶ جنس و ۳۴ گونه مربوط به شاخه Euglenophyta. ۷ جنس و ۹ گونه مربوط به شاخه

Schroederia robusta Korschik*Schroederia spiralis* (Printz) Korschik(syn. *Ankistrodesmus Nitzschiooides* var. *Spiralis*) (Printz)**Family Hydrodictyaceae***Hydrodictyon reticulatum* (Linnaeus) Lagerheim, 1883*Pediastrum simplex* (meyen) Lemmermann, 1897*Pediastrum simplex* var. *duodenarium* (Bailey) Rabenhorst, 1868*Pediastrum duplex* Meyen, 1829*Pediastrum boryanum* (Turpin) Meneghini, 1840*Pediastrum tetras* (Ehrenberg) Ralf, 1844*Pediastrum tetras* var. *tetraodon* (Corda) Hansgirg*Pediastrum integrum* Naegeli, 1849**Family Coelastraceae***Coelastrum microporum* Naegeli in A. Branun, 1855*Coelastrum sphaericum* Naegeli, 1849**Family Oocystaceae***Ankistrodesmus falcatus* (Corda) Ralfs, 1848*Ankistrodesmus falcatus* var. *acicularis* (A. Braun) G. S. West, 1904*Ankistrodesmus convolutus* Corda, 1839*Ankistrodesmus densus* Korschikov, 1953*Closteriopsis longissima* Lemmermann, 1899(syn. *Ankistrodesmus longissimus*) (Lemm.) Wille*Chlorella vulgaris* Beyernick, 1890*Dictyosphaerium ehrenbergianum* Naegeli, 1849*Dictyosphaerium pulchellum* Wood, 1872*Dimorphococcus lunatus* A. Braun, 1855*Gloeotaenium loitlesbergerianum* Hansgirg, 1890*Kirchneriella lunaris* (Kirchner) Moebius, 1894*Kirchneriella obesa* (W. West) Schmidle, 1893*Polyedriopsis spinulosa* Schmidle*Siderocystopsis fusca* (Korsikov) Swale, 1964*Franceia* Lemmermann, 1898*Franceia* sp.*Lagerheimia* (DeToni) Chodat, 1895(syn. *Chodatella*) Lemmermann, 1898*Lagerheimia genevensis* (Chodat, 1859)*Lagerheimia wratislaviensis* Lemmermann, 1900(syn. *Chodatella budapestinensis*) Hortobagyi, 1973*Oocystis lacustris* Chodat, 1897*Selenastrum bibraianum* Reinsch, 1867*Tetraedron minimum* (A. Braun) Hansgirg, 1888*Tetraedron caudatum* (Corda) Hansgirg, 1888*Tetraedron triangulare* Kroschikof, 1917*Tetraedron muticum* (A. Braun) Hansgirg, 1888*Tetraedron gracile* (Reinsch) Hansgirg, 1889*Tetraedron regulare* (Kuetzing, 1845)*Tetraedron limneticum* Borge, 1900*Tetraedron lobulatum* (Naeg.) Hansgrig, 1888*Tetraedron planctonicum* (G. M. Smith)*Radiococcus nimbatus* (de. Wildermann) Schmidle*Trebularia crassispina* G.M. Smith

Treubaria triappendiculata Bernard

Family Scenedesmaceae

Actinastrum hantzschii var. *fluviatile* Schroeder

Crusigenia tetrapedia (Kirchner, 1880) W & G.S. West, 1902

Crucigenia lauterbornei Schmidle, 1901

Crucigenia rectangularis (Naegeli) Gay, 1891

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat

Scenedesmus acuminatus var. *biseriatus* Reinsch

Scenedesmus acuminatus var. *elongatus* G.M. Smith

Scenedesmus denticulatus Lagerheim

Scenedesmus naegelii Brebisson, 1856

(syn. *Scenedesmus oahuensis*) Hortobagyi, 1971

Scenedesmus bijugatus (Lemmermann, 1898) Vodenigarov, 1960

Scenedesmus ellipticus Chodat, 1926

Scenedesmus communis Hegewald, 1977

(syn. *Scenedesmus quadricauda*) Chodat, 1926

Scenedesmus opoliensis Richter 1895

Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutzing, 1833

Scenedesmus quadrispina Chodat, 1926

Scenedesmus obtusus Meyen, 1829

Scenedesmus arcuatus Lemmermann, 1899

Scenedesmus arcuatus var. *gracilis* (Hortobagyi, 1943) Hindak, 1967

Scenedesmus arcuatus var. *platydiscus* (G.M. Smith) Chodat, 1926

Scenedesmus intermedius Chodat, 1926

Scenedesmus subspicatus Chodat, 1926

(syn. *Scenedesmus abondans*) G.M. Smith, 1916

Pseudodidymocystis planctonica (Korsikov) Hegewald & Deason, 1989

(syn. *Scenedesmus planctonica*) (Fott, 1973)

Tetrastrum staurogeniaeforme (Schroeder) Lemmermann

Tetrastrum heteracanthum Nordstedt, 1891

Order Zygnematales

Family Zygnemataceae

Mougeotia C.A. Agardh, 1824

Mougeotia sp.

Zygnema C.A. Agardh, 1824

Zygnema sp.

Spirogyra Link, 1820

Spirogyra sp.

Family Mesotaeniaceae

Gonatozygon brebissonii DeBary, 1856

Family Desmidiaceae

Closterium ehrenbergii Meneghini

Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg

Closterium acerosum (Schrank) Ehrenberg

Closterium parvulum Naegeli

Closterium gracile Brebisson

Closterium kuetzingii Brebisson

Penium spirostriolatum (Barker)

Penium margaritaceum (Ehrenberg) Brebisson

- Pleurotaenium trabecula* (Ehrenberg) Naegeli
Euastrum verrucosum (Ehrenberg)
Euastrum elegans Ehrenberg
Cosmarium pachydermum Lundell
Cosmarium reniforme (Ralfs) Archer
Cosmarium botrytis Meneghini
Cosmarium formosulum Hoffman
Micrasterias pinnatifida (Kutz.) Ralfs
Micrasterias crux - melitensis (Ehrenberg) Hass
Arthrodesmus (Ehrenberg, 1838)
Arthrodesmus sp.
Staurastrum margaritaceum (Ehrenberg) Menenghini
Staurastrum punctulatum Brebisson
Staurastrum oxyacanthum Archer
Staurastrum apiculatum Brebisson
Staurastrum tetracerum Ralfs
Staurastrum aculeatum Berbisson, 1910
Staurastrum furcatum Ralfs, 1948
Xanthidium antilopeum (Brebisson) Kuetzing
Hyalotheca dissiliens (J.E. Smith) Brebisson
Desmidium aptogonum Brebisson

2 - Phylum Bacillariophyta (Diatoms) شاخه دیاتومه‌ها

Class Bacillariophyceae

Order Centrales

Family Coscinodiscaceae

- Melosira varians* Agardh , 1817
Melosira granulata (Ehrenberg, 1843) Ralfs, 1816
Melosira moniliformis (O.F. Mueller, 1783) Agardh, 1824
Melosira arenaria (Moore)
Melosira undulata (Ehrenberg) Kuetzing
Sceletonema costatum (Greville 1866) Cleve, 1878
Coscinodiscus granii Gough , 1905
Coscinodiscus perforatus Ehrenberg, 1844
Cyclotella kuetzgiana Thwaites, 1848
Cyclotella meneghiniana Kuetzing, 1844
Stephanodiscus socialis Makapoba , 1964
Stephanodiscus astraea (Ehrenberg) Grunow
Stephanodiscus hantzschii Grunow, 1880
Thalassiosira caspica Makapoba , 1959
Thalassiosira variabilis (Makar, 1960)
Thalassiosira variabilis var. *fasciculata* Pr. - Lavr., 1960
Thalassiosira variabilis var. *variabilis* Makapoba, 1959

Family Eupodiscaceae

- Actinocyclus paradoxus* Makapoba , 1959

Suborder Rhizosolenineae

Family Rhizosoleniaceae

- Rhizosolenia fragilissima* Bergon, 1903
Rhizosolenia calcar - avis M. Schultze, 1858

Family Chaetoceraceae

- Chaetoceros subtilis* Cleve, 1896
Chaetoceros subtilis var *abnormis* Pr - Lavr., 1961
Chaetoceros wighamii Brightwell, 1856
Chaetoceros muelleri Lemmermann, 1898

Family Biddulphiaceae

- Biddulphia laevis* Ehrenberg, 1843
Attheya zachariasii Brunow, 1894

Order Pennales**Suborder Fragilarineae****Family Tabellariaceae**

- Tabellaria fenestrata* (Lyngbye) Kuetzing
Tabellaria flocculosa (Roth) Kuetzing

Family Diatomaceae

- Diatoma vulgare* Bory, 1828
Diatoma elongatum (Lyngbye, 1819)

Family Fragilariaeae

- Thalassionema nitzschiooides* Grunow (1880-1885)
Fragilaria capucina Desmazieres, 1825
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
Synedra ulna var. *danica* (Kuetzing) Grunow
Synedra capitata Ehrenberg

Family Eunotiaceae

- Eunotia bigibba* (Kuetzing)
Eunotia lunaris (Ehrenberg) Grunow

Suborder Achnanthineae**Family Achnanthaceae**

- Cocconeis placentula* Ehrenberg, 1838
Achnanthes trinodis Grunow
Achnanthes brevipes C.A. Agardh, 1824
Rhoicosphenia curvata (Kuetzing, 1834) Grunow, 1860

Suborder Naviculineae**Family Naviculaceae**

- Amphiprora alata* (Kuetzing)
Anomoeoneis sphaerophora (Kuetzing) Pfitzer, 1844
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
Caloneis amphisbaena (Bory, 1824) Cleve, 1894
Caloneis permagna (Bailey, 1851) Cleve, 1894
Diploneis interrupta (Cleve, 1894)
Tropidoneis lepidoptera (Grunow) Cleve, 1894
Navicula radiosa Kuetzing
Navicula cuspidata Kuetzing, 1844
Navicula pupula Kuetzing
Navicula oblonga Kuetzing
Navicula viridula Kuetzing, 1844
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Pinnularia nobilis Ehrenberg
Nedium iridis (Ehrenberg) Pfitzer

Nedium affine (Ehrenberg) Cleve
Nedium affine var. *hankense* (Skv.) Reim.
Nedium maximum (Cleve) Meist
Stauroneis phoenicentron (Nitzsch) Ehrenberg
Gyrosigma wormleyi (Sullivant) Boyer, 1860
Gyrosigma attenuatum (Kuetzing) Cleve
Gyrosigma hummii Hust, 1955

Family Gomphonemataceae

Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema geminatum (Lyngbye) C.A. Agardh

Family Cymbellaceae

Amphora ovalis Kuetzing, 1834
Amphora commutata Grunow, 1880
Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
Cymbella aspera (Ehrenberg) Cleve, 1895
Cymbella cistula (Hemprich) Grunow
Epithemia sorex Kuetzing, 1844
Epithemia turgida (Ehrenberg) Kuetzing
Rhopalodia gibba (Ehrenberg, 1843) O.F. Mueller, 1897

Suborder Surirellineae**Family Nitzschiaeae**

Nitzschia acicularis (Kuetzing) W. Smith
Nitzschia reversa W. Smith (1853-1856)
Nitzschia tryblionella Hantzsch, 1860
Nitzschia tryblionella var. *victoria* Grunow
Nitzschia tryblionella var. *maxima* Grunow
Nitzschia circumsuta (Bailey, 1851) Grunow, 1880
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch, 1817) W. Smith, 1853
Nitzschia seriata (Cleve)
Nitzschia Palea (Kuetzing) W. Smith
Nitzschia gracilis Hantzsch
Bacillaria paxillifer (O.F. Mueller, 1786) Hendey, 1951
Denticula Kuetzing, 1844 ; emend. Grunow, 1880
Denticula sp.

Family Surirellaceae

Campylodiscus clypeus Ehrenberg
Campylodiscus echeneis Ehrenberg
Cymatopleura elliptica (Brebisson) W. Smith
Cymatopleura solea (Brebisson) W. Smith
Surirella spiralis Kuetzing
Surirella biseriata Brebisson
Surirella elegans Ehrenberg, 1843
Surirella stritula Turpin, 1828
Surirella robusta Ehrenberg
Surirella ovata Kuetzing
Surirella capornii Brebisson in A. Schmidle 1874-1959

3 - Phylum Xanthophyta شاخه جلبکهای زرد - سبز**Class Xanthophyceae****Order Heterococcales****Family Botryococcaceae***Botryococcus* Kuetzing, 1849*Botryococcus sp.***Family Centritractaceae***Centritractus belanophorus* Lemmermann, 1900**4 - Phylum Chrysophyta شاخه جلبکهای طلایی - قهوه‌ای****Class Chrysophyceae****Order Chrysomonadales****Family Mallomonadaceae***Mallomonas acaroides* Perty, 1852**Family Synuraceae***Synura uvella* Ehrenberg, 1838**Family Ochromonadaceae***Dinobryon sertularia* Ehrenberg, 1838*Uroglena volvox* (Ehrenberg) Lemmermann, 1910**5 - Phylum Pyrrophyta شاخه پیروفیتا****Class Dinophyceae****Order Peridiniales****Family Glenodiniaceae***Glenodinium lenticula* (Bergh) Schiller, 1931**Family peridiniaceae***Peridinium bipes* (Stein)*Peridinium inconspicuum* Lemmermann, 1899**Family Ceratiaceae***Ceratium hirudinella* (Mueller) Dujardin, 1841*Ceratium cornutum* (Ehrenberg) Claparede & Lachmann**Order Gymnodiniales****Family Gymnodiniaceae***Gymnodinium* Stein, 1878*Gymnodinium sp.**Gymnodinium coronatum* Woloszynska, 1917**Order Dinococcales****Family Dinococcaceae***Cystodinium* Klebs, 1912*Cystodinium sp.***Class Desmophyceae****Order Prorocentrales****Family Prorocentraceae***Exuviaella cordata* Ostenfeld, 1901*Prorocentrum scutellum* Schroder, 1901

6 - Phylum Cryptophyta شاخه کریپتوفیتا**Class Cryptophyceae****Order Cryptomonadales****Family Cryptomonadaceae***Cryptomonas erosa* Ehrenberg, 1838*Cryptomonas ovata* Ehrenberg, 1838**7 - Phylum Euglenaophyta (Euglenoids)** شاخه اوگلنوفیتا**Class Euglenophyceae****Order Euglenales****Family Euglenaceae***Euglena spirogyra* Ehrenberg, 1838*Euglena grisoli* Deflandre, 1928*Euglena acus* Ehrenberg, 1838*Euglena oxyuris* Schmarda, 1944*Euglena tripteris* (Dujardin) Klebs, 1883*Euglena ehrenbergii* Klebs, 1883*Euglena spathirhyncha* Skuja, 1929*Euglena caudata* Huebner, 1936*Phacus longicauda* (Ehrenberg) Dujardin, 1841*Phacus longicauda* var. *langicauda* (Ehrenberg) Dujardin, 1841*Phacus longicauda* var. *major* Swirensko*Phacus longicauda* var. *tortus* Lemmermann*Phacus longicauda* var. *vix-tortus* Kisselew*Phacus orbicularis* Hubner, 1886(syn. *Phacus ovoidea*) Roll, 1925*Phacus suecicus* Lemmermann, 1913*Phacus megalopsis* Pochmann*Phacus angulatus* Pochmann (syn. *Ph.alata* var. *Indica* Skvortzow, 1937)*Phacus stokesii* Lemmermann*Phacus contortus* Bourrelly*Phacus arnoldii* Swirensko*Lepocinclus ovum* (Ehrenberg) Lemmermann, 1901*Lepociclis salina* Fritsch & Conrad, 1934*Lepocinclus nayali* Conrad, 1935*Lepocinclus longistriata* Chu.S.R., 1935*Lepocinclus acuta* Prescott, 1949*Trachelomonas armata* (Ehrenberg) Stein, 1883*Trachelomonas armata* var. *heterospina* Swirensko*Trachelomonas armata* var. *coronata* Deflandre*Trachelomonas armata* var. *armata* Ehrenberg*Trachelomonas armata* var. *steinii* Lemmermann, 1906*Trachelomonas hispida* (Perty) Stein, 1883*Trachelomonas hispida* var. *crenulatocollis* Deflandre, 1926*Trachelomonas hispida* var. *coronata* (Lemmermann) Deflandre, 1926*Trachelomonas hispida* var. *duplex* Deflandre*Trachelomona scabra* Playfair, 1915

- Trachelomonas similis* Stokes, 1890
Trachelomonas hexangulata Swirenko, 1914
Trachelomonas mammillosa Proscott, 1944
Trachelomonas planctonica Swirenko
Trachelomonas volvocina Ehrenberg, 1833
Trachelomonas volvocina var. *volvocina* Ehrenberg, 1833
Trachelomonas volvocina var. *papillata* Lemmermann, 1906
Trachelomonas superba (Swirenko) Deflandre, 1926
Strombomonas verrucosa (Daday) Deflandre
Strombomonas verrucosa var. *zmiewika* Deflandre, 1929
Strombomonas Deflandre, 1930
Strombomonas sp.
Peranema trichophorum Stein, 1878
Peranema macromastix Conrad, 1934

8 - Phylum Cyanophyta (Myxophyta), (Cyanobacteria) شاخه جلبکهای سبز- آبی

Class Myxophyceae

Order Chroococcales

Family Chroococcaceae

- Chroococcus minatus* (Kuetzing) Naegeli, 1849
Chroococcus turgidus (Kuetzing) Naegeli, 1849
Synechococcus aeruginosus Naegeli, 1849
Dactylococcopsis hirudiformis (G.S. West) Geitler, 1902
Merismopedia convoluta Brebisson, 1849
Gomphosphaeria aponina Kuetzing, 1836
Gomphosphaeria lacustris Chodat, 1898
Coelosphaerium kuetzingianum Naegeli, 1849
Microcystis aeruginosa Kuetz. ; Emend. Elenkin, 1924

Order Tubiellales

Family Tubiellaceae

- Johannesbaptistia pellvicia* Drouet, 1938

Order Oscillatoriales

Suborder Oscillatorineae

Family Oscillatoriaceae

- Lyngbya birgei* G.M. Smith, 1916
Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebmann, 1841
Lyngbya circumcreta G.S. West, 1899
Oscillatoria Vaucher, 1803
Oscillatoria sp.
Oscillatoria limosa C.A. Agardh, 1812
Oscillatoria tenuis C.A. Agardh, 1813
Spirulina major Kuetzing, 1843
Spirulina subsalsa Oersted, 1842
Spiulina laxa G. M. Smith, 1916
Spirulina (Arthrospira) Jenneri (Stizenberger) Geitler, 1852

Suborder Nostochineae

Family Nostocaceae

Anabaena Bory, 1822
Anabaena sp.
Anabaena spiroides Klebahn, 1895
Anabaenopsis elenkinii Miller, 1923
Anabaenopsis raciborskii Woloszinska, 1912
Anabaenopsis cunningtonii R. Taylor, 1932
Anabaenopsis arnoldii Aptekarj, 1932
Aphanizomenon flos - aquae Ralfs, 1850
Nostoc Vaucher, 1803
Nostoc sp.
Nodularia spumigena Mertens, 1822

Family Rivulariaceae

Gloeotrichia echinulata (J.E. Smith) P. Richter, 1894
Gloeotrichia natans (Hedwig) Rabenhorst, 1847

شاخه جلبکهای قرمز ۹ - Phylum Rhodophyta**Class Rhodophyceae****Subclass Florideae****Order Nemalionales****Family Batrachospermaceae**

Batrachospermum Roth, 1797
Batrachospermum sp.

بحث

فیتوپلانکتونها به لایه‌های عمیق‌تر و رقابت با گیاهان غوطه‌ور و ریشه‌دار ممکن نبوده به این دلیل رشد آنها کمتر می‌شود و مجدداً از اواخر شهریور و شروع فصل پاییز و آغاز بارندگیهای فصلی تغییر کلی در فلور پلانکتونی منطقه ایجاد می‌گردد (کیمبال و کیمبال، ۱۳۵۳). در فصل پاییز و زمستان دیاتومه‌ها با تنوع فراوان غلبه‌یت می‌باشند. مهمترین گونه‌های مشاهده شده عبارتند از: *Nitzschia acicularis*,

Diatoma vulgare و *Synedra ulna* در ناحیه دیگر که تحت تأثیر آب دریا (روگاه‌ها و کانال کشتیرانی) می‌باشد، دیاتومه‌ها از بیشترین فراوانی نسبت به سایر گروهها برخوردار بوده، اما جمعیت سیانوفیتا و کلروفیتا نیز در لایه‌های سطحی‌تر آب قابل توجه است. در این نواحی اغلب گونه‌های پلانکتونی آب لب شور دریای خزر *Rhizosolenia calcar-avis*, *Coscinodiscus granii* و *Exuviaella* را در تابستان و *Prorocentrum scutellum* تابش شدید خورشید محدود می‌گردد.

برمبانای مطالعاتی که بر روی پراکنش و انتشار پلانکتونها در بخش‌های مختلف تالاب انزلی انجام گرفته آنرا می‌توان به دو ناحیه تقسیم نمود. یکی بخش غربی با آب شیرین و تراکم زیاد گیاهان غوطه‌ور در فصل بهار و اوایل تابستان و ناحیه دیگر روگاه‌ها و کانال کشتیرانی که تحت تأثیر آب دریا می‌باشد (رمضانپور، ۱۳۷۳).

در بخش غربی تالاب، رشد فیتوپلانکتونها از اواسط فصل بهار با دیاتومه‌ها و کلروفیتا آغاز می‌شود که تنوع بسیار زیادی دارند. این امر مانع تشکیل گونه‌های غالب می‌شود، البته جمعیت خانواده نوستوکاسه از سیانوفیتا نیز در این هنگام قابل توجه است. در اواخر بهار و با شروع فصل تابستان میزان سیانوفیتا بخصوص گونه *Anabaenopsis raciborskii* نمونه *Anabaenopsis raciborskii* را تشکیل می‌دهند (رمضانپور، ۱۳۷۳)، اما جمعیت فیتوپلانکتونی همچنان با بالا رفتن دما و تابش شدید خورشید محدود می‌گردد. در این حالت مهاجرت

سیاکیشیم) است. مشخص شدن دلیل این پدیده به مطالعه و بررسی بیشتری احتیاج دارد. اکثر فیتوپلانکتونهای این منطقه *Nitzschia* مربوط به دیاتومهای گونه‌های مختلف جنسهای *Melosira granulate*, *Synedra*, *Cyclotella*, *Dinobryon sertularia* بوده و بیشترین تراکم آنها نیز مربوط فصول پاییز، زمستان و اوایل بهار می‌باشد (جدول ۱).

نتایج بدست آمده از مطالعات فیزیکوشیمیایی آب (خداپرست، ۱۳۷۸) حاکی از آن است که در تالاب انزلی حرارت در فصول مختلف برای رشد و نمو موجودات آبزی مناسب می‌باشد. حداقل دمای آب حدود ۲۷ درجه سانتیگراد و حداقل آن به ۵ درجه سانتیگراد می‌رسد. شفافیت آب در تالاب انزلی بخصوص در آبکنار بسیار مطلوب بوده بطوریکه نور تا بستر آن نیز نفوذ می‌کند. این امر یکی از عوامل فراوانی فیتوپلانکتونها در این منطقه است. در سایر مناطق افزایش سطح آب تالاب و سیلابی شدن در اثر بارندگی و طغیان رودخانه‌ها، ذرات معلق در ستون آب را افزایش داده که عملاً سبب عدم نفوذ نور شده و تنوع و تراکم فیتوپلانکتونها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در منطقه شیجان ورود آلاینده‌ها از طریق رودخانه پیربازار باعث کدورت آب شده و تراکم فیتوپلانکتونها را کاهش می‌دهند.

مطالعات نشان داده‌اند شاخه‌های کلروفیتا و دیاتومهای متنوعترین شاخه‌ها، همچنین شاخه‌های سیانوفیتا و دیاتومهای پر تراکم‌ترین نمونه‌های فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی را تشکیل می‌دهند. مناطق آبکنار (تالاب غرب) و هندخاله (تالاب مرکزی)، غنی‌ترین مناطق فیتوپلانکتونی از نظر تنوع و تراکم هستند. بیشترین فراوانی سیانوفیتا در اوایل بهار یا اوایل تابستان و بیشتر در منطقه آبکنار با گونه‌های *Microcystis aeruginosa*, *Anabaenopsis raciborskii* و *Anabaena spiroides*, *Oscillatoria limosa* می‌باشد. در فصل پاییز بمروز با

Thalassionema nitzschioides و *cordata* می‌توان نام برد. گونه اخیر در آبان ماه غالبیت می‌باشد. رمضانپور نیز در سال ۱۳۷۳ به نتایج مشابهی دست یافته است.

شاخه *Chlorophyta* در طول اجرای پژوهه در مناطق مختلف تالاب انزلی پراکندگی یکنواختی داشته است. از این شاخه گونه‌های مختلف از جنس *Scenedesmus* (بیشتر گونه‌های *Chlamydomona* (*S. acuminatus*, *S. opoliensis*) و از جلبکهای رشتی‌ای *Ankistrodesmus falcatus* sp., و از جلبکهای رشتی‌ای *Spirogyra* sp. و *Mougeotia* sp. در اکثر ایام سال از فراوانی تقریباً یکسانی در مناطق مختلف تالاب برخوردارند.

شاخه‌های *Euglenophyta* و *Pyrrophyta* پایین‌ترین جمعیت را در تالاب انزلی نشان داده‌اند. پایین‌بودن درصد *Euglenophyta* که نشان‌دهنده آلودگی هستند در سطح تالاب انزلی، می‌تواند بیانگر این مسئله باشد که در تالاب انزلی عوامل لازم برای رشد و تکثیر این شاخه وجود نداشته یا بسیار ناچیز است. بیشترین فراوانی اوگلنووفیتا در منطقه شنبه بازار روگا و هندخاله جنوبی، بخصوص در فصل تابستان بدليل دمای مناسب و بار زیاد مواد آلی وارد به این مناطق می‌باشد (خداپرست، ۱۳۷۸). گونه‌های *Trachelomonas armata* و *Euglena acus* شاخه فراوانتر هستند. شاخه پیروفیتا در منطقه موج‌شکن و روگای کشتیرانی که متأثر از آب دریا بوده، فراوانتر هستند. همچنین در منطقه آبکنار نیز چند گونه از همین شاخه و از جنس *Pridinioum* بخصوص در فصل تابستان جمعیت بالایی دارند.

نواحی شیجان و سیاکیشیم در شرق تالاب انزلی ضعیفترین مناطق از نظر فیتوپلانکتونی بوده و منطقه هند خاله شمالی نیز بدليل پوشش نیلوفر آبی وضعیتی شبیه به مناطق فوق دارد. عمق کم و پوشش ماکروفیتی فراوان مانع نفوذ نور خورشید شده، به این دلیل تراکم فیتوپلانکتونی در این مناطق کم ولی بسیار متنوع (بخصوص در

دلیل فراغنی بودن (Eutrophication) تالاب انزلی می‌باشد (نظمی، ۱۳۷۴). شواهد نیز نشان می‌دهند که تالاب انزلی هم اکنون نیز از نظر مواد بیوژن فوق العاده غنی بوده و این مسئله باعث عدم تعادل در این اکوسیستم آبی شده است و در حال حاضر نیز ورود آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی و فاضلابهای شهری، اکوسیستم تالاب را تحت تأثیر خود قرار داده و آنرا به مرحله‌ای هدایت می‌کند که اگر از ورود بی‌رویه این گونه آلاینده‌ها در آن جلوگیری نشود، در ادامه این روند، شاهد نابودی تالاب خواهیم بود.

سرد شدن هوا دیاتومه‌ها با گونه‌های *Nitzschia acicularis* و *Synedra ulna* و *Cyclotella meneghiniana* بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده اما گونه *Oscillatoria limosa* از سیانوفیتا نیز در فصول سرد سال از تراکم خوبی برخوردار است. تالاب انزلی از نظر بین‌المللی اهمیت فوق العاده داشته، همچنین اکوسیستم با ارزشی برای زیست انواع گیاهان و جانوران می‌باشد. نتایج بدست آمده از مطالعات لیمنولوژیک طی سالهای متتمادی (خدایپرست، ۱۳۷۸)، همچنین پراکنش زیاد گیاهان، پلانکتونها، رسوبات، مواد مغذی، مواد معدنی و آلی، همچنین افزایش تعداد باکتریوپلانکتونها

جدول ۱: برآکنش و فراوانی فیتوپلانکتونها در تالاب انزلی در سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۹

نام گروه	جهات			جهات			جهات			جهات		
	زمینان	باغان	سبز									
<i>Bacillariophyta(Diatoms)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Actinocyclus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Achnanthus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amphora</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Anomoeoneis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Athyra</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bacillaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Biddulphiia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Calones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Campylodiscus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Centrula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chetoceros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Conconeis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Coscinodiscus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cymatopleura</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cymbella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cyclotella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Denticula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Diatoma</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Diploneis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Epithemia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Eurotia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Fragilaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gomphonema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gyrosigma</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Hantzschia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Melothrix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nanocula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Neidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nitzschia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pinnularia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Riccioplenia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rizosolenia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rhopatodia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Scelotonema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sauvages</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stephanodiscus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	نام	جهات															
		زمستان	بیار	تیر	خرداد												
	<i>Francesia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gloctenium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Goniatogon</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gonium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Golenkinia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hypodicyon</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hyalotheca</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kirchneriella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Lauterbornella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Macrocthium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Micrasiterus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mougeotia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oecryptis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pandorina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pedastrium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Penium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pieromonas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pleurotaeniun</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pleodorina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Polydriopsis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Protococcus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Radiococcus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Radiofilum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Scenedesmus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Schroeteria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Selenastrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Spirigya</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sigeeclonium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Staurastrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tetrastrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tetraselmis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tetradron</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Treburaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ulothrix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Volvox</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Xanthidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zygema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ادمه بدول ۱

جدول ۱

	نام گونه	جهانی	آسیا	آفریقای شمالی	آمریکای شمالی	آمریکای جنوبی	آفریقای جنوبی	آسیا	آفریقای شمالی	آفریقای جنوبی	آمریکای شمالی	آمریکای جنوبی	آسیا	آفریقای شمالی	آفریقای جنوبی	آمریکای شمالی	آمریکای جنوبی	آسیا	آفریقای شمالی	آفریقای جنوبی	آمریکای شمالی	آمریکای جنوبی		
<i>Sutirella</i>																								
<i>Takellaria</i>																								
<i>Thalassionema</i>																								
<i>Thalassiosira</i>																								
<i>Tropidonecs</i>																								
<i>Xanthophyta</i>																								
<i>Borycococcus</i>																								
<i>Centricus</i>																								
<i>Chrysophyta</i>																								
<i>Dinobryon</i>																								
<i>Mallomonas</i>																								
<i>Synura</i>																								
<i>Uroglena</i>																								
<i>Chlorophyta</i>																								
<i>Actinostratum</i>																								
<i>Ankistrodesmus</i>																								
<i>Arthrodesmus</i>																								
<i>Binuclearia</i>																								
<i>Carteria</i>																								
<i>Chlorella</i>																								
<i>Chlamydomonas</i>																								
<i>Coelosium</i>																								
<i>Cladophora</i>																								
<i>Cladotilum</i>																								
<i>Codium</i> (<i>Gigartinae</i>)																								
<i>Cosmarium</i>																								
<i>Cruisigenia</i>																								
<i>Desmarestia</i>																								
<i>Desmidium</i>																								
<i>Diaphysaerium</i>																								
<i>Dimorphothrix</i>																								
<i>Draparnaldia</i>																								
<i>Euastrum</i>																								
<i>Eudorina</i>																								

نام گروه	نام گونه	جهت مذکور				جهت مذکور				جهت مذکور			
		زمین	باغ	باغ	زمین	زمین	باغ	باغ	باغ	زمین	باغ	باغ	زمین
Cyanophyta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anabaena		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aphanizomenon		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrospira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coelosphaerium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroococcus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dactylococcopsis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloeobacter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloeocapsa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gomphosticteria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Johannesbaptisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lynbya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menismopedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcystis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nodularia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nostoc		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oscillatoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spirulina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Synechococcus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyrrophyta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceratium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cystodinium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exuviaella		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glenodinium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gymnodinium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peridinium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procentrum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cryptophyta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cryptomonas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euglenophyta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euglena		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepocinclis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phacus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peranema		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trachelomonas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strombomonas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhodophyta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batrachospermum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جهت مذکور = عدم تعلق = عدم تعلق در مناطق

تشکر و قدردانی

رمضانپور، ز. ، ۱۳۷۳. بررسی اکولوژیک فیتوپلانکتونهای تالاب انزلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران. ۷۴ صفحه.

زابلینا، ام.ام.؛ کسیلوف، یی.آ.؛ پیروشکینا، آ.ای. و شیشوکوما، اس. ، ۱۹۵۱. جلبکهای دیاتومهای مسکو. ۶۲۱ صفحه.

کسیلوف، یی.آ. ، ۱۹۵۰. دینوفلازلاتاهای دریایی و آبهای شیرین اتحاد جماهیر شوروی، مسکو. ۲۸۱ صفحه.

کسیلوف، یی.آ. ، ۱۹۵۳. کلید شناسایی جلبکها و گیاهان پست (جلد ۲). مسکو. ۳۱۱ صفحه.

کورسانف، ل.بی. ، ۱۹۵۳. کلید شناسایی جلبکها و گیاهان پست (جلد ۱). مسکو. ۳۹۴ صفحه.

کورشیکف، آ.ا. ، ۱۹۵۳. کلید شناسایی جلبکهای آب شیرین (کلروفیتا) جمهوری اوکراین، کی یف. ۴۳۵ صفحه.

کیمبال، ک.د. و کیمبال، س.اف. ، ۱۳۵۳. مطالعات لیمنولوژی تالاب انزلی. ترجمه: حسین پور. انتشارات جهاد سازندگی استان گیلان، ۱۳۶۶. ۱۱۴ صفحه.

مهندسين مشاور يكم، ۱۳۶۷. مطالعات گام اول طرح جامع احیا تالاب انزلی. جلد هفتم، لیمنولوژی. انتشارات جهاد سازندگی استان گیلان، کمیته امور آب. ۳۱۹ صفحه.

نظامی، ش. ، ۱۳۷۴. بررسی تعداد باکتریوپلانکتونهای تالاب انزلی. مجله علمی شیلات ایران، سال چهارم، شماره ۱. بهار ۱۳۷۴. صفحات ۴۶ تا ۶۳.

ولادیمیرسکایا، الف. و کوراشووا، الف. ، ۱۳۵۷. تحقیق و مطالعه موجودات پلانکتونی از طرف گروه کارشناسان اتحاد جماهیر شوروی سابق در تالاب انزلی، رودخانه‌ها و قسمتهای جنوبی دریای خزر، ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. صفحات ۱ تا ۱۵.

از رئیس وقت مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، جناب آقای دکتر نظامی به دلیل مساعدت‌هایشان، از مهندس رضوی صیاد که مشوق ما در انجام این پژوهه بودند، دکتر پیری جهت در اختیار گذاشتن منابع ارزشمند پلانکتونی و ریاست وقت موسسه تحقیقات شیلات ایران، دکتر رضوانی به دلیل حمایت و فراهم آوردن تسهیلات لازم در به ثمر رسیدن این تحقیق تشکر و قدردانی می‌گردد. از مساعدت‌های آقای یونس عادلی جهت ترجمه منابع روسی مورد نیاز، اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز، بخصوص آقایان مهندس حسین‌پور و مهندس کریم‌پور، آقای اولاد ربیعی که زحمت نمونه‌برداریها را بعده داشتند، خانم فربنا مددی جهت تایپ مطالب و همکاران محترم در اطلاعات علمی آقایان دکتر ولی‌پور، ماهی صفت، سعیدنیا و خانم شمالی جهت اسکن عکسها، مسئول کتابخانه مرکز خانم حسنی مقدم، واحد ترابری دریایی آقایان ایران‌پور و روحانی سپاسگزاری می‌نماییم.

منابع

- اوکسنر، ا.م. ، ۱۹۷۵. کلید شناسایی اوگلنووفیتای جمهوری اوکراین، کی یف. ۳۹۵ صفحه.
- پیروشکینا، آ.ای. و ماگارووا، ۱۹۶۸. جلبکهای پلانکتونی دریای خزر، لنینگراد. ۲۹۰ صفحه.
- جمالزاده فلاح، ف. ، ۱۳۷۷. تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تالاب انزلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. صفحات ۱ تا ۲۳.
- خدایپرست، س.ح. ، ۱۳۷۸. گزارش نهایی پژوهه هیدرولوژی و هیدروبیولوژی تالاب انزلی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۱. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. ۱۵۶ صفحه.
- دیارکیان مهر، ۵. ، ۱۳۷۱. مبانی جلبک شناسی. جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۵۲ صفحه.
- رحمیان، ح. ، ۱۳۵۷. جلبک شناسی. دانشگاه ملی ایران، تهران. ۴۰۸ صفحه.

- American Public Health Association , 1989.** Standard method for the examination of water and waste water. USA. 1193P.
- Bellinger, E.G. , 1986.** A Key to common British algae. The Institution of Water and Environmental Management. London, WC1N 2EB. 138P.
- Boney, A.D. , 1989.** Phytoplankton. Edward Arnold. British Library Cataloguing Publication Data. 118P.
- Edmondson , W.T. , 1959.** Fresh Water Biology. New York, London. John Wiley and sons Inc. 1248P.
- Fott, B. , 1971.** ALGENKUNDE . Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 581P.
- Frantisek, H. , 1984.** Studies on the Chlorococcal algae. Vol. 3,4,5. Bratislava. 530P, 225P, 264P.
- Heurck, H.V. , 1962.** The Diatomaceae . Whelden & Wesley Ltd. 326P.
- Holcik, J. and Olah, J. , 1992.** Fish, fisheries and water quality in Anzali Lagoon and its watershed. F1, UNDP/88/001. Filed document, 2. FAO, Rome. pp.1-46.
- Huber pastalozzi, P.G. 1962.** Das Phytoplankton des subwasser systemmatik und biologie. Teil 1 , 2 , 3 , 4 , 5. Stuttgart. 342P., 365P. ,322P. ,820P. ,1002P.
- Krammer, K. ; Bertalot, L. , 1988.** Subwasserflora von mitteleuropa. Teil, 2 Bacillariophyceae. 596P.
- Maesen, H. , 1983.** Fresh water Plankton illustration. Agriculture Publishing House. 85P.
- Minelli, A. , 1994.** Biological Systematics. CHAPMAN & HALL, London, UK. 387P.
- Pankow, H. ; Kell, V. and Martens, B. , 1976.** Algenflora der ostsee 2, Plankton. Leipzig. 492P.
- Presscot, G.W. , 1962.** Algae of the western great lakes area. WM.C. Brown Company Publishing, Iowa, USA. 933P.
- Presscot, G.W. , 1976.** The fresh water algae. WM.C.Brown Company Publishing, Iowa, USA. 348P.
- Tiffany, L.H. and Britton, M.E. , 1971.** The algae of Illinois. Hanfer Publishing Company, New York. USA. 407P.

Phytoplankton species in Anzali Lagoon and Caspian Sea coastal waters

Makaremi, M. ; Sabkara, J. and Mohammadjani, T.

marziyeh_makaremi@yahoo.com

Ecology Dept., Inland Water Aquaculture Institute, P.O.Box: 66
Bandar Anzali, Iran

Received: May 2004

Accepted: June 2005

Keywords: Phytoplankton, Anzali Lagoon, Caspian Sea, Iran

Abstract

Plankton samples were collected in 28 stations in Anzali Lagoon and nearby coastal areas during 1997–1999. Overall, 9 phyla, 134 genera and 278 phytoplankton species were identified. Of the identified species, 56 genera and 107 species belonged to phylum Chlorophyta, 39 genera and 87 species belonged to Bacillariophyta, 2 genera and 2 species were from Xanthophyta, 4 genera and 4 species belonged to Chrysophyta, 6 genera and 34 species were from Euglenophyta, 7 genera and 9 species belonged to Pyrrophyta, 1 genus and 2 species were from Cryptophyta, 18 genera and 32 species were from Cynaophyta and 1 genus and species was of Rhodophyta.

We showed Cynaophyta and Bacillariophyta to be the most abundant phyla and western and southern parts of the lagoon the richest in terms of phytoplankton diversity and density. Cyanophyta planktons were the most abundant in summer in western part of the lagoon and were comprised of *Microcystis aeruginosa*, *Oscillatoria limosa* and *Anabaenopsis raciborskii*. Diatoms were observed throughout the year everywhere in the lagoon with their diversity being highest in late autumn, winter and spring. The dominant species of Bacillariophyta were *Cyclotella meneghiniana*, *Synedra ulna* and *Nitzschia acicularis* in the lagoon while *Rhizosolenia calcar* was dominant in estuarine and coastal areas during summer. Of Chlorophyta, species belonging to *Scenedesmus* were abundant in spring and of Eulenophyta, *Euglena acus* and *Terachelomonas armata* were most abundant in southern part of the lagoon in spring and summer. *Gymnodinium coronatum* from Pyrrophyta was abundant in summer in western part of the lagoon while *Exuviaella cordata* was dominant in estuary and coastal areas during autumn.