



# انواع آهک و اهمیت آن در مزارع پرورش میگو

محسن نوری نژاد، سهیلا امیدی

m.noorinezhad@gmail.com

پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

فوق در محیط آبی، میزان پی اچ از ۱-۱۴ درجه بندی می شود. میزان پی اچ ۷، خنثی و بیشتر و کمتر از آن به ترتیب قلیایی و اسیدی محسوب می گردد. پی اچ آب خالص حدود ۷ و آب دریا حدود ۸ می باشد. پی اچ مایعات بدن جانوران نیز بطور معمول در همین دامنه یا نزدیک به آن می باشد به عنوان مثال، پی اچ مایعات بدن میگو در حدود ۷/۳ می باشد (Pascual et al., 2003). افزایش و کاهش میزان پی اچ مایعات بدن بر میزان تنفس و همچنین تبادل املاح ضروری و حتی جذب مواد غذایی موثر می باشد. کربناتها و بی کربناتها در حفظ پی اچ منابع آبی مختلف از جمله مایعات بدن موجودات زنده نقش تعیین کننده ای دارند. در واقع میزان این ترکیبات که به قدرت قلیایی معروف می باشد، بیان کننده قدرت مقاومت یک منبع آبی در برابر نوسانات پی اچ در شرایط طبیعی می باشد (وحدتی و فتح پور، ۱۳۶۴). فضولات و مواد غذایی مصرف نشده و تراکم زیاد آبزیان در مزارع پرورش آبزیان، شرایط مناسبی را برای شکوفایی گروههای مختلف موجودات زنده میکروسکوپی هوازی و بی هوازی و تولید اسیدهای مختلف آلی و معدنی از جمله دی هیدروژن سولفید و اسید کربنیک بوجود می آورد. در حضور کربناتها و بی کربناتها، کلیه ترکیبات اسیدی تولید شده به تدریج خنثی شده و از افزایش ناگهانی اسیدیته محيط مانع می شود (Boydet al., 2002). با افزایش عمر استخراها و کاهش میزان قلیایی، قدرت مقاومت استخراج نسبت به افزایش اسیدیته کاهش یافته و شرایط بطور مستقیم و غیر مستقیم سبب مسمومیت و مرگ آبزیان می گردد. به منظور حفظ قلیایی استخراها و اجتناب از مرگ و میرهای ناشی از نوسانات اسیدیته، امروزه از ۴ نوع ترکیب شامل کربنات کلسیم،

چکیده  
اسیدیته و قلیاییت از جمله عواملی هستند که بر حیات تمامی جانداران به خصوص آبزیان موثر می باشند. در شرایط طبیعی، نوسانات این عوامل به کمک ترکیبات مختلف از جمله کربناتها و بی کربناتها تعدیل شده و از افزایش ناگهانی این عوامل مانع می گردد. مزارع پرورش میگو، به دلیل وجود فضولات و مواد غذایی مصرف نشده و تراکم زیاد آبزی، شرایط مناسبی برای تولید اسیدهای مختلف آلی و معدنی از جمله دی هیدروژن سولفید و اسید کربنیک ایجاد می کنند. مواد فوق در طی دوره پرورش با مصرف بی کربناتها و کربناتها و همچنین هوادهای مناسب تعدیل می شوند. در طی دوره آماده سازی و پرورش آبزیان، از انواع آهکهای کشاورزی و صنعتی به منظور حفظ و جبران قلیایی استخراها استفاده می گردد. بررسی های انجام شده گویای آن است که در طی دوره آماده سازی، استفاده از پودر سنگ (کربنات کلسیم) می تواند ضمن افزایش میزان قلیایی، بستر استخراج را در مقابل فرآیندهای حاصل از خاک سیاه مقاومت نماید در حالی که طی دوره پرورش و ضد عفونی، آهک صنعتی یا آهک کشته در تنظیم نوسانات اسیدیته و قلیاییت آب موثر می باشد.

واژگان کلیدی: آهک، مزارع پرورش میگو، اسیدیته، قلیاییت.

مقدمه  
یکی از عوامل موثر در ثبات و پایداری پدیده های زیستی، نوسانات غلظت یون هیدروژن ( $H^+$ ) و هیدروکسید ( $OH^-$ ) است. در اصطلاح علمی، غلظت این یون ها به کمک شاخصی بنام پی اچ (pH)، اندازه گیری و بیان می گردد. با توجه به غلظت یون های

در طی دوره آماده سازی، استفاده از پودر سنگ (کربنات کلسیم) می تواند ضمن افزایش میزان قلیاییت، بستر استخراج را در مقابل فرآیندهای حاصل از خاک سیاه مقاومت نماید در حالی که طی دوره پرورش و ضد عفونی، آهک صنعتی یا آهک کشته در تنظیم نوسانات اسیدیته و قلیاییت آب موثر می باشد.




آن میزان اسیدیته آب افزایش یافته و پی اچ آب می‌تواند حتی تا حدود ۴/۵ نیز کاهش یابد (نوری نژاد، ۱۳۸۰).

## آهک

آهک مجموعه ترکیباتی است که به منظور حفظ قلیائیت، تنظیم پی اچ استخراها و در برخی موارد برای ضد عفونی نمودن در مزارع پرورش آبزیان استفاده می‌گردد. برخی از مهم‌ترین ترکیبات آهک به شرح زیر می‌باشد:

### (۱) آهک کشاورزی یا کربنات کلسیم

آهک کشاورزی بطور معمول ترکیبی است با فرمول شیمیایی  $\text{CaCO}_3$  که بیش از ۴٪ از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. حدود ۶۰ درصد از ترکیب سنگ‌های منطقه زاگرس را کربنات کلسیم تشکیل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین و ارزان‌ترین منابع کربنات کلسیم، سنگ‌ها و پودر سنگ حاصل از این کوهها می‌باشد. پودر سنگ به صورت طبیعی در محیط زیست، در اثر گذر زمان و فرسایش سنگ‌های مختلف حاصل می‌شود. علاوه بر این، کربنات کلسیم به صورت صنعتی توسط دستگاه‌های کوبش سنگ به دست می‌آید. میزان خلوص و اندازه ذرات بر میزان قیمت این ترکیب و نوع مصرف آن موثر می‌باشد، در صنایع غذایی و بهداشتی به دلیل اهمیت سلامت انسان از کربنات کلسیم خالص سفید رنگ با دانه بندی بسیار ریز و گران استفاده می‌گردد در حالی که در دیگر صنایع با توجه به اهمیت می‌توان از ترکیباتی با درجه خلوص کمتر و با دانه بندی درشت‌تر ولی ارزان‌تر استفاده نمود. در حالت معمول کربنات کلسیم با آب واکنش محسوسی نداشته و در تماس با بدن ایجاد صدمه نمی‌کند. این ترکیب تحت فرآیندهای شیمیایی ۴ و ۵ در مقابل اسیدی شدن خاک مقاومت می‌کند. در طی این واکنش، میزان پی اچ، سختی و قلیاییت محیط افزایش می‌یابد.







با توجه به واکنش‌های فوق، وجود کربنات کلسیم در استخراهای پرورش آبزیان می‌تواند ضمن حفاظت آبزی در مقابل نوسانات حاصل

اکسید کلسیم، هیدروکسید کلسیم و دولومیت (کربنات کلسیم و منیزیم) استفاده می‌شود. در این مقاله به منظور دستیابی به شرایط بهینه در استخراهای پرورشی، خواص و نحوه عملکرد ترکیب‌های فوق مورد توجه قرار می‌گیرد.

### چرخه اسید کربنیک در آب

اسید کربنیک ترکیبی معدنی با فرمول  $\text{H}_2\text{CO}_3$  است که از ترکیب آب و دی اکسید کربن حاصل می‌شود. اسید کربنیک با تولید یون‌های کربنات و بی کربنات، یکی از ترکیبات اولیه تعديل کننده نوسانات پی اچ آب محاسبه می‌گردد. بسته به میزان پی اچ محیط، این ترکیب به شرح واکنش‌های شیمیایی ۱ تا ۳، یون‌های هیدروژن، بی کربنات ( $\text{HCO}_3^-$ ) و کربنات ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) و همچنین دو ترکیب دی اکسید کربن ( $\text{CO}_2$ ) و آب ( $\text{H}_2\text{O}$ ) تولید می‌نماید. با توجه به شکل (۱) بیشترین میزان درصد یون بی کربنات (عامل موثر در شکوفایی فیتوپلاتکتون‌ها) در پی اچ ۷/۵ و یون کربنات و اسید کربنیک به ترتیب در پی اچ‌های قلیایی ۱۱ و اسیدی ۴/۵ است.





شکل ۱- اثرات pH بر میزان دی اکسید کربن محلول، بی کربنات و کربنات در آب (Boyd and Tucker, 2014).

تحت عمل حیاتی تنفس در مزارع پرورش آبزیان دی اکسید کربن تولید می‌شود، بخش عمده این گاز در تبادل با هوای آزاد از محیط استخراها دفع و بخش دیگر آن با حل شدن در آب، امکان تولید اسید کربنیک را بطور پیوسته ایجاد می‌کند. میزان تولید این ترکیب به شدت تبادل گازهای استخراج و هوا بستگی دارد بطوریکه در موقع افزایش رطوبت هوا، کاهش سرعت باد و هوادهی، مقدار تولید اسید کربنیک و به دنبال

**آهک مجموعه ترکیباتی است که به منظور حفظ قلیاییت، تنظیم پی اچ استخراها و در برخی موارد برای ضد عفونی نمودن در مزارع پرورش آبزیان استفاده می‌گردد.**



شرايط ويزه جوي که در آن رطوبت هوا افزایش سرعت باد و ميزان هوايي کاهش می يابد. غلظت گاز دی اکسید کربن و اسید کربنيک محلول در آب به شدت افزایش می يابد (واکنش شيميايي ۵). در چنین شرايطي آبزيان به منظور تسهيل درتبادل بيشر گازهاي تنفسی به سطح آب هجوم می آورند. تجربه نشان داده است که تشديد هوايي در راستاي تبادل گازهاي استخراجها و همچنين استفاده از آهک کشته می تواند به سرعت غلظت دی اکسید کربن و به دنبال آن اسیديته آب را کاهش داده و تنفس آبزي را بسيار تسهيل نماید (واکنشهاي شيميايي ۹-۱۱).



از اسیديته به خصوص فرآيندهای اسیدي حاصل از توليد خاک سياه در طی دوره پرورش باشد. لذا استفاده از کربنات کلسیم در زمان آماده سازی استخر به منظور حفظ و همچنان افزایش قدرت قليائيت پستر ضروري می باشد. از آنجا که کربنات کلسیم يکی از مواد معدنی حياتی در بدن موجودات زنده محسوب می گردد مصرف بيش از حد آن نمی تواند واکنش نامطلوبی بر محیط و آبزی داشته باشد ولی می تواند مقاومت بيشتر استخر در مقابل شرايط نامطلوب حاصل از توليد خاک سياه را تضمین کند. تجربه نشان داده است که کاربرد ۱ تن بر هكتار اين ترکيب می تواند نوسانات اسیديته استخراجها را در شرايط معمول پرورش برای چندين دوره تامين نماید (Wilkinson, 2002).

## ۲-۲ عامل مرگ و میر آبزی

ترکيباتي مانند اکسید کلسیم و هيدروکسید کلسیم می توانند پي اچ آب را بطور ناگهانی تا ميزان ۱۱ افزایش دهند. اين دامنه از تغييرات پي اچ برای تمامی آبزيان، کشنده محسوب می گردد. تجربه نشان داده است که تغييرات سريع پي اچ آب حتى در دامنه قابل تحمل نيز می تواند در ميزان مرگ و مير موثر باشد، لذا استفاده از ترکيبات فوق در محيط زيست آبزيان نيازمند دقت و احتياط زياد می باشد.


## ۳-۱ افزایش آلکانيتی

ترکيباتي مانند اکسید کلسیم و هيدروکسید کلسیم در محيط آبی با دی اکسید کربن ترکيب شده و ايجاد کربنات کلسیم می کنند که می توانند در افزایش ميزان قليائيت آب موثر واقع شوند.

## ۴-۱ مصرف زياد ترکيباتي مانند اکسید کلسیم و هيدروکسید کلسیم مانع شکوفايي پلانكتوني می شود

فيتوپلانكتونها برای ادامه حيات و شکوفايي، نيازمند ماده کربني به شكل بيکربنات ( $\text{HCO}_3^-$ ) می باشند. باوجه به شكل (۱)، بيشرترین ميزان بيکربنات در دامنه پي اچ حدود ۷ قراردارد. استفاده زياد از آهک کشته سبب افزایش پي اچ و تبديل تمامی دی اکسید کربن های آب به صورت یون کربنات می شود. در چنین شرايطي

دو ترکيب آهک زنده ( $\text{CaO}$ ) که ممکن است با  $\text{MgO}$  نيز همراه باشد) و آهک کشته ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) که ممکن است با  $\text{Mg(OH)}_2$  نيز همراه باشد) در بازار به آهک صنعتي معروف می باشند. آهک زنده آهکی است که از پختن آهک کشاورزی يا معدنی بر اساس واکنش شيميايي شماره (۶) حاصل شده و در بخش ساختمان سازی کاربرد وسعي دارد.



آهک زنده (آهک سريع يا آهک سوخته) در مجاورت با آب طبق رابطه شيميايي (۷) به آهک کشته که آهک آبدار يا هيدراته هم شناخته می شود، تبديل می گردد. اين ترکيب به راحتی در آب حل شده و سبب افزایش ميزان قليائيت آب می گردد (واکنش شيميايي ۸). آهک زنده در تماس با بدن ايجاد خوردگي و سوزش می نماید.



استفاده از آهکهاي کشته و زنده در مزارع پرورش ميگو می تواند همراه با بروز پدیده های مختلف زيستي مثبت و منفي به شرح زير باشد:

۱-۲) کاهش غلظت دی اکسید کربن و اسیديته آب در محيط زيست آبزيان بطور معمول ميزان تنفس و توليد دی اکسید کربن زياد می باشد که به کمک تبادل گازها با هوا تعديل می گردد. در

**تشديد هوايي در راستاي تبادل گازهاي استخر با هوا و همچنان استفاده از آهک کشته می تواند به سرعت غلظت دی اکسید کربن و به دنبال آن اسیديته آب را کاهش داده و تنفس آبزي را بسیار تسهيل نماید**



### نتیجه گیری

ترکیبات مختلف آهک شامل آهک معدنی و آهک پخته با توجه به نوع ترکیب، در حفظ و تداوم شرایط اکلولوژیک استخراجها از جمله میزان پی اچ، نوع و میزان شکوفایی جلبکی و سلامت آبزی موثر می باشند و توجه کامل به شرایط اکلولوژیک استخراج هنگام انتخاب و استفاده از این ترکیبات ضروری می باشد.

### فهرست منابع

- ۱- نوری نژاد، م. ۱۳۸۰. بررسی مرگ و میر ماهیان در آب‌های ساحلی استان بوشهر. اولین همایش ملی بحران‌های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن‌ها. واحد علوم و تحقیقات اهواز. ص ۳۱۲.
- ۲- وحدتی، الف. فتحپور، ح. ۱۳۶۴. فیزیولوژی جانوری سازش و محیط انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان. ص ۲۵
3. Boyd,C.E., Claude, E. and Thunjai, T., 2002. Aquaculture pond bottom soil qualitymanagement. Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative Research Support Program Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331- 1641. www.pdacrsp.orst.edu.
4. Claude, E., Boyd,C.E. and Queiroz, J.F., 2014.The role and management of bottom soils in aquaculture ponds. INFOFISH International22014/.www.infofish.org.

5. Pascual,C., Gaxiola,G. and Rosas,C.,2003. Blood metabolites and Hemocyanin of the white shrimp, Litopenaeus vannamei:The effect of culture conditions and a comparison with other crustacean species.Marine Biology 142(4):735- 745.
6. Wilkinson, S., NACA., 2002. Aquaculture fundamentals the use of lime, gypsum, alum andpotassium permanganate in water quality management. Aquaculture Asia.



**آهک پاشی  
مناسب، فرآیندی  
است که در  
تنظیم واکنش  
های زیستی  
مزارع پرورش  
آبزیان نقش  
حياتی دارد.**

منبع کربنی مناسب از دسترس فیتوپلانکتون‌ها خارج شده و سبب کاهش شکوفایی پلانکتونی می شود. این پدیده در ابتدای دوره پرورش به دلیل مصرف زیاد این نوع آهک در طی زمان ضد عفونی و آماده سازی در برخی مزارع پرورش آبزیان دیده می شود.

### ۲-۵) ماده ضد عفونی کننده

آهک کشته با حلایت زیاد در آب، سبب افزایش ناگهانی قلیائیت آب تا حدود ۱۲ می شود. این محدوده از پی اچ علاوه بر توان خوردگی زیاد، قادر است تمامی موجودات زنده در تماس با خود را از بین ببرد. بطور معمول از این نوع آهک به منظور ضد عفونی و تا حدی قلیایی نمودن بستر استخراجها در طی دوره آماده سازی نیز استفاده می شود (Claude and Boyd, 2014).

### ۳- سایر منابع آهکی

دولومیت  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  نوع دبگری از کربنات‌ها است که در آن عامل کربنات همزمان با دو ماده کلسیم و منیزیم ترکیب می شود. عامل کربناتی دولومیت مانند کربنات کلسیم ضمن تولید آب و دی اکسید کربن از تولید اسیدهای قوی همچون اسید سولفوریک ممانعت می نماید (Wilkinson, 2002). علاوه بر کربنات کلسیم و دولومیت ترکیبات دیگری مانند سیلیکات کلسیم و بی کربنات سدیم نیز بر میزان قلیائیت آب و تنظیم پی اچ موثر می باشند که بطور معمول به دلایل مختلف از جمله میزان تاثیرگذاری و قیمت کمتر معمول می باشند.

### یافته قابل ترویج

آهک پاشی مناسب، فرآیندی است که در تنظیم واکنش‌های زیستی مزارع پرورش آبزیان نقش حیاتی دارد. در طی فرآیند آهک پاشی در دوره آماده سازی استخراجها، ترکیب کربنات کلسیم به منظور حفظ قلیائیت و هیدروکسید کلسیم به منظور تنظیم پی اچ و ضد عفونی بستر، مناسب می باشند از طرف دیگر استفاده از هیدروکسید کلسیم یا آهک صنعتی در طی دوره پرورش در حفظ پی اچ و افزایش قدرت قلیائیت موثر است. نکته مهم در هنگام استفاده از آهک صنعتی آن است که به دلیل سرعت واکنش زیاد آن ضروری است که با احتیاط و به صورت تدریجی مصرف شود.